

DIANID TABLET

Gliclazide 80 mg

What is in this leaflet

1. What DIANID TABLET is and what it is used for
2. Before you use DIANID TABLET
3. How to use DIANID TABLET
4. Possible side effects
5. How to store DIANID TABLET

What DIANID TABLET is used for

DIANID TABLET is used to keep blood sugar at the correct level in adults with non-insulin dependent diabetes when it is not controlled by diet, physical exercise and weight loss alone.

How DIANID TABLET works

DIANID TABLET contains medicine called Gliclazide. It is hypoglycemic sulfonylureas. It acts by stimulating the release of insulin from beta cells in the pancreas and so lower the amount of sugar in your blood.

Before you use DIANID TABLET

When you must not take it

Do not take DIANID TABLET if:

- You are allergic (hypersensitive) to gliclazide or any of the other ingredients of DIANID TABLET, to other medicines of the same group (sulphonylureas) and to other related medicines (Hypoglycemic sulphonamides).
- You have insulin-dependent diabetes (type 1).
- You have ketone bodies and sugar in your urine, a diabetic pre-coma and coma.
- You have severe kidney, liver or thyroid disease.
- You are pregnant or breast feeding.
- You have severe trauma or during infections.

Before you start to take it

If you have a family history of or know you have the hereditary condition glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency (abnormality of red blood cells), Contact your doctor before taking this medicinal product.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines including sulfonamides, salicylates, phenylbutazone, β -adrenoreceptor antagonist, MAOIs, ketoconazole, miconazole, thiazide diuretics, corticosteroids and oestrogens.

How to take DIANID TABLET

How much to take

The usual initial dose is 40 to 80 mg daily, gradually increased, if necessary, up to 320 mg daily. A single dose should not exceed 160 mg and when higher doses are required the dosage should be divided and taken twice daily with morning and evening meals.

When to take it

DIANID TABLET can be taken with food and non-alcoholic drinks.

How long to take it

You should continue to take these tablets for as long as your doctor tells you and do not stop taking the tablets or alter the dosage without consulting your doctor.

If you forget to take it

It is important to take your medicine every day as regular treatment works better. However, if you forget to take a dose of DIANID TABLET, take the next dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take too much (Overdose)

In the event of an accidental overdose, contact your doctor or the nearest hospital Accident & Emergency department immediately.

While you are using DIANID TABLET Things you must do

While taking DIANID TABLET you should:

- Follow a regular diet: it is important to eat regular meals, including breakfast and never to miss or delay a meal.
- Take your medicine regularly.

- Check your blood glucose regularly as recommended by your doctor.

- You should discuss with your doctor before stopping this medicinal product. Stopping could cause high blood sugar.

Things you must do

- Do not stop taking the tablets or alter the dosage without consulting your doctor.
- Do not use the tablets after expiry date shown on the pack.

Thing to be careful of

Tell your doctor if you are pregnant, thinking of becoming pregnant or breast-feeding or planning to breast-feed your baby.

Side effects

Nausea, diarrhea, gastric pain, constipation, vomiting, light-headedness, dizziness, rash, pruritus, urticaria, erythema, and flushing.

After using DIANID TABLET

Storage

Store at a temperature not exceeding 30°C. Protect from light and moisture. Keep medicine out of reach of children.

Disposal

2 years after manufacturing date.

Product description

What it looks like?

Round, flat, white tablet, having cross score on one surface.

Ingredients

Lactose, Disbasic Calcium Phosphate, Povidone (PVP K-30), Purified Water, Talc and Magnesium Stearate.

MAL NO: MAL19991013A

Manufacturer

BIOLAB CO., LTD.
625 Bangpoo Industrial Estate
Samutprakarn, Thailand.

Marketing Authorisation Holder

MEDISPEC (M) SDN.BHD

Date of revision

November 09, 2011

TABLET DIANID

Gliclazide 80 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TABLET DIANID
2. Sebelum mengambil TABLET DIANID
3. Cara menggunakan TABLET DIANID
4. Kesan-kesan sampingan
5. Cara penyimpanan TABLET DIANID

Apakah kegunaan TABLET DIANID

TABLET DIANID digunakan untuk mengekalkan gula dalam darah pada paras yang betul di kalangan dewasa dengan penyakit diabetes tidak bergantung kepada insulin apabila tidak dikawal dengan diet, senaman fizikal dan penurunan berat badan sahaja. .

Bagaimana TABLET DIANID

berfungsi

TABLET DIANID mengandungi ubat yang dipanggil Gliclazide. Ia adalah hipoglisemik sulfonylurea. Ia bertindak dengan merangsang pelepasan insulin daripada sel beta dalam pankreas dan seterusnya mengurangkan jumlah gula dalam darah.

Sebelum mengambil TABLET

DIANID

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil TABLET DIANID jika:

- Anda alergik (hipersensitif) terhadap gliclazide atau mana-mana bahan kandungan TABLET DIANID yang lain, ubat lain dalam kumpulan yang sama (sulphonylurea) dan ubat lain yang berkaitan (Hipoglisemik sulphonamide).
- Anda mengalami diabetes bergantung kepada insulin (jenis 1).
- Anda mempunyai badan keton dan gula dalam air kencing, diabetik pra-koma dan koma.
- Anda menghidap penyakit ginjal, hati atau tiroid yang teruk.
- Anda mengandungi atau menyusu.
- Anda mempunyai trauma teruk atau

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain termasuk sulfonamide, salicylate, phenylbutazone, β -adrenoreceptor antagonis, MAOIs, ketoconazole, miconazole, thiazide diuretik, kortikosteroid dan estrogen.

Cara menggunakan TABLET

DIANID

Berapa banyak harus diambil

Dos permulaan yang biasa ialah 40 hingga 80 mg sehari, beransur-ansur meningkat, jika perlu, sehingga 320 mg sehari. Dos tunggal tidak boleh melebihi 160 mg dan apabila dos lebih tinggi diperlukan, dos itu harus dibahagikan dan diambil dua kali sehari dengan makanan pagi dan petang.

Bila perlu diambil

TABLET DIANID boleh diambil dengan makanan dan minuman bukan alkohol.

Berapa lama perlu diambil

Anda harus terus mengambil tablet ini selagi doktor memberitahu anda dan jangan berhenti mengambil tablet atau mengubah dosis tanpa berunding dengan doktor.

Jika terlupa mengambil

Penting untuk anda mengambil ubat ini setiap hari kerana rawatan yang tetap berfungsi lebih baik. Namun, jika anda terlupa mengambil dos TABLET DIANID, ambil dos yang seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggenapkan dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dalam keadaan terlebih dos secara tidak sengaja, hubungi doktor atau bahagian kecemasan hospital terdekat dengan segera.

Semasa menggunakan TABLET

DIANID

- Periksa glukosa darah anda secara tetap sebagaimana yang disyorkan oleh doktor.

- Anda harus berbincang dengan doktor sebelum berhenti produk perubatan ini. Berhentinya boleh menyebabkan gula darah tinggi.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil tablet atau mengubah dosis tanpa berunding dengan doktor.

- Jangan ambil tablet selepas tarikh luput yang ditunjukkan pada pek.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Maklumkan doktor jika anda mengandungi, berfikir untuk menjadi mengandungi atau menyusu atau merancang untuk menyusu bayi anda.

Kesan-kesan sampingan

Meloya, cirit-birit, sakit gastrik, sembelit, muntah, berasa sedikit pitam, pening, ruam, pruritus, urtikaria, eritema dan merah muka.

Cara penyimpanan dan pelupusan

TABLET DIANID

Penyimpanan

Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Pelupusan

2 tahun selepas tarikh

pengilangan. **Maklumat lanjut**

Rupa dan warna produk

Bulat, rata, tablet putih, mempunyai goresan bersilang pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Lactose, Disbasic Calcium Phosphate, Povidone (PVP K-30), Purified Water, Talc dan Magnesium Stearate.

NO MAL: MAL19991013A

Pengilang

BIOLAB CO., LTD.

625 Bangpoo Industrial Estate
Samutprakarn, Thailand.

Pemegang Autorisasi Pemasaran

MEDISPEC (M) SDN.BHD

semasa jangkitan.

Sebelum mula mengambil

Jika anda mempunyai sejarah keluarga atau ketahui bahawa anda mempunyai keadaan keturunan dalam kekurangan glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) (sel darah merah yang luar biasa), hubungi doktor sebelum mengambil produk perubatan ini.).

Perkara yang perlu dilakukan

Ketika mengambil TABLET DIANID anda harus:

- Mengikut diet yang biasa: penting untuk anda makan makanan biasa, termasuk sarapan, dan tidak terlepas atau melambatkan makan.
- Ambil ubat anda secara tetap.

Tarikh kemas kini

November 09, 2011