

VACODIL TABLETS 6.25MG VACODIL TABLETS 25 MG

(Carvedilol Tablets 6.25 mg)

(Carvedilol Tablets 25 mg)

What is in this leaflet

1. What VACODIL is used for
2. How VACODIL works
3. Before you take VACODIL
4. How to take VACODIL
5. While you are using VACODIL
6. Side effects
7. After using VACODIL
8. Product description

WHAT IS VACODIL USED FOR

VACODIL contains a medicine called carvedilol. This belongs to a group of medicines called 'beta-blockers'. VACODIL is used to treat the chronic heart failure, high blood pressure (hypertension), angina (chest pain or discomfort that happens when your heart isn't getting enough oxygen).

HOW VACODIL WORKS

VACODIL works by making your blood vessels relax and widen. This helps to lower your blood pressure. If you have chronic heart failure, this makes it easier for your heart to pump blood around your body. If you have angina, this will help stop the chest pain.

BEFORE YOU TAKE VACODIL

When you must not take it

Do not take VACODIL if:

- you are allergic (hypersensitive) to carvedilol or any of the other ingredients of VACODIL
- you have ever had wheezing due to asthma or other lung diseases
- you have severe fluid retention (swelling of your hands, ankles and feet) which is being treated

by medicines given into one of your veins (intravenously)

- you have problems with your liver
- you have problems with your heart (for example 'heart block' or slow heart beat). VACODIL is not suitable for some people with certain types of heart problem
- you have very low blood pressure
- you have a problem with the acid levels in your blood ('metabolic acidosis')
- you have a growth on one of your adrenal glands ('phaeochromocytoma')

If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking VACODIL.

Before you start to take it

Check with your doctor or pharmacist before taking VACODIL if:

- you have problems with your kidneys
- you have diabetes (high blood sugar)
- you wear contact lenses
- you have problems with your blood vessels (peripheral vascular disease)
- you have ever had problems with your thyroid
- you have ever had a serious allergic reaction (for example, sudden swelling, causing difficulty breathing or swallowing, swelling of the hands, feet and ankles or a severe rash)
- you have an allergy and are having treatment to desensitise you
- you have problems with the blood circulation in your fingers and toes ('Raynaud's phenomenon')
- you have had a skin disorder called 'psoriasis', after taking beta-blocker medicines

- you have a type of angina called 'Prinzmetal's variant angina'

If any of the above apply to you, or if you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before you take VACODIL.

Tell your doctor or pharmacist if you are pregnant or trying to get pregnant, they will provide the best advice to you.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription and herbal medicines. This is because VACODIL can affect the way some medicines work. Also some other medicines can affect the way VACODIL works.

In particular, tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines:

- other medicines for your heart or blood pressure, including 'calcium channel blockers' (for example diltiazem or verapamil), digoxin and amiodarone
- catecholamine-depleting agents (for example reserpine and Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs, such as isocarboxide and phenelzine (used to treat depression))
- fluoxetine (used to treat depression)
- medicines for diabetes, such as insulin or metformin.
- clonidine (used to treat high blood pressure, migraine and flushing in the menopause).
- rifampicin (used to treat infections)
- ciclosporin (used after an organ transplant)
- non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, for example aspirin, indomethacin and ibuprofen)

- beta-agonist bronchodilators (used to treat chest tightness and wheezing due to asthma or other chest conditions (for example salbutamol and terbutaline sulphate))

HOW TO TAKE VACODIL

How much to take

Chronic heart failure:

When used for heart failure, treatment with VACODIL should be started by a specialist doctor.

- the usual starting dose is one 3.125 mg tablet twice a day for two weeks
- your doctor will then increase the dose slowly, over several weeks, up to 25 mg twice a day
- if you weigh more than 85 kg (187 lb) the dose may be increased up to 50 mg twice a day
- if you have stopped taking VACODIL for more than two weeks you should talk to your doctor. They will need you to go back to the starting dose again.

High blood pressure:

- the usual starting dose is 12.5 mg once a day for two days
- after two days the dose is usually 25 mg, once a day
- if your blood pressure is not under control, your doctor may increase your dose slowly, over several weeks up to 50 mg a day
- if you are elderly, you may not need any more than 12.5 mg a day to control your blood pressure

Angina:

Adults

- the usual starting dose is 12.5 mg twice a day for two days
- after two days the dose is usually 25 mg, twice a day

Elderly:

- your doctor will decide both your starting dose and the best dose for you to take in the longer term
- the usual maximum dose is 50 mg each day, taken in smaller amounts (divided doses)

When to take it

You should take your tablets at the same time as eating some food.

How long to take it

Treatment with VACODIL is a long-term therapy. Treatment should not be stopped abruptly but rather gradually reduced at weekly intervals. This is particularly important in the case of patients with concomitant coronary heart disease. Do not stop taking this medicine without talking to your doctor

If you forget to take it

If you forget to take a dose, take it as soon as you remember. However, if it is nearly time for the next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take too much (overdose)

If you take more VACODIL than you should or someone else takes your VACODIL, talk to a doctor or go to a hospital straight away. Take the medicine pack with you.

The following effects may happen if you have taken more tablets than you should: a slow heart beat, feeling dizzy or light headed, becoming breathless, wheezy or extremely tired.

WHILE YOU ARE USING VACODIL

Things you must do.

Always take VACODIL exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor if you are not sure. Swallow each tablet with a drink.

Things you must not do

Do not breast-feed, unless your doctor has told you to.

You may feel dizzy while taking VACODIL. This is more likely when you start treatment or if your treatment is changed, and when you drink alcohol. If this happens to you, do not drive or use any tools or machines.

Talk to your doctor if you notice any other problems that might affect driving, using tools or machines while you are taking VACODIL.

This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them even if their symptoms are the same as yours

Things to be careful of

If you are going to have an operation, tell the doctor that you are taking VACODIL. This is because some anaesthetics can lower your blood pressure, and it may become too low.

SIDE EFFECTS

Like all medicines VACODIL can cause side effects, although not everyone will get them.

Very common (affect more than 1 in 10 people):

- feeling dizzy
- headache
- feeling weak and tired
- problems with your heart. The signs include chest pains, tiredness, shortness of breath and swelling of your arms and legs
- low blood pressure. The signs include feeling dizzy or nausea

Feeling dizzy, having a headache and feeling weak and tired are usually mild and more likely to happen at the beginning of your treatment.

Common (affect less than 1 in 10 people):

- infections of the airway (bronchitis), lung (pneumonia), nose and throat (upper respiratory tract). The signs include wheezing, shortness of breath, chest tightness and sore throat
- Infections of the urinary tract which can cause problems in passing water
- low numbers of red blood cells (anaemia). The signs include feeling tired, pale skin, and being short of breath
- increase in weight
- increase in cholesterol levels (shown by a blood test)
- loss of control of blood sugar in people with diabetes
- feeling depressed
- problems with your sight, sore or dry eyes due to fewer tears being made
- a slow heart beat
- feeling dizzy or light-headed after standing up
- fluid retention. The signs include: overall swelling of your body, swelling of parts of your body for example your hands, feet, ankles and legs and an increase in how much blood you have in your body
- problems with blood circulation in your arms and legs. The signs include cold hands and feet, whiteness, tingling and pain in your fingers and a pain in your leg which gets worse when you walk
- breathing problems
- feeling sick or being sick
- diarrhea
- stomach upset / indigestion
- pain, possibly in your hands and feet

- problems with your kidneys, including changes to how often you pass urine

Uncommon (affect less than 1 in 100 people)

- disturbed sleep
- tainting
- tingling or numbness of your hands or feet
- problems with your skin, including skin rashes which may cover a lot of your body, a lumpy rash (hives), feeling itchy and dry skin patches
- increased sweating
- hair loss
- being unable to get an erection (erectile dysfunction)
- constipation

Rare (affect less than 1 in 1,000 people):

- low numbers of platelets in your blood. The signs include bruising easily and nose bleeds
- a stuffy nose, wheezing and flu-like symptoms
- a dry mouth

Very rare (affect less than 1 in 10,000 people):

- low numbers of all types of white blood cells. The signs include infections of the mouth, gums, throat and lungs
- allergic (hypersensitivity) reactions. The signs may include difficulty breathing or swallowing caused by sudden swelling of the throat, or face or swelling of your hands, feet and ankles
- kidney problems which show up in a blood test
- some women may have difficulty with bladder control when they pass water (urinary incontinence). This normally will get better when treatment is stopped

VACODIL can also cause development of the signs of diabetes in people who have a very mild form of diabetes called 'latent diabetes'

If any of the side effects become serious or troublesome, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist

AFTER USING VACODIL

Storage

Store below 30°C. Store in the original container (sensitive to light)

Disposal

Do not throw away any left over tablets. Instead, return them to your pharmacist so that they can be disposed of carefully. Only keep them if your doctor tells you to

PRODUCT DESCRIPTION

What it looks like

Vacodil Tablet 6.25 mg: White to off-white, oval shaped, film-coated tablets debossed with 'F 57' on one side and deep break line on the other side.

Vacodil Tablet 25 mg: White to off-white, oval shaped, film-coated tablets debossed with 'F 59' on one side and deep break line on the other side.

Ingredients

Carvedilol Ph.Eur., Lactose Monohydrate Ph.Eur., Silica, Colloidal Anhydrous Ph.Eur., Crospovidone (Type A) Ph.Eur., Povidone Ph.Eur., Sucrose Ph.Eur., Crospovidone (Type B) Ph.Eur., Magnesium Stearate Ph.Eur., Purified Water

VACODIL 6.25MG TABLET :
MAL 09100262A
VACODIL 25 MG TABLET:
MAL 09100261A

MANUFACTURER

AUROBINDO PHARMA LIMITED,
Unit III, Survey No. 313,
Bachupally Village,
Quthubullapur Mandal,
Ranga Reddy District, (A.P.),
India.
Regd. Office: Plot No.: 2, Maitrivihar
Ameerpet, Hyderabad – 500 038,
Andhra Pradesh, India

REVIEW DATE

December 2011

MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

Unimed Sdn. Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur,
Malaysia

TABLET VACODIL 6.25 MG
TABLET VACODIL 25 MG
(Tablet Carvedilol 6.25 mg)
(Tablet Carvedilol 25 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan VACODIL
2. Bagaimana VACODIL berfungsi
3. Sebelum mengambil VACODIL
4. Cara menggunakan VACODIL
5. Semasa menggunakan VACODIL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Selepas menggunakan VACODIL
8. Maklumat Lanjut

APAKAH KEGUNAAN VACODIL

VACODIL mengandungi ubat yang dikenali sebagai carvedilol. Ia tergolong dalam kelas ubat yang dipanggil “beta-blockers”. VACODIL digunakan untuk merawat kegagalan fungsi jantung yang kronik, tekanan darah tinggi (hipertensi), angina (sakit dada atau ketidakselesaan yang berlaku apabila jantung anda tidak mendapat bekalan oksigen yang mencukupi).

BAGAIMANA VACODIL BERFUNGSI

VACODIL berfungsi dengan merehatkan dan melonggarkan saluran darah anda. Ini membantu untuk menurunkan tekanan darah anda. Jika anda mempunyai kegagalan fungsi jantung yang kronik, ia memudahkan jantung anda untuk mengempam darah ke seluruh badan. Jika anda mengalami angina, ini akan membantu dalam memberhentikan sakit dada.

SEBELUM MENGAMBIL VACODIL

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Vacodil jika anda:

- alah (hipersensitif) terhadap carvedilol atau mana-mana bahan-bahan lain VACODIL.
- pernah mengalami pernafasan berdehrit yang disebabkan oleh asma atau penyakit paru-paru lain.
- mengalami pengumpulan bendalir yang serius (bengkak pada tangan, buku lali dan kaki) yang sedang dirawat dengan ubat yang ditujukan kepada salah satu urat anda (secara intravena).
- mempunyai masalah hati.
- mempunyai masalah jantung (contohnya “sekat jantung” atau denyutan jantung yang perlahan). VACODIL tidak sesuai bagi sesetengah orang yang mempunyai masalah jantung tertentu.
- mempunyai tekanan darah yang sangat rendah.
- mempunyai masalah dengan paras asid dalam darah anda ('asidosis metabolik').
- mempunyai pertumbuhan pada salah satu kelenjar adrenal anda (“phaeochromocytoma”).

Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil VACODIL.

Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil VACODIL jika anda:

- mempunyai masalah buah pinggang
- mempunyai masalah diabetes (kandungan gula dalam darah yang tinggi)
- anda menggunakan kanta lekap
- mempunyai masalah dengan saluran darah anda (penyakit vaskular periferai)
- pernah mempunyai masalah dengan tiroid
- pernah mempunyai reaksi alahan yang serius (misalnya, bengkak secara tiba-tiba, kesukaran bernafas dan

menelan, bengkak pada tangan, kaki dan buku lali atau ruam yang serius)

- mempunyai alahan dan sedang menjalani rawatan untuk mengurangkan kepekaan anda
- mempunyai masalah dengan peredaran darah pada jari dan jari kaki (fenomena “Raynaud”)
- telah mempunyai penyakit kulit yang dipanggil 'psoriasis', setelah mengambil ubat “beta-blocker”
- mempunyai jenis angina yang dikenali sebagai “Prinzmetal’s variant angina”

Jika mana-mana di atas berlaku pada anda, atau jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil VACODIL.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil atau cuba untuk hamil, mereka akan menawarkan nasihat yang terbaik untuk anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil apa-apa ubat. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dan ubat herba. Ini adalah kerana VACODIL boleh menjejaskan cara sesetengah ubat berfungsi. Di samping itu, sesetengah ubat lain juga boleh mempengaruhi fungsi VACODIL.

Khususnya, beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan yang berikut:

- ubat-ubatan lain untuk jantung atau tekanan darah anda, termasuk 'penghalang saluran kalsium' (contoh diltiazem atau verapamil), digoxin dan amiodarone
- ejen pengurangan Catecholamine (contohnya

reserpine dan Monoamine oxidase inhibitor (MAOIs, seperti isocarboxide dan phenelzine (digunakan untuk merawat kemurungan)

- fluoxetine (untuk merawat kemurungan)
- ubat kencing manis, seperti insulin atau metformin
- clonidine (merawat tekanan darah tinggi, migran dan kemerahan kulit dalam menopause)
- rifampicin (digunakan untuk merawat infeksi)
- ciclosporin (digunakan selepas pemindahan organ)
- non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, contohnya aspirin, indomethacin dan ibuprofen)
- bronchodilators beta-agonist (untuk merawat rasa kesesakan pada dada dan pernafasan berdehrit yang disebabkan oleh asma atau keadaan dada yang lain (misalnya salbutamol dan terbutaline sulphate)

CARA MENGGUNAKAN VACODIL

Berapa banyak harus diambil

Kegagalan fungsi jantung yang kronik:

Apabila digunakan untuk rawatan kegagalan fungsi jantung, rawatan dengan VACODIL harus dimulakan oleh doktor pakar.

- Dos permulaan yang biasa adalah satu tablet 3.125 mg dua kali sehari selama dua minggu
- Doktor anda akan meningkatkan dos dengan perlahan-lahan, selepas beberapa minggu, sehingga 25 mg dua kali sehari
- Jika berat anda lebih daripada 85 kg (187 lb) dos boleh dinaikkan sehingga 50 mg dua kali sehari
- Jika anda telah berhenti mengambil VACODIL lebih daripada dua minggu, anda perlu berbincang dengan doktor anda. Mereka akan memerlukan

anda untuk kembali kepada dos permulaan.

Tekanan darah tinggi:

- Dos permulaan yang biasa adalah 12.5 mg sekali sehari selama dua hari
- Dos biasanya selepas dua hari adalah 25 mg sekali sehari
- Jika tekanan darah anda tidak terkawal, doktor anda boleh meningkatkan dos secara perlahan-lahan selama beberapa minggu sehingga 50 mg sehari
- Jika anda warga tua, anda mungkin tidak memerlukan lebih daripada 12.5 mg sehari untuk mengawal tekanan darah anda

Angina:

Dewasa

- Dos permulaan yang biasa adalah 12.5 mg dua kali sehari selama dua hari
- Selepas dua hari dos biasanya adalah 25 mg dua kali sehari

Warga Tua:

- Doktor anda akan memutuskan kedua-dua dos permulaan dan dos yang terbaik untuk anda mengambil dalam jangka masa panjang
- Dos maksimum yang biasa ialah 50 mg setiap hari, diambil dalam jumlah yang lebih kecil (dos dibahagikan)

Bila perlu diambil

Anda perlu mengambil VACODIL pada masa yang sama semasa makan.

Berapa lama perlu diambil

Rawatan dengan VACODIL adalah terapi jangka masa panjang. Rawatan tidak seharusnya diberhentikan secara tiba-tiba tetapi sebaliknya secara beransur-ansur pada selang masa mingguan. Ini adalah penting bagi pesakit berpenyakit jantung koronari. Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil dengan secepat mungkin yang anda ingat. Jika ia hampir untuk dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk mengganti untuk dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih dos VACODIL yang sepatutnya atau orang lain mengambil dos VACODIL anda, berbincang dengan doktor atau pergi ke hospital segera. Bawa pek ubat bersama dengan anda. Kesan berikut boleh berlaku jika anda telah mengambil dos yang berlebihan: denyupan jantung yang perlahan, rasa pening atau sakit kepala, pernafasan tercurung-cungap, "wheezzy" atau sangat penat.

SEMASA MENGGUNAKAN VACODIL

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mengambil VACODIL seperti yang ditetapkan oleh doktor kepada anda. Anda perlu menyepak dengan doktor jika anda tidak pasti. Telan setiap tablet dengan minuman.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menyusukan bayi, melainkan jika dibenarkan oleh doktor.

Anda mungkin berasa pening ketika mengambil VACODIL. Ini adalah berkemungkinan apabila anda memulakan rawatan atau jika rawatan anda berubah, dan apabila anda minum alkohol. Jika ia berlaku kepada anda, jangan memandu atau menggunakan apa-apa alat atau mesin. Berbincang dengan doktor anda jika anda

mendapati masalah-masalah lain yang mungkin menjejaskan pemanduan, menggunakan alat-alat atau mesin semasa anda mengambil VACODIL.

Ubat ini telah ditetapkan untuk anda. Jangan berikan kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka walaupun tanda-tanda mereka adalah sama seperti anda.

Perkara yang perlu diambil perhatian

Jika anda bakal menjalani pembedahan, beritahu doktor bahawa anda mengambil VACODIL. Ini adalah kerana sesetengah bahan bius boleh merendahkan tekanan darah anda, dan mungkin menjadi terlalu rendah.

KESAN-KESAN SAMPINGAN

Seperti ubat-ubatan lain, VACODIL boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mendapatnya.

Sangat biasa (menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang):

- rasa pening
- sakit kepala
- rasa lemah dan letih
- masalah dengan jantung anda. Tanda-tanda termasuk sakit dada, keletihan, sesak pernafasan dan bengkak pada tangan dan kaki anda
- tekanan darah rendah. Tanda-tanda termasuk rasa pening atau loya

Rasa pening, sakit kepala dan berasa lemah serta letih biasanya ringan dan lebih cenderung berlaku pada peringkat awal rawatan anda.

Biasa (memberi kesan kurang daripada 1 dalam 10 orang):

- jangkitan pada saluran pernafasan (bronchitis), paru-paru (pneumonia), hidung dan

tekak (saluran pernafasan atas). Tanda-tanda termasuk bunyi berdehit, sesak pernafasan, rasa kesesakan dada dan sakit tekak

- jangkitan saluran air kencing yang boleh menimbulkan masalah membuang air kencing
- bilangan sel-sel darah merah yang rendah (anemia). Tanda-tanda termasuk rasa letih, kulit pucat, dan sesak pernafasan
- pertambahan berat badan
- peningkatan tahap kolestrol (yang ditunjukkan oleh ujian darah)
- kehilangan kawalan gula dalam darah bagi pesakit diabetes
- rasa tertekan
- masalah dengan penglihatan, sakit atau kering mata kerana kekurangan air mata
- denyutan jantung yang lambat
- rasa pening ketika berdiri
- pengumpulan bendalir. Tanda-tanda termasuk: bengkak pada keseluruhan badan, bengkak bahagian badan seperti tangan, kaki, buku lali dan kaki dan peningkatan dalam seberapa banyak darah di dalam badan anda
- masalah dengan peredaran pada lengan dan kaki. Tanda-tanda termasuk kesejukan tangan dan kaki, keputihan, berdenyut-denyut dan kesakitan pada jari dan kaki anda dimana menjadi lebih serius apabila anda berjalan
- masalah pernafasan
- rasa sakit atau sakit
- cirit-birit
- ketidak selesaan perut/ketidakhadaman
- kesakitan, mungkin pada tangan dan kaki anda
- masalah dengan buah pinggang anda, termasuk perubahan kepada kekerapan anda membuang air

Luar biasa (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 100 orang):

- gangguan tidur
- pengsan
- berdenyut-denyut atau rasa kebas pada tangan atau kaki anda
- masalah dengan kulit anda, termasuk ruam kulit yang mungkin meliputi seluruh badan, ruam berketulan (kegatalan), tompok-tompok kulit yang berasa gatal dan kering
- tambah berpeluh
- rambut gugur
- tidak bermampuan untuk ereksi (ketidakfungsian ereksi)
- sembelit

Jarang (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1,000 orang):

- bilangan platlet yang rendah di dalam darah anda. Tanda-tanda termasuk mudah lebam dan berdarah hidung
- hidung tersumbat, pernafasan berbunyi dan kelihatan seperti selsema
- mulut kering

Sangat jarang (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10,000 orang):

- bilangan rendah semua jenis sel darah putih. Tanda-tanda termasuk jangkitan pada mulut, gusi, tekak dan paru-paru
- tindak balas alahan (hipersensitif). Tanda-tanda termasuk kesukaran bernafas dan menelan disebabkan oleh bengkak tekak atau muka secara tiba-tiba, atau bengkak pada tangan, kaki dan buku lali
- masalah buah pinggang yang ditunjukkan dalam ujian darah
- sesetengah wanita mungkin mengalami kesukaran dengan kawalan pundi kencing apabila mereka membuang air (inkontinen kencing). Biasanya ia akan menjadi lebih baik apabila rawatan dihentikan

VACODIL juga boleh menyebabkan tanda-tanda diabetes bagi orang yang mempunyai diabetes yang sangat

ringan yang dikenali sebagai "latent diabetes".

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius atau menyusahkan, atau jika anda dapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

SELEPAS MENGGUNAKAN VACODIL

Cara penyimpanan

Simpan di bawah 30 ° C. Simpan di dalam bekas asal (sensitif kepada cahaya).

Pelupusan

Jangan buang apa-apa tablet yang ditinggalkan. Sebaliknya, kembalikan kepada ahli farmasi anda supaya tablet boleh dilupuskan secara berhati-hati.

TARIKH SEMAKAN

Disember 2011

Hanya simpan jika diberitahu oleh doktor anda.

MAKLUMAT LANJUT

Rupa dan warna

Tablet VACODIL 6.25 mg: Putih kepada keputihan, berbentuk bujur, bersalut filem dan lekuk dalam dengan perkataan 'F 57' pada satu permukaan dan garisan yang mendalam pada permukaan sebelahnyanya.

Tablet VACODIL 25 mg: Putih kepada keputihan, berbentuk bujur, bersalut filem dan lekuk dalam dengan perkataan 'F 59' pada satu permukaan dan garisan yang mendalam pada permukaan sebelahnyanya.

Bahan-bahan kandungan

Carvedilol Ph.Eur., Lactose Monohydrate Ph.Eur., Silica, Colloidal Anhydrous

Ph.Eur., Crospovidone (Type A) Ph.Eur., Povidone Ph.Eur., Sucrose Ph.Eur., Crospovidone (Type B) Ph.Eur., Magnesium Stearate Ph.Eur., Purified Water

TABLET VACODIL 6.25MG:

MAL 09100262A

TABLET VACODIL 25 MG:

MAL 09100261A

PENGILANG

AUROBINDO PHARMA LIMITED,

Unit III, Survey No. 313, Bachupally Village,

Quthbullapur Mandal, Ranga Reddy District, (A.P.), India.

Regd. Office: Plot No.: 2, Maitrivihar

Ameerpet, Hyderabad – 500 038, Andhra Pradesh, India

PEMEGANG KEBENARAN PEMASARAN

Unimed Sdn. Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur,
Malaysia