

PIL Title : Sildenafil citrate  
PIL Date : 23 March 2012  
Country : Malaysia  
Ref PIL : UK PIL Nov 2007  
Reason : Updated PIL for VIAGRA and add in MAL number

PIL

## PFIZER

### PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

#### VIAGRA 25mg, 50mg or 100mg film-coated tablets sildenafil citrate

#### **Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.**

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, please ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects get serious, or you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist

#### **In this leaflet:**

1. What VIAGRA is and what it is used for
2. Before you take VIAGRA
3. How to take VIAGRA
4. Possible side effects
5. How to store VIAGRA
6. Further information

### **1. WHAT VIAGRA IS AND WHAT IT IS USED FOR**

VIAGRA belongs to a group of medicines called phosphodiesterase type 5 inhibitors. It works by helping to relax the blood vessels in your penis, allowing blood to flow into your penis when you get sexually excited. VIAGRA will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. You should not take VIAGRA if you do not have erectile dysfunction. You should not take VIAGRA if you are a woman.

VIAGRA is a treatment for men with erectile dysfunction, sometimes known as impotence. This is when a man cannot get, or keep a hard, erect penis suitable for sexual activity.

### **2. BEFORE YOU TAKE VIAGRA**

#### **Do not take VIAGRA**

- If you are taking medicines containing nitrates, or nitric oxide donors such as amyl nitrite ("poppers"). These medicines are often given for relief of angina pectoris (or "chest pain"). VIAGRA can cause a serious increase in the effects of these medicines. Tell your doctor if you are taking any of these medicines. If you are not certain, ask your doctor or pharmacist.
- If you are allergic (hypersensitive) to sildenafil or any of the other ingredients of VIAGRA.

- If you have a severe heart or liver problem.
- If you have recently had a stroke or a heart attack, or if you have low blood pressure.
- If you have certain rare inherited eye diseases (such as retinitis pigmentosa).
- If you have ever had loss of vision because of non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)

### **Take special care with VIAGRA**

Tell your doctor

- if you have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), leukaemia (cancer of blood cells), multiple myeloma (cancer of bone marrow) or any disease or deformity of your penis. These conditions may require special care when taking medicines for erectile dysfunction.
- if you have problems with your heart. Your doctor should in that case carefully check whether your heart can take the additional strain of having sex.
- if you currently have a stomach ulcer, or a bleeding disorder (such as haemophilia).
- if you experience sudden decrease or loss of vision, stop taking VIAGRA and contact your doctor immediately.

You should not use VIAGRA with any other treatment for erectile dysfunction.

#### *Special considerations for children*

VIAGRA should not be given to children under the age of 18.

#### *Special considerations for patients with kidney or liver problems*

You should tell your doctor if you have kidney or liver problems. Your doctor may decide on a lower dose for you.

### **Using other medicines**

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken other medicines, including medicines obtained without prescription.

VIAGRA tablets may interfere with some medicines, especially those used to treat chest pain. In the event of a medical emergency, you should tell anyone treating your condition that you have taken VIAGRA. Do not take VIAGRA with other medicines unless your doctor tells you that you can.

VIAGRA may cause a serious increase in the effects of medicines called nitrates, and nitric oxide donors such as amyl nitrite ("poppers"). These are often used for the relief of angina pectoris (or "chest pain"). You should NOT take VIAGRA if you are taking these medicines.

If you are taking protease inhibitors, such as for the treatment of HIV, your doctor may start you on the lowest dose (25 mg) of VIAGRA.

Some patients who take alpha-blocker therapy for the treatment of high blood pressure or prostate problems may experience dizziness or light-headedness upon standing. These are symptoms of postural hypotension which is low blood pressure upon sitting or standing up quickly. Certain patients have experienced these symptoms when taking VIAGRA with alpha-blockers. This is most likely to occur within 4 hours after taking VIAGRA. In order to reduce the likelihood that these symptoms occur, you should be on a regular daily dose of your alpha-blocker before you start VIAGRA. Your doctor may start you on a 25 mg dose of VIAGRA.

### **Using VIAGRA with food and drink**

When VIAGRA is taken with food, it may take a little longer for VIAGRA to work.

### **Pregnancy and Breast-feeding**

VIAGRA is not indicated for use by women

### **Driving and using machines**

VIAGRA can cause dizziness and can affect vision. You should be aware of how you react to VIAGRA before you drive or use machinery.

## **Important information about some of the ingredients of VIAGRA**

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, such as lactose, contact your doctor before taking VIAGRA.

## **3. HOW TO TAKE VIAGRA**

Always take VIAGRA exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. The usual dose is 50 mg.

You should take VIAGRA about one hour before sexual activity. Swallow the tablet whole with some water.

If you have the impression that the effect of VIAGRA is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

VIAGRA will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. The amount of time VIAGRA takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour. You may find that VIAGRA takes longer to work if you take it with a heavy meal.

Drinking alcohol can temporarily impair the ability to get an erection. To get the maximum benefit from your medicine, you are advised not to drink large amounts of alcohol before taking VIAGRA.

If VIAGRA does not help you to get an erection, or if your erection does not last long enough for you to complete sexual intercourse you should tell your doctor.

***You should not use VIAGRA more than once a day.***

### **If you take more VIAGRA than you should:**

A dose above 100 mg does not increase the efficacy. However, it will result in an increase in undesirable effects and their severity.

***You should not take more tablets than your doctor tells you to.***

Contact your doctor if you take more tablets than you should.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

## **4. POSSIBLE SIDE EFFECTS**

Like all medicines, VIAGRA can cause side effects although not everybody gets them. These effects are normally mild to moderate.

In controlled clinical trials the most common side effects were headache or facial flushing and less commonly indigestion, dizziness, stuffy nose, pounding heartbeat, or effects on vision (including colour tinge to vision, increased brightness of light or blurred vision).

Since its introduction on the market, the following events have been reported in men taking VIAGRA: vomiting, allergic reactions, skin rash, bloodshot eyes, eye pain, rapid heartbeat or nosebleed. Partial, sudden, temporary, or permanent decrease or loss of vision in one or both eyes have been reported. Prolonged and sometimes painful erections have been reported after taking VIAGRA. If you have such an erection which lasts continuously for more than 4 hours, you should contact a doctor immediately.

Also, the following events have been reported: high blood pressure, low blood pressure, fainting, stroke, irregular heartbeat, chest pain, sudden death, heart attack or temporary decreased blood flow to parts of the brain.

Most, but not all, of these men had heart problems before taking this medicine. It is not possible to determine whether these events were directly related to VIAGRA.

If you have chest pains during or after intercourse you should not use nitrates but you should contact your doctor immediately.

Muscle aches can occur if VIAGRA is taken more frequently than once a day.

If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet please tell your doctor.

## **5. HOW TO STORE VIAGRA**

Keep out of the reach and sight of children.

Do not store above 30°C.

Store in the original package, in order to protect from moisture.

Do not use VIAGRA after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of the month.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

## **6. FURTHER INFORMATION**

### **What VIAGRA contains**

- The active substance is sildenafil. Each tablet contains 25mg, 50 mg or 100mg of sildenafil (as the citrate).
- The other ingredients are:
  - Tablet core: microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate (anhydrous), croscarmellose sodium, magnesium stearate
  - Film coat: hypromellose, titanium dioxide (E171), lactose, triacetin, indigo carmine aluminium lake (E132)

### **What VIAGRA looks like and contents of the pack**

VIAGRA film-coated tablets are blue, with a rounded-diamond shape. They are marked "PFIZER" on one side and "VGR 25, "VGR 50" or "VGR 100" on the other side. The tablets are provided in blister packs containing 2, 4, 8 or 12 tablets. Not all pack sizes and strengths may be marketed.

### **Marketing Authorisation Holder and Manufacturer**

Marketing Authorisation Holder:

The company responsible for VIAGRA in Malaysia (the Marketing Authorisation Holder) is

Pfizer (M) Sdn Bhd  
Level 3 & 4, Bangunan Palm Grove  
No 14, Jalan Glenmarie (Persiaran Kerjaya)  
Section U1, 40150 Shah Alam,  
Selangor, Malaysia.

Manufacturers:  
Pfizer Inc.  
630, Flushing Avenue,  
Brooklyn, New York,  
11206, USA.

Pfizer Australia Pty Limited  
38-42 Wharf Road, West Ryde,  
NSW 2114, Australia.

### **MAL Number**

MAL20012709AS (Viagra Tablet 25mg)  
MAL20012710AS (Viagra Tablet 50mg)  
MAL20012711AS (Viagra Tablet 100mg)

VGR-0312

PIL Title : Sildenafil citrate  
PIL Date : 23 March 2012  
Country : Malaysia  
Ref PIL : UK PIL Nov 2007  
Reason : Updated PIL for VIAGRA and add in MAL number

PIL

## PFIZER

### RISALAH PEMBUNGKUSAN: MAKLUMAT UNTUK PENGGUNA

#### VIAGRA 25mg, 50mg atau 100mg tablet bersalut filem sildenafil citrate

**Sila baca semua isi kandungan risalah ini dengan teliti sebelum mula mengambil ubat ini.**

- Sila simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya semula.
- Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lanjut, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.
- Ubat ini telah dipreskribkan untuk anda. Jangan memberikannya kepada orang lain. Ia mungkin mencederakan mereka, walaupun sekiranya simptom mereka adalah sama seperti anda.
- Sekiranya sebarang daripada kesan sampingan menjadi serius, atau anda perasan sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

#### **Di dalam risalah ini:**

1. Apakah VIAGRA dan apakah kegunaannya
2. Sebelum mengambil VIAGRA
3. Cara menggunakan VIAGRA
4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin
5. Cara menyimpan VIAGRA
6. Maklumat lanjut

### **1. APAKAH VIAGRA DAN APAKAH KEGUNAANNYA**

VIAGRA tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil *phosphodiesterase type 5 inhibitors*. Ia berfungsi dengan membantu mengendurkan pembuluh darah pada zakar anda, membolehkan darah untuk mengalir ke dalam zakar anda apabila anda mengalami rangsangan seksual. VIAGRA hanya akan membantu anda untuk mengalami ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual. Anda tidak boleh mengambil VIAGRA sekiranya anda tidak mengalami disfungsi erektil. Anda tidak boleh mengambil VIAGRA sekiranya anda seorang wanita.

VIAGRA adalah rawatan untuk lelaki mengalami disfungsi erektil, kadang kala dikenali sebagai mati pucuk. Ini adalah apabila seorang lelaki tidak boleh mengalami, atau mengekalkan zakar keras dan tegang yang sesuai untuk aktiviti seksual.

### **2. SEBELUM MENGAMBIL VIAGRA**

#### **Jangan mengambil VIAGRA**

- Sekiranya anda mengambil ubat mengandungi *nitrites*, atau *nitric oxide donors* seperti *amyl nitrite* ("poppers"). Ubat-ubat ini selalunya diberikan untuk kelegaan daripada

angina pektoris (atau "sakit dada"). VIAGRA boleh menyebabkan peningkatan serius dalam kesan ubat-ubat ini. Sila beritahu doktor anda sekiranya anda mengambil sebarang daripada ubat-ubat ini. Jika anda tidak pasti, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Sekiranya anda alergi (hipersensitif) kepada sildenafil atau mana-mana daripada bahan-bahan kandungan lain VIAGRA.
- Sekiranya anda menghidapi penyakit jantung atau hati yang teruk.
- Sekiranya anda baru-baru ini telah mengalami serangan angin ahmar atau jantung, atau sekiranya anda menghidapi tekanan darah rendah.
- Sekiranya anda menghidapi penyakit mata diwarisi yang jarang (seperti retinitis pigmentosa).
- Sekiranya anda pernah mengalami hilang penglihatan disebabkan oleh optik neuropati iskemik anterior bukan arteritis (*non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION*).

### **Sila ambil penjagaan khas dengan VIAGRA**

Sila beritahu doktor anda

- jika anda menghidapi anemia sel sabit (suatu keabnormalan sel darah merah), leukemia (kanser sel darah), *multiple myeloma* (kanser sumsum tulang) atau sebarang penyakit atau kecacatan zakar anda. Penyakit-penyakit ini mungkin memerlukan penjagaan khas apabila mengambil ubat untuk disfungsi erektil.
- jika anda mempunyai masalah dengan jantung anda. Doktor anda sepatutnya dalam hal itu dengan teliti memeriksa sama ada jantung anda boleh menghadapi tekanan tambahan daripada melakukan hubungan seksual.
- jika anda baru-baru ini menghidapi ulser perut, atau *bleeding disorder* (seperti hemofilia).
- jika anda mengalami pengurangan atau kehilangan penglihatan tiba-tiba, berhenti mengambil VIAGRA dan hubungi doktor anda dengan segera.

Anda tidak boleh menggunakan VIAGRA dengan sebarang rawatan lain untuk disfungsi erektil.

*Pertimbangan khas untuk kanak-kanak*

VIAGRA tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

*Pertimbangan khas untuk pesakit menghidapi penyakit ginjal atau hati*

Anda harus memberitahu doktor anda sekiranya anda menghidapi penyakit ginjal atau hati. Doktor anda mungkin memutuskan dos yang lebih rendah untuk anda.

### **Menggunakan ubat-ubat lain**

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk ubat-ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Tablet VIAGRA mungkin mengganggu sesetengah ubat, terutamanya ubat-ubat yang digunakan untuk merawat sakit dada. Dalam kejadian kecemasan perubatan, anda harus memberitahu sesiapa yang merawat penyakit anda bahawa anda mengambil VIAGRA. Jangan mengambil VIAGRA dengan ubat-ubat lain melainkan doktor anda memberitahu anda bahawa anda boleh mengambilnya.

VIAGRA mungkin menyebabkan peningkatan serius dalam kesan ubat-ubat dipanggil *nitrates*, dan *nitric oxide donors* seperti *amyl nitrite* ("poppers"). Ubat-ubat ini selalunya digunakan untuk kelegaan daripada angina pektoris (atau "sakit dada"). Anda TIDAK sepatutnya mengambil VIAGRA sekiranya anda sedang mengambil ubat-ubat ini.

Sekiranya anda sedang mengambil *protease inhibitors*, seperti untuk rawatan HIV, doktor anda mungkin memulakan anda pada dos VIAGRA yang paling rendah (25 mg).

Sesetengah pesakit yang mengambil terapi *alpha-blocker* untuk rawatan tekanan darah tinggi atau masalah prostat mungkin mengalami kepening atau pening-pening lalat sebaik berdiri. Kesan-kesan ini adalah simptom hipotensi postural yang mana merupakan tekanan darah rendah sebaik duduk atau berdiri dengan cepat. Pesakit-pesakit tertentu telah mengalami simptom-simptom ini apabila mengambil VIAGRA dengan *alpha-blocker*. Ini paling berkemungkinan berlaku dalam masa 4 jam selepas mengambil VIAGRA. Bagi mengurangkan kemungkinan bahawa simptom-simptom ini berlaku, anda harus menggunakan dos harian tetap

*alpha-blocker* sebelum memulakan VIAGRA. Doktor anda mungkin memulakan anda pada dos VIAGRA 25 mg.

### **Menggunakan VIAGRA dengan makanan dan minuman**

Apabila VIAGRA diambil dengan makanan, ia mungkin mengambil sedikit masa yang lebih lama untuk VIAGRA memberikan kesan.

### **Kehamilan dan Penyusuan badan**

VIAGRA tidak boleh digunakan oleh wanita.

### **Pemanduan dan penggunaan mesin**

VIAGRA boleh menyebabkan kepeningan dan boleh menjejaskan penglihatan. Anda harus tahu bagaimana anda bergerak balas kepada VIAGRA sebelum anda memandu atau menggunakan mesin.

### **Maklumat penting mengenai sesetengah daripada bahan-bahan kandungan VIAGRA**

Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda menghadapi intolerans kepada sesetengah gula, seperti laktosa, sila hubungi doktor anda sebelum mengambil VIAGRA.

## **3. CARA MENGGUNAKAN VIAGRA**

Sila sentiasa mengambil VIAGRA dengan tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda harus memeriksa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. Dos biasa adalah 50 mg.

Anda harus mengambil VIAGRA kira-kira satu jam sebelum aktiviti seksual. Sila telan tablet bulat-bulat dengan sedikit air.

Sekiranya anda mempunyai tanggapan bahawa kesan VIAGRA adalah terlalu kuat atau terlalu lemah, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

VIAGRA hanya akan membantu anda untuk mendapat ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual. Jumlah masa diambil VIAGRA untuk memberikan kesan berbeza-beza daripada seseorang ke seseorang, tetapi ia biasanya mengambil masa di antara setengah jam dan satu jam. Anda mungkin mendapati bahawa VIAGRA mengambil masa lebih lama untuk berkesan sekiranya anda mengambilnya dengan hidangan berat.

Meminum alkohol boleh secara sementara melemahkan keupayaan untuk mendapat ereksi. Bagi mendapat faedah maksimum daripada ubat anda, anda adalah dinasihatkan untuk tidak meminum jumlah besar alkohol sebelum mengambil VIAGRA.

Sekiranya VIAGRA tidak membantu anda untuk mendapat ereksi, atau jika ereksi anda tidak berterusan secukupnya untuk anda melengkapkan hubungan seksual anda harus memberitahu doktor anda.

***Anda tidak boleh menggunakan VIAGRA lebih daripada sekali sehari.***

### **Jika anda mengambil VIAGRA lebih daripada yang anda sepatutnya ambil:**

Dos melebihi 100 mg tidak meningkatkan keberkesanan. Walau bagaimanapun, ia akan mengakibatkan peningkatan dalam kesan-kesan tidak diingini dan keterukan mereka.

***Anda tidak boleh mengambil tablet lebih daripada yang doktor anda telah memberitahu anda.***

Sila hubungi doktor anda jika anda mengambil tablet lebih daripada yang anda sepatutnya ambil.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

## 4. KESAN-KESAN SAMPINGAN YANG MUNGKIN

Sepertimana semua ubat, VIAGRA boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan meskipun tidak setiap orang mengalaminya. Kesan-kesan ini adalah biasanya ringan hingga sederhana.

Dalam kajian klinikal yang dikawal kesan-kesan sampingan paling lazim adalah sakit kepala atau muka panas kemerahan dan kurang lazim adalah ketakhadaman, kepeningan, hidung tersumbat, denyutan jantung kencang, atau kesan terhadap penglihatan (termasuk sedikit warna kepada penglihatan, peningkatan kecerahan cahaya atau kabur penglihatan).

Sejak pengenalannya ke pasaran, kejadian-kejadian berikut telah dilaporkan pada lelaki-lelaki yang mengambil VIAGRA: muntah-muntah, tindak balas alergi, ruam kulit, mata merah, sakit mata, denyutan jantung kencang atau hidung berdarah. Pengurangan separa, tiba-tiba, sementara, atau kekal atau kehilangan penglihatan pada sebelah atau kedua-dua belah mata telah dilaporkan. Ereksi berpanjangan dan kadang kala menyakitkan telah dilaporkan selepas mengambil VIAGRA. Sekiranya anda mengalami ereksi seperti itu yang berterusan untuk lebih daripada 4 jam, anda harus menghubungi doktor dengan segera.

Juga, kejadian-kejadian berikut telah dilaporkan: tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, pitam, angin ahmar, denyutan jantung tidak sekata, sakit dada, kematian mengejut, serangan jantung atau pengurangan sementara pengaliran darah ke bahagian-bahagian pada otak.

Kebanyakan, tetapi tidak semua, daripada lelaki-lelaki ini menghidapi penyakit jantung sebelum mengambil ubat ini. Ianya tidak mungkin untuk menentukan sama ada kejadian-kejadian ini adalah berkaitan secara langsung dengan VIAGRA.

Sekiranya anda mengalami sakit dada semasa atau selepas hubungan seksual anda tidak sepatutnya menggunakan nitrat tetapi anda harus menghubungi doktor anda dengan segera.

Sakit otot boleh berlaku sekiranya VIAGRA diambil dengan lebih kerap berbanding sekali sehari.

Sekiranya sebarang daripada kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perasan sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini sila beritahu doktor anda.

## 5. CARA PENYIMPANAN VIAGRA

Jauhkan ubat daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.

Simpan dalam pembungkusan asal, bagi melindunginya daripada kelembapan.

Jangan gunakan VIAGRA selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir dalam bulan tersebut.

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

## 6. MAKLUMAT LANJUT

### Apa kandungan VIAGRA

- Bahan aktif adalah sildenafil. Setiap tablet mengandungi 25mg, 50 mg atau 100mg sildenafil (sebagai sitrat).
- Bahan-bahan kandungan lain adalah:
  - Teras tablet: *microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate (anhydrous), croscarmellose sodium, magnesium stearate*
  - Salut filem: *hypromellose, titanium dioxide (E171), lactose, triacetin, indigo carmine aluminium lake (E132)*

### Rupa dan warna VIAGRA dan kandungan pek

Tablet VIAGRA bersalut filem adalah berwarna biru, dengan bentuk berlian dibulatkan. Mereka diukir dengan "PFIZER" pada satu belah dan "VGR 25, "VGR 50" atau "VGR 100" pada belah yang lain. Tablet disediakan dalam pek blister mengandungi 2, 4, 8 atau 12 tablet. Tidak semua saiz pek dan kekuatan mungkin dipasarkan.

## **Pemegang Kebenaran Pemasaran dan Pengilang**

Pemegang Kebenaran Pemasaran:  
Syarikat bertanggungjawab untuk VIAGRA di Malaysia (Pemegang Kebenaran Pemasaran)  
adalah

Pfizer (M) Sdn Bhd  
Level 3 & 4, Bangunan Palm Grove  
No 14, Jalan Glenmarie (Persiaran Kerjaya)  
Section U1, 40150 Shah Alam,  
Selangor, Malaysia.

Pengilang:  
Pfizer Inc.  
630, Flushing Avenue,  
Brooklyn, New York,  
11206, USA.

Pfizer Australia Pty Limited  
38-42 Wharf Road, West Ryde,  
NSW 2114, Australia.

### **Nombor MAL**

MAL20012709AS (Viagra Tablet 25mg)  
MAL20012710AS (Viagra Tablet 50mg)  
MAL20012711AS (Viagra Tablet 100mg)

VGR-0312