

GLIKLINE TABLETS 80MG

Gliclazide

What is in this leaflet

1. What Gliclazide is and what it is used for
2. Before you take Gliclazide Tablets
3. How to take Gliclazide Tablets
4. Possible side effects
5. Storing Gliclazide Tablets
6. Further Information
The tablets will be called Gliclazide Tablets in this leaflet.

What Gliclazide is used for

Gliclazide 80 mg is used to keep blood sugar at the correct level in adults with non-insulin dependent diabetes when it is not controlled by diet, physical exercise and weight loss alone.

How Gliclazide works

The active ingredient in your tablets, Gliclazide, is one of a group of medicines called sulphonylureas. It is an oral hypoglycaemic agent (blood sugar lowering drug).

Before you take Gliclazide

When you must not take it

Do not take Gliclazide 80mg

- If you are allergic (hypersensitive) to gliclazide or any of the other ingredients of Gliclazide 80mg, to other medicines of the same group (sulphonylureas), to other related medicines (hypoglycaemic sulphonamides)
- If you have insulin-dependent diabetes (type 1)
- if you have ketone bodies and sugar in your urine (this may mean you have keto-acidosis), a diabetic pre-coma and coma
- if you have severe kidney or liver disease
- if you are taking miconazole (a treatment for fungal infections)

- if you are breastfeeding
Gliclazide 80mg is not recommended for use in children.

Before you start to take it

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars (e.g. glucose, lactose, galactose), contact your doctor before taking this medicinal product.

Taking other medicines

The effect of Gliclazide 80mg on your blood sugar levels may be changed by a number of other medicines.

- You should not take Gliclazide 80mg with miconazole (a treatment for fungal infections)
- Make sure to tell your doctor if you are taking any of the following medicines, as special care may be required:
 - Phenylbutazone (used to treat arthritis)
 - Medicines containing alcohol
 - Danazol (used to treat breast disorders, heavy menstrual bleeding and endometriosis)
 - Other medicines used to treat high blood sugar (e.g. insulin)
 - Beta blockers (used to treat high blood pressure)
 - Fluconazole (an oral treatment for fungal infection)
 - Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors such as captopril, or enalapril (used to treat high blood pressure and heart failure)
 - H2 receptor antagonists for ulcer or dyspepsia
 - Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) used to treat depression
- If you go into hospital tell the medical staff you are taking Gliclazide 80mg
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

- Sulphonamides used to treat bacterial infections

- NSAIDs (anti-inflammatory agents for pain relief)

- Chlorpromazine (used to treat disorders of the central nervous system)

- Steroids (for treating a number of conditions including severe asthma and rheumatoid arthritis)

- Intravenous ritodrine and terbutaline (used during labour)

- Intravenous salbutamol (for asthma)

- Anticoagulants to control blood clotting (e.g. warfarin)

- If you go into hospital tell the medical staff you are taking Gliclazide 80mg

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

How to take Gliclazide Tablets

How much to take

Always take Gliclazide 80 mg exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. The usual dose is from one half to four tablets.

This depends on the response to treatment. When the total daily dose exceeds two tablets, it should be divided into two equal doses taken morning and evening. Your doctor will tell you how much to take.

When to take it

Swallow your tablets whole. Do not chew them.

Take your tablet(s) with a glass of water before a meal.

How long to take it

As the treatment for diabetes is usually life long, you should

discuss with your doctor before stopping this medicinal product. Stopping could cause high blood sugar (hyperglycaemia). If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

If you forget to take it

It is important to take your medicine every day as regular treatment works better. However, if you forget to take a dose of Gliclazide 80 mg, take the next dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take too much (overdose)

If you take too many tablets, contact your doctor or the nearest hospital Accident & Emergency department immediately. The signs of overdose are those of low blood sugar (hypoglycaemia) described in "Side Effects". The symptoms can be helped by taking sugar (4 to 6 lumps) or sugary drinks straight away, followed by a substantial snack or meal. If the patient is unconscious, immediately inform a doctor and call the emergency services.

While you are using Gliclazide

Things you must do

Follow your doctor's advice about diet and treatment. This is to reduce the chances of very low blood sugar (hypoglycaemia).

Make sure your doctor knows:

- If you have an operation, a serious injury, fever or infection, difficulty in eating
- If you plan a pregnancy or become pregnant
- If you are taking any of the medicines listed in "Taking other medicines"

Tell your dentist about your treatment.

Things you must not do

This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

Things to be careful of Dietary advice

This medicine may cause episodes of low blood sugar (hypoglycaemia).

This is more likely if:

- You are on a strict diet
- Your diet is poorly balanced
- You are taking prolonged or strenuous exercise
- You drink alcohol
- If you are taking several medicines for high blood sugar (see Taking other medicines)

If you have low blood sugar you may have the following symptoms: headache, intense hunger, nausea, vomiting, weariness, sleep disorders, restlessness, aggressiveness, poor concentration, reduced alertness and reaction time, depression, confusion, speech or visual disorders, tremor, sensory disturbances, dizziness, and helplessness.

The following signs and symptoms may also occur: sweating, clammy skin, anxiety, fast or irregular heart beat, high blood pressure, sudden strong pain in the chest that may radiate into nearby areas (angina pectoris).

If blood sugar levels continue to drop you may suffer from considerable confusion (delirium), develop convulsions, lose self control, your breathing may be shallow and your heart beat slowed down, you may become unconscious.

In most cases the symptoms of low blood sugar vanish very quickly when you consume some form of sugar, e.g. glucose tablets, sugar cubes, sweet juice, sweetened tea.

You should therefore always carry some form of sugar with you (glucose tablets, sugar cubes). Remember that artificial sweeteners are not effective. Please contact your doctor or the nearest hospital if taking sugar does not help or if the symptoms recur.

While taking GLICLAZIDE 80 mg you should:

- Follow a regular diet; it is important to eat regular meals, including breakfast and never to miss or delay a meal
- Take your medicine regularly (see How to take Gliclazide)
- Check your blood glucose regularly as recommended by your doctor

If you have a family history of or know you have the hereditary condition glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency (abnormality of red blood cells), contact your doctor before taking this medicinal product.

Taking Gliclazide 80mg with food and drink

Gliclazide 80mg can be taken with food and non-alcoholic drinks.

Drinking alcohol is not recommended as it can alter the control of your diabetes.

Pregnancy and breastfeeding

Gliclazide 80 mg is not recommended for use during pregnancy. If you are planning a pregnancy, or become pregnant, inform your doctor so that he may prescribe a more suitable treatment for you. You must not take 80 mg while you are breastfeeding. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

Provided your blood glucose levels are satisfactorily controlled on Gliclazide 80 mg, your ability to drive or use machines should not be affected. However, if your blood glucose

levels become too low, this could adversely affect your concentration, and therefore your ability to perform these tasks. Be especially careful at the start of treatment.

Side Effects

Like all medicines

GLICLAZIDE 80 mg can cause side effects, although not everybody gets them. Low blood sugar (Hypoglycaemia)

The most commonly observed side effect is low blood sugar (hypoglycaemia). For symptoms and signs (see Things to be careful of)

If left untreated these symptoms could progress to drowsiness, loss of consciousness or possibly coma. If an episode of low blood sugar is severe or prolonged, even if it is temporarily controlled by eating sugar, you should seek immediate medical attention.

Other side effects:

- Digestive disorders:
Abdominal pain, nausea, vomiting, indigestion, diarrhea and constipation. These effects are reduced when Gliclazide 80mg is taken with a meal as recommended.
- Skin disorders: Skin reactions such as rash, redness, itching and hives have been reported
- Blood disorders: Decrease in the number of cells in the blood (e.g. platelets, red and white blood cells), which may cause paleness, prolonged bleeding, bruising, sore throat and fever. These symptoms usually stop when the treatment is discontinued
- Liver disorders: There have been isolated reports of abnormal liver function which can cause yellow skin and eyes. If you get this see your doctor immediately. The symptoms generally disappear

if the drug is stopped. Your doctor will decided whether to stop your treatment.

- Eye disorders: Your vision may be affected for a short time, especially at the start of treatment. This effect is due to changes in blood sugar levels.

As for other sulphonylureas, the following adverse events have been observed: cases of severe changes in the number of blood cells and allergic inflammation of the wall of blood vessels, reduction in blood sodium (hyponatraemia), symptoms of liver impairment (e.g. jaundice) which in most cases disappeared after withdrawal of the sulphonylurea, but may lead to life threatening liver failure in isolated cases.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Storage and Disposal of Gliclazide

Keep out of the reach and sight of children. Do not use GLICLAZIDE 80 mg after the expiry date which is stated on the carton and the blister strip. The expiry date refers to the last day of that month. Store in the original package. This medicinal product does not require any special storage conditions. Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product Description

What it looks like

Gliclazide Tablets 80mg are white, round, flat beveled edge with a cross-line on one side and plain on reverse and come in cartons of 60 tablets.

Ingredients

The active substance is Gliclazide. One tablet contains 80mg of Gliclazide. The other ingredients are: sodium starch glycolate, isopropyl alcohol, magnesium stearate, povidone, maize starch, dioctyl sodium sulfosuccinate, lactose, colloidal silicon dioxide, microcrystalline cellulose.

MAL10110009AC

Manufacturer

Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd

1-5, Cheng Industrial Estate, Melaka, Malaysia

Date of Revision

16 April 2012

TABLET GLIKLINE 80MG

Gliclazide

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah dia Tablet Gliclazide dan apakah kegunaannya
 2. Sebelum anda mengambil Tablet Gliclazide
 3. Bagaimana untuk mengambil Tablet Gliclazide
 4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku
 5. Bagaimana untuk menyimpan Tablet Gliclazide
 6. Maklumat lanjut
- Tablet ini dipanggil Tablet Gliclazide di dalam risalah ini.

Apakah kegunaan Gliclazide

Gliclazide 80 mg digunakan untuk memastikan paras gula dalam darah berada dalam kadar yang betul pada seorang dewasa dengan diabetes bebas insulin, apabila ia tidak dapat dikawal dengan pemakanan seimbang, latihan fizikal, dan penurunan berat badan semata-mata.

Bagaimana Gliclazide berfungsi

Bahan aktif yang terdapat dalam ubat anda, iaitu gliclazide, adalah termasuk dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai sulphonylureas. Ia adalah agen hipoglisemia yang diambil secara oral (ubat untuk menurunkan paras gula dalam darah).

Sebelum mengambil Gliclazide

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Gliclazide 80mg

- Jika anda alah (hipersensitif) pada gliclazide ataupun bahan-bahan di dalam Gliclazide 80mg, pada ubat-ubatan lain yang berada dalam kumpulan yang sama (sulphonylureas), kepada ubat-ubatan lain yang berkaitan (hypoglycaemisulphonamides)

- Jika anda mempunyai diabetes bergantung kepada insulin (jenis 1)
- Jika anda mempunyai zat keton dan gula di dalam air kencing anda (ini mungkin kemudian anda mempunyai ketoasidosis), ‘diabetes pra-koma’ dan koma
- Jika anda mempunyai penyakit buah pinggang atau penyakit hati yang teruk
- Jika anda mengambil miconazole (sejenis ubat untuk merawat jangkitan kulat (Lihat “Jika mengambil ubat-ubat lain”)

Gliclazide 80mg tidak disyorkan untuk kegunaan kanak-kanak.

Sebelum mula mengambil

Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda alah kepada sesetengah jenis gula (contohnya seperti glukosa, laktosa, galaktosa), hubungi doktor anda sebelum mengambil produk ubatan ini.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Kesan Gliclazide 80mg ke atas paras gula dalam darah anda boleh berubah berdasarkan biloangan ubatan lain yang diambil.

- Anda tidak sepatutnya mengambil Gliclazide 80mg bersama dengan miconazole (satu rawatan untuk jangkitan kulat)
- Pastikan anda beritahu doktor anda jika sedang mengambil ubatan berikut, kerana perhatian khusus mungkin diperlukan
 - Phenylbutazone (digunakan untuk merawat arthritis)
 - Ubatan yang mengandungi alkohol
 - Danazol (digunakan untuk merawat penyakit berkaitan payudara, pendarahan

menstruasi yang terlalu banyak, dan endometriosis)

- Ubatan lain yang digunakan untuk merawat kandungan gula yang tinggi dalam darah (contohnya insulin)
 - Beta blockers (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi)
 - Fluconazole (rawatan secara oral untuk jangkitan kulat “angiotensin converting enzyme” (ACE) seperti captopril, atau enalapril (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan kegagalan jantung)
 - Ubat antagonis reseptor H2 untuk ulser dan dyspepsia
 - “monoamine oxidase inhibitors” (MAOIs), yang digunakan untuk merawat kemurungan
 - Sulphonamides yang digunakan untuk merawat jangkitan bacteria
 - NSAIDs (agen anti-keradangan untuk melegakan kesakitan)
 - Chlorpromazine (digunakan untuk merawat gangguan pada sistem saraf utama)
 - Steroids (untuk merawat beberapa keadaan termasuklah asma yang teruk, dan rheumatoid arthritis)
 - Ritodrine intravena dan terbutaline (digunakan semasa bersalin)
 - Salbutamol intravena (untuk penyakit asma)
 - Ubat antikoagulasi untuk mengawal pembekuan darah (contohnya warfarin)
 - Jika anda pergi ke hospital, sila beritahu pada staf perubatan di sana bahawa anda sedang mengambil Gliclazide 80mg
- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, atau telah

mengambil sebarang ubatan lain, termasuklah ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Gliclazide

Berapa banyak harus diambil
Sentiasa ambil Gliclazide80 mg dengan tepat seperti yang telah diarahkan oleh doktor anda. Anda perlu bertanya dengan doktor atau ahli farmasi anda jika tidak pasti. Kebiasaan dos ialah dari satu setengah ke empat tablet. Perkara ini bergantung kepada tindak balas anda terhadap rawatan. Apabila pengambilan keseluruhan dos anda setiap hari melebihi dua tablet, ia perlu dibahagikan samarata kepada dua dos yang diambil pada waktu pagi dan malam. Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak yang perlu diambil.

Bila perlu diambil

Telan tablet anda secara keseluruhan. Jangan kunyah. Ambil tablet anda bersama segelas air sebelum makan.

Berapa lama perlu diambil
Oleh sebab rawatan untuk diabetes selalunya diambil sepanjang hayat, anda harus berbincang dengan doktor anda sebelum menghentikan pengambilan produk ubatan ini. Berhenti mengambil ubat boleh menyebabkan gula dalam darah yang tinggi (hiperglisemia). Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut tentang produk ini, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa mengambil

Adalah penting untuk mengambil ubat anda setiap hari kerana rawatan secara teratur adalah lebih berkesan. Walaubagaimanapun, jika anda terlupa untuk mengambil satu dos GLICLAZIDE 80 mg, ambil dos seterusnya pada masa yang biasa

anda ambil. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak tablet, hubungi doktor anda atau pergi ke bahagian kemalangan & kecemasan di hospital yang terdekat dengan anda. Tanda-tanda terlebih dos adalah tanda-tanda paras gula yang rendah dalam darah (hipoglisemia) yang telah dijelaskan di **Kesan-kesan sampingan**. Tanda-tanda itu dapat dikurangkan dengan mengambil gula (4 ke 6 ketul) atau minum minuman bergula segera, diikuti dengan snek berat ataupun hidangan utama. Jika pesakit tidak sedarkan diri, segera maklumkan kepada doktor ataupun hubungi perkhidmatan kecemasan.

Semasa menggunakan Gliclazide

Perkara yang perlu dilakukan

Patuhi nasihat doktor anda tentang pemakanan seimbang dan rawatan. Ini penting untuk mengurangkan risiko anda mengalami paras gula yang terlalu rendah (hipoglisemia). Pastikan doktor anda tahu

- jika anda menjalani pembedahan, kecederaan yang serius, demam atau jangkitan, kesukaran untuk makan
- jika anda merancang untuk hamil, atau sedang hamil
- jika anda mengambil sebarang ubatan yang disenaraikan dalam **Pengambilan ubat-ubatan yang lain**.

Maklumkan kepada doktor gigi anda tentang rawatan anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini telah dipreskripsikan untuk kegunaan sendiri dan jangan memberikannya kepada

orang lain. Ia mungkin membahayakan mereka walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Nasihat Pemakanan

Ubat ini mungkin menyebabkan gula dalam darah yang rendah (hipoglisemia). Ia lebih mudah berlaku jika:

- anda sedang mengamalkan disiplin diet yang ketat
- pemakanan anda kurang seimbang
- anda melakukan senaman yang berpanjangan dan berat
- anda minum alkohol
- jika anda sedang mengambil beberapa jenis ubat untuk merawat paras gula yang tinggi dalam darah (lihat Pengambilan ubat-ubatan yang lain)

Jika anda mengalami paras gula yang rendah dalam darah, anda mungkin mengalami tanda-tanda seperti berikut: sakit kepala, rasa sangat lapar, loya, muntah, keletihan, gangguan tidur, kegelisahan, keagresifan, kurang daya penumpuan, kurang kepekaan dan lambat memberi reaksi, kemurungan, kekeliruan, gangguan pertuturan dan penglihatan, terketar-ketar, gangguan deria, pening, dan ketidakupayaan.

Tanda-tanda berikut mungkin juga berlaku: berpeluh, kulit yang lembap dan dingin, kerisauan, denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur, tekanan darah tinggi, sakit dada secara tiba-tiba dan kuat yang mungkin merebak ke kawasan berhampiran (angina pektoris).

Jika paras gula dalam darah terus turun, anda mungkin mengalami kekeliruan yang teruk(delirium), mengalami sawan, hilang kawalan diri, pernafasan yang cetek, dan denyutan jantung menjadi

lambat, dan anda mungkin tidak sedarkan diri. Dalam kebanyakan keadaan, paras gula yang rendah di dalam darah akan hilang dengan cepat apabila anda mengambil sebarang jenis gula, seperti tablet glukosa, kiub gula, jus yang manis, dan teh yang manis. Oleh sebab itu, anda hendaklah selalu membawa gula dalam pelbagai bentuk bersama anda (tablet glukosa, kiub gula). Perlu diingatkan bahawa pemanis tiruan adalah tidak efektif. Sila berhubung dengan doktor anda atau hospital yang berdekatan jika pengambilan gula tidak dapat menyelesaikan masalah anda atau jika simptom berulang.

Semasa mengambil Gliclazide 80mg anda perlu:

- mengikuti pemakanan seimbang yang teratur; adalah penting untuk makan secara teratur, termasuklah sarapan pagi, dan tidak meninggalkan atau melewatkhan masa makan
- mengambil ubat anda secara teratur
- memeriksa glukosa dalam darah secara teratur seperti yang dicadangkan oleh doktor anda

Jika anda mempunyai sejarah keluarga atau mengetahui bahawa anda mempunyai satu penyakit yang diwarisi, iaitu kekurangan glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) (sel darah merah yang tidak normal), sila hubungi doktor anda sebelum mengambil produk ubatan ini.

Pengambilan Gliclazide 80mg dengan makanan dan minuman

GLICLAZIDE 80 mg boleh diambil bersama makanan dan minuman tanpa alkohol.

Pengambilan alkohol adalah tidak digalakkan kerana ia boleh mengubah pengawalan diabetes anda.

Kehamilan dan Penyusuan

GLICLAZIDE 80 mg tidak digalakkan untuk penggunaan semasa kehamilan. Jika anda sedang merancang untuk hamil, atau sedang hamil, sila maklumkan kepada doktor anda, dan rawatan yang lebih sesuai akan dipreskripsikan untuk anda. Anda tidak boleh mengambil GLICLAZIDE 80 mg semasa menyusukan bayi. Sila minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan mengendalikan mesin

Sekiranya kawalan paras glukosa dalam darah anda memuaskan dengan GLICLAZIDE 80 mg, keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin seharusnya tidak terganggu. Bagaimanapun, jika paras glukosa dalam darah menjadi terlalu rendah, ia boleh menjelaskan daya penumpuan anda, dan seterusnya, turut menjelaskan keupayaan anda untuk menjalankan tugas. Sila berhati-hati, terutamanya semasa baru memulakan rawatan.

Kesan-sesan sampingan

Seperti juga ubatan yang lain, GLICLAZIDE 80 mg boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Paras gula yang rendah dalam darah (hipoglisemia)

Kesan sampingan yang paling biasa ialah paras gula yang rendah dalam darah (hipoglisemia). Untuk simptom-simptom dan tanda-tanda (lihat bahagian **Ambil perhatian khusus**)

Jika dibiarkan tanpa rawatan, simptom-simptom ini boleh bertukar keadaan kepada rasa pening, hilang kesedaran, atau mungkin juga koma. Jika keadaan paras gula yang rendah dalam darah adalah teruk dan

berlarutan, walaupun ia boleh dikawal sementara dengan pengambilan gula, anda perlu segera mendapatkan rawatan perubatan.

Kesan sampingan yang lain:

- Masalah penghadaman: Sakit abdomen, loya, muntah, ketidakhadaman, cirit-birit, dan sembelit. Kesan-kesan ini akan berkurangan bila GLICLAZIDE 80 mg diambil bersama makanan, seperti yang telah dicadangkan.
- Masalah kulit: Reaksi seperti ruam, kemerahan, kegatalan, dan bintik-bintik yang gatal pernah dilaporkan.
- Penyakit berkaitan darah: Pengurangan bilangan sel dalam darah (contohnya platlet, sel darah putih dan merah) yang mungkin menyebabkan kepucatan, pendarahan yang berterusan, lebam, sakit tekak dan demam. Simptom-simptom ini biasanya akan berhenti apabila rawatan dihentikan.
- Masalah hati: Terdapat laporan terpencil tentang fungsi hati yang abnormal yang boleh menyebabkan kekuningan pada mata dan kulit. Jika anda mengalaminya, berjumpalah doktor anda segera. Secara umumnya, simptom-simptom akan ini berhenti apabila rawatan dihentikan. Doktor anda akan membuat keputusan samada untuk menghentikan rawatan ataupun tidak.
- Masalah mata: Penglihatan anda mungkin terganggu dalam jangka masa yang pendek, terutamanya ketika memulakan rawatan. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan pada paras gula dalam darah.

Untuk jenis sulphonylureas yang lain, kesan sampingan yang telah diperhatikan adalah seperti berikut: kes-kes perubahan yang

teruk pada bilangan sel darah dan radang tindakbalas alahan pada dinding saluran darah, kekurangan natrium dalam darah (hiponatremia), simptom kerosakan hati (contohnya jaundis), yang mana pada kebanyakan kes, ia hilang apabila sulphonylurea dihentikan, namun boleh membawa kepada kegagalan hati yang membahayakan nyawa dalam bilangan kes yang kecil.

Jika mana-mana kesan sampingan ini menjadi serius, ataupun anda mendapat sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Cara penyimpanan dan pelupusan Tablet Gliclazide

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak. Jangan gunakan Gliclazide 80 mg selepas tarikh luput seperti yang tertera pada kotak dan strip ubat. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

Simpan dalam bungkusan asal. Produk ubatan ini tidak memerlukan sebarang kaedah penyimpanan yang khas. Ubat-ubatan tidak sepatutnya dilupuskan melalui buangan air atau buangan isi rumah. Sila bertanya pada ahli farmasi anda tentang bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk memelihara persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk
Tablet Gliclazide 80mg berwarna putih, berbentuk bulat, rata dan serong di tepinya, dengan garis bersilang di salah satu permukaan, manakala di sebelah lagi kosong, dan didatangkan dalam 60 tablet sekotak.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktifnya adalah gliclazide. Satu tablet mengandungi 80 mg gliclazide. Bahan-bahan lain ialah: kanji natrium glycolate, isopropil alkohol, magnesium stearat, povidon, kanji jagung, dioktil natrium sulfasuksinat, laktosa, koloid silikon dioksida, selulosa bermikrohablur.

MAL10110009AC

Pengilang

Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd
1-5, Cheng Industrial Estate,
Melaka, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16 April 2012