

COVERSYL 4MG

Perindopril tert-butylamine 4mg

What is in this leaflet

1. What is COVERSYL 4MG and what is it used for?
2. How COVERSYL 4MG works
3. Before you take COVERSYL 4MG
4. How to take COVERSYL 4MG
5. While you are using COVERSYL 4MG
6. Possible side effects
7. After using COVERSYL 4MG
8. Product description

What is COVERSYL 4MG and what is it used for

COVERSYL 4MG is used:

- To treat arterial hypertension,
- To treat heart failure (when the heart is not able to pump enough blood to supply the entire body)
- To reduce the risk of cardiac events like an infarction in patients with stable coronary artery disease (a condition in which the blood supply to the heart is reduced or blocked) and having already had an infarct and/or undergone a bypass or dilatation of the coronary arteries.

How COVERSYL 4MG works

COVERSYL 4MG is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. It acts by dilating the blood vessels, making it easier for the heart to expel the blood in the vessels.

Before you take COVERSYL 4MG

Never take COVERSYL 4MG in the following cases:

- if you are allergic (hypersensitive) to perindopril, to any other ACE inhibitor or to any of the other ingredients of COVERSYL 4MG,
- if you are more than 3 months pregnant. (It is also better to avoid COVERSYL 4MG in early pregnancy – see pregnancy section.)
- if you have experienced symptoms such as wheezing, swelling of the face, tongue or throat, intense itching or severe skin rashes with previous ACE inhibitor treatment or if you or a member of your family have had these symptoms in any other circumstances (a condition called angioedema).

Take care with COVERSYL 4MG:

Tell your doctor before taking COVERSYL 4MG:

- if you have aortic stenosis (narrowing of the main blood vessel leading from the heart) or hypertrophic cardiomyopathy (heart muscle disease) or renal artery stenosis (narrowing of the artery supplying the kidney with blood),
- if you have any other heart problems,
- if you have liver problems,
- if you have kidney problems or if you are receiving dialysis,
- if you suffer from a collagen vascular disease such as systemic lupus erythematosus or scleroderma,
- if you have diabetes,
- if you are on a salt restricted diet or use salt substitutes which contain potassium,

if you are going to have a general anaesthetic and/or major surgery,

- if you are to undergo LDL apheresis (which is removal of cholesterol from your blood by a machine),
- if you are going to have desensitisation treatment to reduce the effects of an allergy to bee or wasp stings,
- if you have recently suffered from diarrhoea or vomiting, or are dehydrated,
- if you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars.

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.

COVERSYL 4MG is not recommended in early pregnancy, and must not be taken if you are more than 3 months pregnant, as it may cause serious harm to your baby if used at that stage (see pregnancy section).

COVERSYL 4MG should not be taken by children or adolescents.

Taking other medicines

If you take or have recently taken another drug, including a non-prescription drug, talk to your doctor or your pharmacist. Treatment with COVERSYL 4MG can be affected by other drugs:

- other drugs to treat hypertension, including diuretics (drugs increasing the amount of urine produced by the kidneys),
- potassium-sparing

- diuretics (spironolactone, triamterene, amiloride), potassium supplements or potassium-containing salt substitutes,
- lithium for mania or depression,
- non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. ibuprofen) to relieve pain or high doses of aspirin,
- drugs to treat diabetes (like insulin or metformin),
- drugs to treat mental problems like depression, anxiety, schizophrenia (e.g. tricyclic antidepressants, antipsychotics),
- immunosuppressants (drugs reducing the body's defence system) used for the treatment of auto-immune diseases or following a surgical transplant (e.g. ciclosporin),
- allopurinol (for the treatment of gout),
- procainamide (for the treatment of irregular heart rhythm),
- vasodilators including nitrate derivatives (products that dilate the blood vessels).
- heparin (drug used to thin the blood),
- treatment for arterial hypotension, shock, or asthma (ephedrine, noradrenaline or adrenaline).

How to take COVERSYL 4MG

Always adhere to the posology indicated by your doctor. If you are unsure, consult your doctor or your pharmacist. The tablet should be taken with a glass of water, preferably at the same time each day, in the morning before a meal. Your doctor will decide the posology that is suitable for you.

The normal posologies are:

Arterial hypertension: the usual starting and maintenance doses are 4 mg once daily. At the end of a month, the dose can be increased to 8 mg daily if required. The maximum daily dose is 8 mg per day for the treatment of arterial hypertension.

If you are over 65 years of age, the starting dose is usually 2 mg daily. At the end of one month, the dose can be increased to 4 mg per day and, if necessary, to 8 mg per day.

Heart failure: the starting dose is usually 2 mg daily. At the end of two weeks, the dose can be increased to 4 mg, which is the maximum recommended dose for the treatment of heart failure.

Stable coronary artery disease: the starting dose is usually 4 mg daily. At the end of two weeks, the dose can be increased to 8 mg, which is the maximum recommended dose for this indication.

If you are over 65 years of age, the starting dose is usually 2 mg daily. At the end of one week, the dose can be increased to 4 mg daily and, after a second week of treatment, to 8 mg daily.

If you have taken more COVERSYL 4MG than you should have

If you have taken too many tablets, immediately contact your doctor or the nearest hospital. The most probable event in the case of an overdose is hypotension. If you suffer significant hypotension (associated with vertigo or dizziness) it can be treated by lying down with your legs raised.

If you forget to take COVERSYL 4MG

It is important to take your drug each day since regular treatment is more effective. However, if you have forgotten to take COVERSYL 4MG,

simply resume your treatment the following day as usual.

Do not take a double dose to compensate for the dose you forgot to take.

If you stop taking COVERSYL 4MG

Since treatment with COVERSYL 4MG is generally long-term, you should ask advice from your doctor before stopping it.

If you have any other questions about the use of this drug, ask for information from your doctor or your pharmacist.

While you are using COVERSYL 4MG

Food and drink

It is recommended to take COVERSYL 4MG before a meal.

Pregnancy

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant. Your doctor will normally advise you to stop taking COVERSYL 4MG before you become pregnant or as soon as you know you are pregnant and will advise you to take another medicine instead of COVERSYL 4MG. COVERSYL 4MG is not recommended in early pregnancy, and must not be taken when more than 3 months pregnant, as it may cause serious harm to your baby if used after the third month of pregnancy.

Breastfeeding

Tell your doctor if you are breast-feeding or about to start breast-feeding. COVERSYL 4MG is not recommended for mothers who are breast-feeding, and your doctor may choose another treatment for you if you wish to breast-feed, especially if your baby is newborn, or was born prematurely.

Ask your doctor or pharmacist

for advice before taking any medicine.

Driving and using machines
COVERSYL 4MG does not generally affect attention but feelings of dizziness or fatigue can occur with a reduction in blood pressure in some patients. Consequently, your ability to drive or use machines could be reduced.

Important information regarding certain components of COVERSYL 4MG

COVERSYL 4MG contains lactose. If your doctor has told you that you have an intolerance to some sugars, contact him before taking this drug.

Possible side effects

Like all drugs, COVERSYL 4MG is likely to have side effects, although not everyone will not suffer from them.

If you notice one of the following side effects, stop taking COVERSYL 4MG right away and immediately contact your doctor:

- swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat, difficulty in breathing,
- severe dizziness or fainting,
- unusually rapid or irregular heart beats.

In order of reducing frequency, the side effects can include:

- Commonly (<1/10, >1/100): headache, dizziness, vertigo, pins & needles, sight problems, tinnitus (whistling or buzzing in the ears), dizziness due to a reduction in blood pressure, cough, shortness of breath, gastro-intestinal problems (nausea, vomiting, abdominal pain, taste problems, dyspepsia

or difficulty in digestion, diarrhoea, constipation), allergic reactions (like skin eruptions, itching), muscle cramps, feeling of tiredness,

- Uncommonly (<1/100, >1/1000): mood changes, sleep problems, bronchospasm (heavy chest, respiratory whistling and shortness of breath), dry mouth, angio-oedema (symptoms like respiratory whistling, swelling of the face, tongue or throat, serious itching or severe skin eruptions), kidney problems, impotence, sweating,
- Very rarely (<1/10 000): confusion, cardiovascular problems (irregular heart beat, angina pectoris, heart attack, and cerebrovascular accident) eosinophilic pneumonia (a rare form of pneumonia), rhinitis (blocked nose or a runny nose), serious skin manifestations like erythema multiforme, problems affecting the blood, pancreas or liver.
- hypoglycaemia in diabetic patients,
- vascularitis (inflammation of the blood vessels).

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, or some side effects become serious, please tell your doctor or your pharmacist.

After using COVERSYL 4MG

Storage

Keep out of reach and sight of children.

Do not use COVERSYL 4MG after the expiry date given on the box and the heat-formed blisters. The expiry date refers to the last day of the month.

To be kept at a temperature not exceeding + 30 o C.

Disposal

Drugs should not be flushed down the drains or put out with the household rubbish. Ask your pharmacist what to do with unused drugs. These measures are to protect the environment.

Product description

What COVERSYL 4MG tablet contains

- The active ingredient is tert-butylamine perindopril. Each tablet contains 4 mg tert-butylamine perindopril, equivalent to 3.338 mg perindopril.
- The other ingredients in the tablet are: Lactose monohydrate, magnesium stearate, hydrophobic colloidal silica, microcrystalline cellulose, aluminium lac of copper chlorophyll complexes (E411ii).

What is COVERSYL 4MG looks like and contents of the pack

This drug is presented in the form of a clear green scored tablet in the form of a rod, engraved on one face (✉). The tablets are available in heat-sealed blisters, overwrapped in a sachet of 30 tablets.

Registration number

MAL19900370A
(Les Laboratoires Servier Industrie)
MAL04103437AC
(Kotra Malaysia Sdn Bhd)

Manufacturer

Les Laboratories Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy - France

And

Kotra Malaysia Sdn Bhd

No. 1 Jalan TTC 12
Cheng Industrial Estate
75250 Melaka
Malaysia

Product Licence Holder

Servier Malaysia Sdn Bhd
1301 Level 13, Uptown 2
No 2 Jalan SS 21/37,
Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Date of revision: 09.2009

COVERSYL 4MG tablet film bersalut
Perindopril tert-butylamine
4mg

Dalam sisip bungkusan ini

1. Apa itu COVERSYL 4MG dan kegunaannya
2. Bagaimana COVERSYL 4MG bertindak
3. Sebelum mengambil COVERSYL 4MG
4. Cara pengambilan COVERSYL 4MG
5. Semasa mengambil COVERSYL 4MG
6. Kesan sampingan yang mungkin berlaku
7. Selepas menggunakan COVERSYL 4MG
8. Maklumat lanjut

Apa itu COVERSYL 4MG dan kegunaannya

COVERSYL 4MG digunakan:
- untuk rawatan tekanan darah tinggi (tekanan darah tinggi),
- untuk rawatan kegagalan jantung (di mana jantung tidak mampu mengepam darah yang secukupnya untuk memenuhi keperluan badan),
- untuk mengurangkan risiko masalah jantung, seperti serangan jantung, dalam pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit arteri koronari stabil (di mana bekalan darah ke jantung telah kurang atau terhalang) dan pernah mengalami satu serangan jantung dan / atau melakukan pembedahan dengan membesarkan saluran darah untuk meningkatkan bekalan darah ke jantung.

Bagaimana COVERSYL 4MG bertindak
COVERSYL 4MG adalah angiotensin pengubah enzim (ACE) inhibitor. Ia bertindak dengan membesarkan saluran darah, seterusnya memudahkan jantung anda mengepam darah didalamnya.

Sebelum mengambil COVERSYL 4MG

Jangan mengambil COVERSYL 4MG

- jika anda ialah (hipersensitif) terhadap perindopril atau ACE inhibitor yang lain atau sebarang kandungan di dalam COVERSYL 4MG,
- Jika anda telah mengandung lebih daripada 3 bulan. (Adalah lebih baik mengelak COVERSYL 4MG dalam awal kehamilan – lihat seksyen kehamilan),
- jika anda telah mengalami simptom seperti kesukaran bernafas, Bengkak muka, lidah atau kerongkong, gatal yang teruk atau alahan kulit yang teruk dengan rawatan ACE inhibitor yang sebelumnya atau ahli keluarga anda mempunyai simptom tersebut (keadaan yang dipanggil ‘angioedema’).

Ambil perhatian yang khusus dengan COVERSYL 4MG

Sila berbincang dengan doktor anda jika perkara yang berikut berkaitan dengan anda:

- jika anda mempunyai stenosis aorta (penguncupan salur darah utama yang keluar dari jantung) atau hypertrophic cardiomyopathy (penyakit otot jantung) atau stenosis arteri ginjal (penguncupan salur darah yang menyalurkan darah ke ginjal),
- jika anda ada masalah jantung lain,
- jika anda ada masalah hati,
- jika anda ada masalah buah pinggang atau menerima rawatan dialisis,
- jika anda mengalami penyakit kolagen vaskular (penyakit tisu penghubung) seperti systemic lupus erythematosus atau scleroderma,
- jika anda mempunyai penyakit kencing manis,
- jika anda sedang dalam diet garam terkawal atau atau menggunakan pengganti

garam yang mengandungi potassium,

- jika anda akan melalui proses anaesthesia atau pembedahan,
- jika anda akan melalui proses ‘LDL apheresis’ (pembuangan kolesterol dari saluran darah menggunakan mesin),
- jika anda akan mendapat rawatan untuk menjadikan anda kurang sensitif terhadap kesan alahan lebah atau sengatan tebuhan,
- jika anda mengalami cirit-birit atau muntah baru-baru ini atau dinyahhidratkan,
- jika anda telah diberitahu oleh doktor anda yang anda tidak mempunyai toleransi keatas sesetengah gula,

Anda mesti memberitahu doktor anda jika anda rasa (atau mungkin) mengandung.

COVERSYL 4MG tidak disarankan semasa mengandung trimester pertama dan ia boleh menyebabkan kemudaratan yang serius selepas 3 bulan mengandung.

COVERSYL 4MG tidak disarankan untuk kegunaan dalam kanak-kanak dan remaja.

Pengambilan ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda akan atau telah mengambil mana-mana ubat-ubatan lain termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi doktor.

Rawatan dengan COVERSYL 4MG boleh diganggu oleh ubat-ubatan lain.

- ubat lain termasuk diuretik untuk penyakit tekanan darah tinggi (ubat yang meningkat jumlah air kencing yang dihasilkan oleh buah pinggang),
- diuretik jenis ‘potassium-sparing’ (spironolactone, triamterene, amiloride),

suplemen atau potassium yang mengandungi pengganti garam,

- lithium untuk mania atau kemurungan,
- ubat ‘non-steroid’ anti-radang (contohnya ibuprofen) untuk melegakan kesakitan atau dos aspirin yang tinggi,
- ubat untuk rawatan penyakit kencing manis (seperti insulin atau metformin),
- ubat untuk rawatan penyakit mental seperti kemurungan, keresahan, schizophrenia (contohnya tricyclic anti-depressants, antipsychotics),
- ubat immunosuppressant (ubat yang mengurangkan mekanisma penghalang badan) yang digunakan untuk rawatan penyakit auto imuns atau selepas pembedahan transplant (contohnya ciclosporin),
- allopurinol (untuk rawatan gout),
- procainamide (untuk rawatan degupan jantung yang tidak normal),
- vasodilators termasuk nitrates (produk yang melebarkan saluran darah),
- heparin (ubat yang digunakan untuk mencairkan darah),
- ubat yang digunakan untuk rawatan tekanan darah rendah, kejutan atau asma (contohnya ephedrine, noradrenaline atau adrenaline).

Cara pengambilan COVERSYL 4MG

Selalu mematuhi arahan doktor. Anda perlu hubungi mereka jika anda tidak pasti. Dos biasa adalah 1 tablet sehari. Ambil tablet sebelah pagi dan sebelum makan. Telan tablet dengan segelas air. Doktor anda akan memberitahu anda dos yang sesuai bagi anda.

Dos biasa bagi:

Hipertensi arteri: Mula dengan dos 4 mg sekali sehari. Selepas sebulan, dos boleh dinaikkan kepada 8 mg sehari jika perlu. Dos maksimum ialah 8 mg

sehari untuk rawatan hipertensi arteri.

Jika anda melebihi 65 tahun, mula dengan dos 2 mg sekali sehari. Selepas sebulan, dos boleh dinaikkan kepada 4 mg sehari. Jika perlu, ambil 8 mg untuk sekali sehari.

Kegagalan jantung: Mula dengan dos 2 mg sehari. Pada akhir minggu kedua, dos boleh dinaikkan kepada 4 mg. Ini adalah maksimum dos yang disyorkan bagi rawatan kegagalan jantung.

Jika anda melebihi 65 tahun, mula dengan dos 2 mg sehari. Pada akhir minggu pertama, naikkan dos kepada 4 mg sehari dan naikkan dos kepada 8 mg sehari selepas minggu kedua.

Penyakit arteri koronari stabil: Mula dengan dos 4 mg sekali sehari. Selepas 2 minggu, dos boleh dinaikkan kepada 8 mg untuk diambil sekali sehari. Ini adalah dos maksimum yang disyorkan dalam pengambilan ini.

Jika anda melebihi 65 tahun, mula dengan dos 2 mg sekali sehari. Selepas satu minggu, dos boleh dinaikkan kepada 4 mg sekali sehari dan dos boleh diambil sehingga 8 mg sekali sehari selepas minggu kedua.

Jika anda mengambil terlebih dos COVERSYL 4MG daripada yang perlu

Jika anda mengambil terlalu banyak, hubungi bahagian kecemasan atau beritahu doktor anda secepat mungkin. Kesan terlebih dos yang biasa adalah tekanan darah rendah dimana anda akan berasa pening atau lemah. Jika ini berlaku, baring dengan menaikkan kaki anda ke atas dapat membantu.

Jika anda terlupa mengambil COVERSYL 4MG

Adalah penting anda mengambil ubat ini setiap hari seperti yang diarahkan untuk rawatan yang berkesan. Walau bagaimanapun, jika anda

terlupa, ambil dos yang berikutnya pada masa yang sama. Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa itu.

Jika anda berhenti mengambil COVERSYL 4MG

Oleh kerana rawatan dengan COVERSYL 4MG adalah sepanjang hayat, anda perlu berbincang dengan doktor sebelum berhenti mengambil ubat ini.

Jika anda ada sebarang pertanyaan berkaitan penggunaan ubat ini, sila bertanya doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa mengambil COVERSYL 4MG

Pengambilan COVERSYL 4MG dengan makanan dan minuman

Adalah lebih baik COVERSYL 4MG diambil sebelum makan.

Mengandung

Anda mesti beritahu doktor anda jika anda rasa anda mengandung (atau akan mengandung). Doktor anda akan menasihatkan anda supaya berhenti mengambil COVERSYL 4mg sebaik saja mengetahui yang anda hamil. Ubat hipertensi yang sesuai mesti digantikan sebelum anda mula hamil. COVERSYL 4mg tidak disarankan sewaktu awal kehamilan dan boleh menyebabkan kesan mudarat yang serius kepada kandungan jika diambil selepas 3 bulan kehamilan.

Menyusukan anak

Jangan ambil COVERSYL 4mg jika anda menyusukan bayi.

Sila beritahu doktor anda jika anda menyusukan bayi atau ingin mula menyusukan bayi. Berbincang dengan doktor anda dengan segera.

Sila dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi

sebelum mengambil sebarang ubat.

Pemanduan dan penggunaan mesin COVERSYL 4MG tidak mempunyai kesan ke atas keterjagaan tetapi rasa pening dan lemah yang disebabkan tekanan darah rendah boleh terjadi ke atas sesetengah pesakit. Jika anda mendapat kesan ini, kebolehan anda untuk memandu dan mengendalikan mesin mungkin terjejas.

Informasi penting tentang kandungan COVERSYL 4MG

Coversyl 4mg mengandungi laktosa. Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda yang anda tidak mempunyai toleransi keatas sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku

Seperti ubat-ubatan lain, COVERSYL 4MG boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua pesakit akan merasainya.

Jika anda mengalami sebarang kesan dibawah ini, sila berhenti mengambil ubat dan maklumkan kepada doktor anda secepat mungkin:

- bengkak di bahagian muka, bibir-bibir, mulut, lidah atau tekak, kesukaran bernafas
- pening yang teruk atau pengsan,
- degupan jantung yang luar biasa cepat atau tidak tetap.

Diantara kesan sampingan yang mungkin terjadi (urutan menurun), kesan yang:

- Selalu berlaku (kurang dari 1 dalam setiap 10 pesakit tetapi lebih dari 1 dalam 100 pesakit): sakit kepala, pening, vertigo, pin & needles, gangguan penglihatan, tinnitus (kedengaran bunyi di dalam telinga), kepala rasa ringan

disebabkan tekanan darah yang rendah, batuk, sesak nafas, gangguan perut-usus (loya, muntah, sakit abdomen, gangguan rasa, mulut kering, dispepsia atau kesukaran penghadaman, cirit-birit, sembelit), reaksi alergi (seperti ruam kulit, gatal), kejang otot, rasa penat.

- Jarang berlaku (terjadi pada kurang dari 1 dalam 100 pesakit tetapi lebih dari 1 di dalam 1000 pesakit): perubahan emosi, gangguan tidur, bronkospasm (dada rasa ketat, wheezing, kesukaran bernafas), mulut kering, angioedema (simptom seperti respiratori whistling, bengkak muka, lidah atau tekak, ruam kulit atau gatal yang teruk), masalah ginjal, impoten, berpeluh,

- Sangat jarang (terjadi pada kurang dari 1 dalam 10,000 pesakit): kecelaruan minda, gangguan kardiovaskular (degupan jantung tidak tetap, angina pectoris, serangan jantung dan cerebrovaskular accident), eosinophilic pneumonia (jenis pneumonia yang jarang), rhinitis (hidung tersumbat atau selsema), manifestasi kulit yang teruk seperti erythema multiforme, gangguan darah, pankreas atau hati.

- Bagi pesakit kencing manis, kejadian hypoglicemia (paras gula darah yang terlalu rendah) boleh terjadi.

- Vascularitis (keradangan pada saluran darah).

Jika sebarang kesan sampingan menjadi serius atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan seperti yang diatas, sila beritahu doktor anda atau ahli farmasi anda.

Selepas menggunakan COVERSYL 4MG

Bagaimana menyimpan COVERSYL 4MG
Jauhi dari dicapai atau dilihat oleh kanak-kanak.

Jangan mengambil COVERSYL 4MG selepas tarikh luput yang tercetak pada kotak dan blisters.

Tarikh luput adalah merujuk hari terakhir untuk bulan tersebut.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Cara pembuangan

Ubat ini tidak sepatutnya dibuang melalui sistem pembuangan air rumah atau bersama barang buangan lain. Sila bertanya ahli farmasi anda cara-cara membuang ubat yang tidak diperlukan. Langkah ini boleh membantu menjaga persekitaran kita.

Maklumat lanjut

Apa yang terkandung di dalam COVERSYL 4MG

- Bahan aktif adalah tert-butylamine perindopril. Setiap tablet bersalut ini mengandungi 4 mg tert-butylamine perindopril (bersamaan kepada 3.338 mg perindopril).

- Bahan lain di dalam tablet adalah: lactose monohydrate, magnesium stearate, hydrophobic colloidal silica, microcrystalline cellulose, aluminium lac of copper chlorophyll complexes (E411ii).

Bagaimana rupa bentuk dan pembungkusan COVERSYL 4MG

Coversyl 4mg adalah tablet berupa 'scored' yang berwarna hijau muda, tablet bersalut berbentuk rod dengan satu muka tablet diukir ().

Mengandungi 30 tablet yang dipekat dalam bentuk blister dan dibungkus di dalam sachet.

No. pendaftaran PKBD :

MAL19900370A
(Les Laboratoires
Servier Industrie)

MAL04103437AC
(Kota Malaysia Sdn
Bhd)

Pengilang:

Les Laboratoires Servier
Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy – France

dan

Kotra Malaysia Sdn Bhd
No. 1 Jalan TTC 12
Cheng Industrial Estate
75250 Melaka
Malaysia

Pemegang Pendaftaran:

Servier Malaysia Sdn Bhd
1301 Level 13, Uptown 2
No.2 Jalan SS21/37,
Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Tarikh revisi: 09.2009