

# BETAWIN TABLETS

**Active:** *Metoprolol tartrate*

**Excipient:** *Aerosil, Avicel, Croscarmellose Sodium, Cornstarch, Talcum, Lactose, PVP, Tween 80, Magnesium Stearate*

## Consumer Medicine Information

---

### What is in this leaflet

---

This leaflet answers some of the common questions people ask about BETAWIN. It does not contain all the information that is known about BETAWIN.

It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor will have weighed the risks of you taking BETAWIN against the benefits they expect it will have for you.

**If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.**

**Keep this leaflet with the medicine.**

You may need to read it again.

---

### What BETAWIN is used for

---

BETAWIN belongs to a group of medicines called beta-blockers. It works by affecting the body's response to some nerve impulses, especially in the heart.

As a result, it decreases the heart's need for blood and oxygen and therefore reduces the amount of work the heart has to do. It also widens the blood vessels in the body, as well as helping the heart to beat more regularly.

BETAWIN are used to:

- lower high blood pressure, also called hypertension
- prevent angina
- treat or prevent heart attacks, or reduce your risk of heart complications following a heart attack
- prevent migraine headaches

Your doctor may have prescribed this medicine for another reason. Your doctor will have explained why you are being treated with BETAWIN and told you what dose to take.

BETAWIN may be used either alone or in combination with other medicines to treat your condition.

**Follow all directions given to you by your doctor carefully.**

They may differ from the information contained in this leaflet.

Ask your doctor if you have any questions about why BETAWIN has been prescribed for you.

BETAWIN is not addictive.

---

### Before you take BETAWIN

---

#### ***When you must not take it***

**Do not take BETAWIN tablets if:**

**1. you are pregnant or intend to become pregnant.**

BETAWIN may affect your baby if you are given it early in pregnancy or in the last weeks before your baby is due.

**2. you are breast-feeding or plan to breast-feed.**

BETAWIN passes into breast milk and therefore there is a possibility that the breast-fed baby may be affected.

**Do not use BETAWIN if the expiry date (EXP) printed on the pack has passed.**

It may have no effect at all, or worse, an entirely unexpected effect if it is used after the expiry date.

**Do not use BETAWIN if the packaging is torn or shows signs of tampering.**

**Do not give BETAWIN to children.**

The safety BETAWIN in children has not been established.

#### ***Before you start to take it***

**You must tell your doctor if:**

**1. you have any allergies to:**

- BETAWIN or any of the ingredients listed at the end of this leaflet.
- any other medicine or other beta-blocker medicines
- any other substances, such as foods, preservatives or dyes

**2. you have any of these medical conditions:**

- asthma
- diabetes
- an overactive thyroid gland
- liver problems
- kidney problems
- certain types of angina

- any other heart problems
- phaeochromocytoma

**If you have not told your doctor about any of these things, tell them before you take BETAWIN.**

### ***Taking other medicines***

**Tell your doctor if you are taking any other medicines, including:**

- other beta-blocker medicines, including beta-blocker eye drops.
- medicines used to treat high blood pressure or angina
- medicines used to treat heart problems
- insulin and tablets used to treat diabetes
- medicines used to treat depression
- medicines that you buy without a prescription at the chemist, supermarket or health food shop.

These medicines may be affected by BETAWIN or may affect how well it works. You may need to take different amounts of your medicine, or you may need to take different medicines. Your doctor will advise you.

Your doctor and pharmacist have more information on medicines to be careful with or avoid while taking BETAWIN.

If you have not told your doctor about any of these things, tell them before you take any BETAWIN.

---

## **How to take BETAWIN**

### ***How much to take***

#### **For high blood pressure:**

The usual starting dose is one 50mg or 100mg tablet once a day for one week.

The dose is then usually increased to 50mg or 100mg once or twice daily.

Your doctor may tell you to take a different amount of BETAWIN.

**Follow your doctor's instructions carefully.**

If you are taking other prescription medicines which lower blood pressure, your doctor may need to change the dose of them to obtain the best results for you.

#### **For angina pectoris:**

The usual dose is 50mg or 100mg taken two or three times a day.

#### **After myocardial infarction:**

The usual dose is 100mg taken twice a day, often starting with a lower dose for 2 days.

#### **For migraine prevention:**

The usual dose is 50mg to 75mg taken twice a day (100-150mg a day).

### **DO NOT STOP TAKING BETAWIN TABLETS SUDDENLY.**

The dose needs to be reduced slowly over 7 to 14 days to make sure that your condition does not get worse.

### ***If you forget to take it***

**If it is almost time for your next dose (within 6 hours), skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to.**

Otherwise, take it as soon as you remember, and then go back to taking your tablets as you would normally.

**Do not take a double dose to make up for the dose that you missed.**

If you have trouble remembering when to take your medicine, ask your pharmacist for some hints.

## **Overdose**

**Telephone your doctor, or go to Accident and Emergency at your nearest hospital immediately if you think that you or anyone else may have taken too much BETAWIN. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. You may need urgent medical attention.**

If you take too many BETAWIN tablets your blood pressure may drop too far. You will feel faint or faint, and your heart rate will also slow down. You may also have nausea, vomiting, and convulsions. In extreme cases, serious heart and lung problems may occur.

---

## **While you are using BETAWIN**

### ***Things you must do***

**Be sure to keep all of your doctor's appointments so that your progress can be checked.**

Elderly patients especially need to be monitored to stop their blood pressure falling too far.

**If you become pregnant while taking BETAWIN, tell your doctor.**

**If you have a severe allergic reaction to foods, medicines or insect stings, tell your doctor immediately.**

If you have a history of allergies, there is a chance that BETAWIN may cause allergic reactions to be worse and harder to treat.

**If you feel light-headed, dizzy or faint when getting out of bed or standing up, get up slowly.**

You may feel light-headed or dizzy when you begin to take BETAWIN. This is because your blood pressure has fallen suddenly.

Standing up slowly, especially when you get up from bed or

chairs, will help your body get used to the change in position and blood pressure. If this problem gets worse or continues, talk to your doctor.

**Make sure you drink enough water during exercise and hot weather when you are taking BETAWIN, especially if you sweat a lot.**

If you do not drink enough water while taking BETAWIN, you may feel faint or light headed or sick.

This is because your blood pressure is dropping too much. If you continue to feel unwell, tell your doctor.

**If you plan to have surgery (even at the dentist) that needs a general anaesthetic, tell your doctor or dentist that you are taking BETAWIN.**

Your blood pressure may drop suddenly if BETAWIN interacts with the anaesthetic.

**If you are being treated for diabetes, make sure you check your blood sugar level regularly and report any changes to your doctor.**

BETAWIN may change how well your diabetes is controlled. It may also cover up some of the symptoms of low blood sugar (hypoglycaemia).

BETAWIN may increase the time your body takes to recover from low blood sugar. Your doses of diabetic medicines, including insulin, may need to change.

**If you have to have any medical tests while you are taking BETAWIN, tell your doctor.** BETAWIN may affect the results of some tests.

**Tell any doctors, dentists, and pharmacists who are treating you that you are taking BETAWIN.**

### ***Things you must not do***

**Do not stop taking BETAWIN without checking with your doctor.**

Your doctor may want you to gradually reduce the amount of BETAWIN you are taking before stopping completely. This may help reduce the possibility of your condition getting worse.

Do not give BETAWIN to anyone else even if they have the same condition as you.

Do not use BETAWIN to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

### ***Things to be careful of***

**Be careful driving or operating machinery until you know how BETAWIN affects you.**

As with other beta-blocker medicines, BETAWIN may cause dizziness, light-headedness, tiredness, or drowsiness in some people. Make sure you know how you react to BETAWIN before you drive a car, operate machinery, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or light-headed.

**Be careful drinking alcohol while you are taking BETAWIN.**

Dizziness or light-headedness may be worse.

BETAWIN, like other beta-blocker medicines, may make you more sensitive to cold temperatures, especially if you have circulation problems.

---

### **Side effects**

---

**Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking BETAWIN.**

BETAWIN helps most people with high blood pressure, angina

pectoris, migraine, headache or after myocardial infarction, but it may have unwanted side-effects in a few people.

If you are over 65 years of age you may have an increased chance of getting side effects.

All medicines can have side effects. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical treatment if you get some of the side effects.

**Ask your doctor to answer any questions you may have.**

**Tell your doctor or nurse if you notice any of the following and they worry you:**

- headache, tiredness, drowsiness, weakness, or lack of energy
- aches and pains, painful joints
- nausea (feeling sick), vomiting
- stomach upset, diarrhoea or constipation, weight gain
- dry mouth, changes in taste sensation
- difficulty sleeping, nightmares
- mood changes
- confusion, short-term memory loss, inability to concentrate
- increased sweating, runny or blocked nose
- hair loss

These side effects are usually mild.

**Tell your doctor or nurse immediately if you notice any of the following:**

- dizziness, lightheadedness or fainting especially on standing up
- tingling or "pins and needles"
- skin rash or worsening of psoriasis

- sunburn happening more quickly than usual
- abnormal thinking or hallucinations
- buzzing or ringing in the ears, deafness
- irritated eyes or blurred vision
- sexual problems

These are serious side effects. You may need urgent medical attention. Serious side effects are rare.

**If any of the following happen, tell your doctor or nurse immediately:**

- shortness of breath, being less able to exercise,
- swelling of the ankles, feet or legs
- chest tightness, wheezing, noisy breathing
- chest pain, changes in heart rate or palpitations
- swelling of the face, lips, tongue or throat.
- yellowing of the skin or eyes(jaundice), generally feeling unwell.
- constant "flu-like" symptoms with tiredness or lack of energy

These are very serious side effects. You may need urgent medical attention or hospitalisation. These side effects are rare. Some people may get other side effects while being given BETAWIN.

**Do not be alarmed by this list of possible side effects. You may not experience any of them.**

---

## After using BETAWIN

---

### Storage

**Keep your tablets in the blister pack until it is time to take them.** If you take BETAWIN out of the

blister pack it will not keep well.

**Keep the tablets in a cool dry place where the temperature stays below 30 degrees C.**

**Do not store it or any other medicine in the bathroom or near a sink.** Heat and dampness can destroy some medicines.

**Keep it where young children cannot reach it.**

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

**Do not leave it in the car on hot days.**

### Disposal

**Ask your pharmacist what to do with any tablets you have left over if your doctor tells you to stop taking them, or you find that the expiry date has passed.**

---

## Product description

---

### What BETAWIN looks like

#### BETAWIN TABLET 50MG:

A 9mm, round tablet with marking 'd' on both sides.

#### BETAWIN TABLET 100MG:

A 11mm, round, scored tablet with markings 'DUO 861' and a flower.

BETAWIN comes in strips of 100, 250, 500 and 1000 tablets

### Ingredients

Each BETAWIN tablet contains: Metoprolol tartrate 50mg or 100mg as the active ingredient.

---

## Manufacturer / Distributor

---

BETAWIN is manufactured and distributed in Malaysia by:

### DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

---

## Marketing Authorization Holder

---

### DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

#### BETAWIN 50mg

Blister pack of 100 tablets  
MAL19913261A

#### BETAWIN 100mg

Blister pack of 60 tablets  
MAL19913262A

This leaflet was prepared in November 2011.

# TABLET BETAWIN

**Bahan Utama:** *Metoprolol tartrate*

**Tambahan:** *Aerosil, Avicel, Croscarmellose Sodium, Cornstarch, Talcum, Lactose, PVP, Tween 80, Magnesium Stearate*

## Risalah Maklumat Ubat Pengguna

### Kandungan risalah

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim mengenai BETAWIN. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang ada mengenainya.

Ini tidak bermakna anda tidak perlu mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Doktor anda telah menimbang risiko dan manfaat yang dijangkakan sebelum anda mengambil BETAWIN.

**Jika anda mempunyai apa-apa kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.**

**Simpan risalah ini bersama dengan ubat anda.**

Anda mungkin perlu membacanya lagi.

### Apakah kegunaan BETAWIN

BETAWIN tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil penghalang beta atau *beta-blocker*. Ia berfungsi dengan memberi kesan tindak balas badan terhadap beberapa impuls saraf terutama di bahagian jantung.

Dengan itu, ia dapat mengurangkan keperluan darah dan oksigen kepada jantung dan seterusnya mengurangkan daya kerja jantung tersebut. Ia juga berfungsi dengan membesarkan

saluran darah di dalam badan dan membantu jantung berdenyut dengan tetap.

BETAWIN digunakan untuk

- merendahkan tekanan darah tinggi, yang juga dipanggil hipertensi
- mengelakkan sakit dada (angina)
- merawat atau mencegah serangan jantung atau mengurangkan risiko komplikasi jantung susulan serangan jantung
- mencegah penyakit migrain

Doktor anda mungkin telah mempreskrip ubat ini untuk kegunaan lain.

Doktor anda akan menjelaskan kenapa anda dirawat dengan BETAWIN dan berapa sukatan dos yang perlu diambil.

BETAWIN boleh digunakan secara bersendirian atau bersama-sama dengan ubat-ubatan lain untuk merawat penyakit anda.

**Patuhi semua arahan yang telah diberikan oleh doktor anda dengan teliti.**

Ia mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat di dalam risalah ini.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengapa BETAWIN dipreskrip untuk anda.

BETAWIN tidak menyebabkan rasa ketagihan.

### Sebelum mengambil

## BETAWIN

### ***Bila tidak boleh mengambil***

**Jangan mengambil tablet BETAWIN jika:**

**1. jika anda hamil atau merancang untuk hamil**

BETAWIN boleh menjejaskan janin jika anda mengambilnya pada peringkat awal atau minggu-minggu terakhir sebelum kelahiran

**2. jika anda sedang atau merancang untuk menyusukan bayi**

BETAWIN boleh menyerap masuk ke dalam susu badan dan seterusnya boleh menjejaskan bayi yang sedang disusui.

**Jangan ambil BETAWIN selepas tarikh luput yang dicetak (EXP) pada pek pembungkusan.**

Jika diambil selepas tamat tarikh luput, ia mungkin tidak memberi apa-apa kesan atau, paling teruk kesan yang tidak diinginkan mungkin berlaku.

Jangan guna BETAWIN jika pembungkusannya telah terkoyak atau ada tanda-tanda ianya telah dibuka.

**Jangan beri BETAWIN kepada kanak-kanak.**

Keselamatan BETAWIN dikalangan kanak-kanak masih belum dapat dipastikan.

### ***Sebelum mula mengambil***

**Maklumkan kepada doktor anda jika:**

**1. anda alah kepada**

- BETAWIN atau sebarang bahan kandungannya yang disenaraikan pada penghujung risalah ini.
- mana-mana ubat atau ubat penghalang beta yang lain
- sebarang bahan-bahan, seperti makanan, bahan pengawet atau pewarna

## 2. anda mengalami masalah kesihatan berikut

- asma
- diabetes (kencing manis)
- kelenjar tiroid terlebih aktif
- masalah hati
- masalah buah pinggang
- sesetengah jenis angina (sakit dada)
- sebarang masalah lain jantung
- phaeochromocytoma (penyakit tumor pada kelenjar adrenal)

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan segera sebelum mula mengambil BETAWIN.

### *Jika mengambil ubat-ubatan lain*

Maklumkan kepada doktor jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain termasuk:

- ubat penghalang beta yang lain, termasuk ubat titis mata penghalang beta
- ubat untuk merawat tekanan darah tinggi atau angina
- ubat untuk merawat masalah jantung
- ubat tablet untuk merawat kencing manis atau ubat insulin
- ubat untuk merawat kemurungan
- ubat yang anda beli tanpa preskripsi di kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan ini boleh menjejaskan BETAWIN atau ubat-ubatan itu sendiri boleh terjejas disebabkan olehnya. Anda mungkin memerlukan sukatan ubat yang berbeza, atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berbeza. Doktor anda akan memberi nasihat mengenyainya.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat terhadap ubat yang perlu diberi perhatian atau perlu dielakkan ketika mengambil BETAWIN.

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan segera sebelum mula mengambil BETAWIN.

## Cara menggunakan BETAWIN

### *Berapa banyak perlu diambil*

#### **Untuk tekanan darah tinggi:**

Dos permulaan biasa ialah satu tablet 50mg atau 100mg sekali sehari selama seminggu.

Biasanya dos akan ditingkatkan kepada 50mg atau 100mg sekali atau dua kali sehari.

Doktor mungkin akan memberi sukatan dos BETAWIN yang berbeza untuk anda.

#### **Patuhi arahan doktor anda dengan teliti.**

Jika anda sedang mengambil ubat preskripsi lain untuk menurunkan tekanan darah tinggi, doktor anda mungkin perlu menukar dos tersebut untuk kebaikan anda.

#### **Untuk angina pektoris:**

Dos biasa ialah 50mg atau 100mg diambil sebanyak dua atau tiga kali sehari.

#### **Selepas terkena serangan jantung (miokardial infarksi):**

Dos biasa ialah 100mg diambil dua kali sehari, selalunya dimulai

dengan dos yang rendah selama 2 hari.

#### **Untuk mencegah migrain:**

Dos biasa ialah 50mg hingga 75mg diambil dua kali sehari (100-150mg sehari).

#### **JANGAN BERHENTI MENGAMBIL UBAT TABLET BETAWIN SECARA MENDADAK.**

Dosnya perlu dikurangkan secara perlahan-lahan selama 7 hingga 14 hari supaya keadaan penyakit anda tidak menjadi bertambah teruk.

### *Jika terlupa mengambil*

**Jika masa untuk dos seterusnya hampir tiba (dalam masa 6 jam), langkau dos yang tertinggal tersebut dan ambil dos yang seterusnya.**

Jika tidak, ambil sebaik anda teringat, dan seterusnya ambil tablet anda mengikut masa yang sepatutnya.

**Jangan gandakan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal sebelumnya.**

Jika anda mempunyai masalah untuk mengingati waktu pengambilan BETAWIN, dapatkan cara untuk mengatasinya daripada ahli farmasi anda.

### *Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)*

**Hubungi doktor anda dengan segera melalui panggilan telefon atau kunjungi hospital yang berdekatan jika anda fikir anda atau orang lain telah mengambil BETAWIN secara berlebihan. Lakukan perkara tersebut sekalipun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.**

Jika anda mengambil tablet BETAWIN secara berlebihan, tekanan darah anda menjadi

sangat rendah. Anda akan berasa pitam atau pengan, dan kadar denyutan jantung anda menjadi perlahan. Anda mungkin juga berasa loya, muntah dan diserang sawan. Masalah jantung dan paru-paru yang teruk mungkin berlaku pada sesetengah kes yang ekstrim.

---

## **Semasa menggunakan BETAWIN**

---

### ***Perkara yang perlu dilakukan***

**Pastikan anda hadir ketika temujanji dengan doktor supaya perkembangan kesihatan anda dapat dipantau.**

Pesakit warga emas terutamanya, perlu dipantau supaya tekanan darah mereka tidak menurun terlalu rendah.

**Jika anda telah hamil ketika mengambil BETAWIN, maklumkan kepada doktor anda.**

**Jika anda alah teruk kepada sebarang makanan, ubat-ubatan atau gigitan serangga, maklumkan kepada doktor anda dengan segera.**

Jika anda mempunyai sejarah kesihatan terhadap alahan, ada kemungkinan untuk BETAWIN menyebabkan tindakbalas alahan itu menjadi semakin teruk dan sukar dirawat.

**Jika kepala anda terasa ringan, pening atau pitam ketika anda hendak bangun dari tidur atau cuba berdiri, lakukan secara perlahan-lahan.**

Anda mungkin berasa sakit kepala atau pening ketika mula mengambil BETAWIN. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah secara tiba-tiba.

Bangun secara perlahan-lahan, terutamanya ketika hendak bangun dari tidur atau dari kerusi. Ini boleh membantu badan anda

menyesuaikan keadaan ketika berlakunya perubahan posisi dan tekanan darah. Jika masalah ini berterusan atau menjadi semakin teruk, maklumkan kepada doktor anda.

**Pastikan anda minum air yang mencukupi semasa bersenam dan sewaktu hari panas ketika anda mengambil BETAWIN, terutamanya jika anda banyak berpeluh.**

Jika anda tidak minum air yang mencukupi ketika mengambil BETAWIN, anda mungkin berasa pitam atau ringan kepala atau loya. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah dengan banyak. Jika anda terus berasa tidak sihat, maklumkan kepada doktor anda.

**Jika anda merancang untuk menjalani pembedahan, (walaupun dengan doktor gigi) yang memerlukan penggunaan ubat bius, maklumkan kepada doktor atau doktor gigi bahawa anda sedang mengambil ubat BETAWIN.**

Tekanan darah anda akan turun secara mendadak akibat tindakbalas BETAWIN dengan ubat bius.

**Jika anda sedang menerima rawatan untuk penyakit kencing manis, pastikan paras gula dalam darah anda diperiksa secara berkala dan dilaporkan sebarang perubahan kepada doktor anda.**

BETAWIN boleh menjejaskan rawatan penyakit kencing manis anda. Ia juga boleh melindungi gejala paras gula rendah (hipoglisemia)

BETAWIN boleh meningkatkan masa pemulihan paras gula dalam darah anda. Oleh itu, sukatan dos ubat kencing manis anda, termasuk insulin, perlu diubah.

**Jika anda perlu melakukan ujian kesihatan ketika mengambil**

**BETAWIN, maklumkan kepada doktor anda.**

BETAWIN boleh menjejaskan bacaan sesetengah ujian tersebut.

**Maklumkan kepada mana-mana doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil BETAWIN.**

### ***Perkara yang tidak boleh dilakukan***

**Jangan berhenti mengambil BETAWIN tanpa pengetahuan doktor anda.**

Doktor anda mungkin akan mengurangkan dos BETAWIN anda secara berperingkat sebelum terus menghentikannya. Dengan cara ini, ia dapat membantu mengurangkan kemungkinan keadaan anda menjadi semakin teruk.

Jangan beri BETAWIN kepada orang lain walaupun penyakit mereka sama seperti anda.

Jangan guna BETAWIN untuk merawat penyakit lain kecuali atas arahan doktor anda.

### ***Perkara yang perlu diberi perhatian:***

**Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda merasai kesan BETAWIN terhadap anda.**

Seperti ubat-ubatan penghalang beta atau *beta-blocker* yang lain, BETAWIN boleh menyebabkan rasa pening, keletihan, atau rasa mengantuk pada sesetengah pesakit. Pastikan anda tahu kesan BETAWIN terhadap anda sebelum memandu kenderaan, mengendali mesin atau melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan ketika anda rasa pening.

**Berhati-hati apabila meminum minuman beralkohol ketika anda mengambil BETAWIN.**

Rasa pening anda akan menjadi bertambah teruk.

Seperti ubat-ubatan penghalang beta atau *beta-blocker* yang lain, BETAWIN boleh menyebabkan anda lebih sensitif terhadap cuaca sejuk, terutamanya jika anda mengalami masalah peredaran darah.

---

## Kesan-kesan sampingan

---

**Maklumkan segera kepada doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil BETAWIN.**

BETAWIN membantu merawat kebanyakan pesakit tekanan darah tinggi, angina pektoris, sakit migrain atau selepas serangan jantung (*miokardial infarksi*), tetapi ia mungkin memberi kesan-kesan sampingan pada sesetengah pesakit.

Jika umur anda melebihi 65 tahun, risiko untuk mendapat kesan-kesan sampingan tersebut meningkat.

Semua ubat mempunyai kesan-kesan sampingan. Kadang kala ianya serius, tetapi selalunya tidak. Anda perlu mendapatkan rawatan perubatan jika anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut.

**Hubungi doktor anda untuk menjawab sebarang pertanyaan anda.**

**Laporkan kepada doktor atau jururawat jika anda mengalami kesan sampingan berikut dan ianya membimbangkan anda:**

- sakit kepala, keletihan, rasa mengantuk, lemah atau lesu
- sakit, sakit sendi-sendi
- loya, muntah
- sakit perut, cirit-birit atau sembelit,
- berat badan bertambah
- mulut kering, perubahan deria rasa

- sukar untuk tidur, mimpi ngeri
- perubahan sikap
- keliru, hilang ingatan jangka pendek, hilang daya tumpuan
- banyak berpeluh, hidung berair atau tersumbat
- rambut gugur

Kesan-kesan sampingan di atas selalunya agak ringan.

**Laporkan kepada doktor atau jururawat dengan serta-merta jika anda mengalami keadaan berikut:**

- pening atau pitam terutamanya ketika hendak bangun
- rasa berdenyut atau kebas
- ruam kulit atau psoriasis yang teruk
- kulit mudah terselar matahari daripada biasa.
- fikiran tidak normal atau berhalusinasi
- telinga berdengung, rasa pekak
- sakit mata atau penglihatan kabur
- masalah seksual

Kesan-kesan sampingan di atas adalah kesan yang serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Kesan-kesan sampingan yang serius jarang berlaku.

**Jika anda mengalami keadaan berikut, laporkan kepada doktor atau jururawat dengan segera:**

- sesak nafas, kurang daya untuk bersenam,
- bengkak pergelangan kaki atau kaki
- sesak dada, nafas berdehit, pernafasan kuat
- sakit dada, perubahan kadar denyutan jantung atau berdebar-debar
- pembengkakan pada muka, bibir, lidah atau tekak.
- kulit atau mata menjadi kuning(jaundis), rasa tidak sihat.
- sentiasa mengalami gejala seperti selesema, rasa letih atau kurang bertenaga

Kesan-kesan sampingan di atas adalah amat serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan atau perlu dimasukkan ke hospital dengan segera.

Kesan-kesan sampingan tersebut amat jarang berlaku.

Sesetengah pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan sampingan yang lain ketika mengambil BETAWIN.

**Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.**

---

## Selepas menggunakan BETAWIN

---

### *Penyimpanan*

Simpan ubat tablet anda di dalam pek asalnya sehingga tiba masa untuk menggunakannya.

Jika anda mengeluarkan tablet BETAWIN daripada pek asalnya, ia tidak tersimpan dengan sempurna.

**Simpan ubat tablet BETAWIN anda di tempat kering dan sejuk pada suhu bawah 30 ° C.**

**Jangan simpan BETAWIN atau ubat lain di dalam bilik air atau berdekatan sinki.** Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat.

**Jauhkan tablet BETAWIN daripada capaian kanak-kanak.**

Simpan ubat di dalam almari berkunci yang terletak sekurang-kurangnya satu setengah meter tinggi.

**Jangan tinggalkan ubat ini di dalam kereta ketika hari panas.**

### *Pelupusan*



Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil ubat ini, atau sudah tamat tarikh luputnya, hubungi ahli farmasi anda untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan terhadap baki tersebut.

WHOLLY OWNED BY CCM  
DUOPHARMA BIOTECH  
BERHAD (524271-W)  
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,  
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,  
41200 Klang,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

---

## Deskripsi produk

---

### *Rupa dan warna*

#### **TABLET BETAWIN 50MG:**

Berbentuk bulat dengan tanda 'd' pada kedua-dua permukaan. Berukuran diameter 9mm.

#### **BETAWIN TABLET 100MG:**

Berbentuk bulat dengan tanda 'DUO 861' dan bunga pada satu permukaan dan tanda garisan pada permukaan yang lain. Berukuran diameter 11mm.

BETAWIN boleh didapati dalam bentuk pek blister 100, 250, 500 dan 1000 biji tablet.

### ***Bahan kandungan***

Setiap tablet BETAWIN mengandungi:  
Metoprolol tartrate 50mg atau 100mg sebagai bahan aktifnya.

### ***Nombor pendaftaran:***

#### **BETAWIN 50mg**

- 100 biji tablet dalam pek blister  
MAL19913261A

#### **BETAWIN 100mg**

- 60 biji tablet dalam pek blister  
MAL19913262A

Tarikh risalah ini disediakan:  
November 2011.

---

## Pengilang / Pengekar

---

BETAWIN dikilangkan dan diedarkan di Malaysia oleh:

#### **DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)**

WHOLLY OWNED BY CCM  
DUOPHARMA BIOTECH  
BERHAD (524271-W)  
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,  
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,  
41200 Klang, Selangor Darul  
Ehsan, Malaysia.

---

## Pemegang Pendaftaran

---

#### **DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)**