

Patient information Leaflet for Calcigard Retard 20 mg (Nifedipine 20mg sustained release tablets)

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have more questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet

- 1 What Calcigard Retard is
- 2 Before you take Calcigard Retard
- 3 How to take Calcigard Retard
- 4 Possible side effects
- 5 How to store Calcigard Retard
- 6 Further information

1 What Calcigard Retard is

Calcigard Retard contains nifedipine, which belongs to a group of medicines called *calcium antagonists*.

Calcigard Retard is used to treat high blood pressure or angina (chest, pain).

For high blood pressure: Calcigard Retard works by relaxing and expanding the blood vessels. This makes the blood flow more easily and lowers blood pressure. Lower blood pressure reduces the strain on your heart.

For angina: Calcigard Retard works by relaxing and expanding the arteries supplying the heart. This allows more blood and oxygen to reach the heart and decreases the strain on it. Your angina attacks will be less severe and less frequent if there is less strain on the heart.

2 Before you take Calcigard Retard

Do not take Calcigard Retard:

- **If you have had a heart attack** within the last month.
- **If you get a sudden. angina attack.** Adalat retard will not help relieve symptoms of angina quickly.
- **If you have unstable angina.**
- **If you are allergic** to the active ingredient (nifedipine), to any other similar medicines (known as *dihydropyridines*) or to any of the other ingredients. The ingredients of Calcigard Retard are listed in section 6.
- **If you are pregnant.**
- **If you are breastfeeding.** If you need to take Calcigard Retard, you should stop breastfeeding before you start to take this medicine.
- **If you have been told that you have a narrowing of the aortic heart valve (stenosis).**
- **If you have ever had a collapse** caused by a **heart problem (cardiogenic shock)**, during which you became breathless, pale and had a cold sweat and dry mouth.
- If you have been told to **avoid lactose**, that you have a hereditary condition called **Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption.**

Tell your doctor and do not take Calcigard Retard if any of these apply to you.

Your doctor will take special care:

- **If you have low blood pressure** and you were prescribed Calcigard Retard for your angina. Your blood pressure may be decreased further by this treatment.
- **If you have a heart condition** where your heart cannot cope *with increased strain (poor cardiac reserve)*.
- **If you are a diabetic.** The treatment for your diabetes may need to be adjusted. If you have any questions about this, ask your doctor.
- **If you are on kidney dialysis.** If you have a very high blood pressure and a low blood volume, you might experience a sudden drop in blood pressure when you take Calcigard Retard.
- **If your liver is not working properly.** Your doctor may need to do some blood tests. You may also be given a lower dose of Calcigard Retard.

Talk to your doctor before you take Calcigard Retard if any of these apply to you. .

Tell your doctor:

- **If your chest pain (angina)** gets worse (comes on more often or more severely) over a matter of hours or days. You may be advised not to take Calcigard Retard.
- **If you have chest pains after taking your first dose** of Calcigard Retard, Your doctor may wish to change your treatment.
- **If you notice increased breathlessness.**
- **If you notice swelling of the ankles.**

Tell your doctor before you take the next dose if any of these apply to you.

Other medicines and Calcigard Retard

Tell your doctor about any other medicines that you are taking, or took recently. This includes any products you bought without a prescription.

Some medicines may affect the way Calcigard Retard works. **Tell your doctor** if you are taking:

- **Other medicines to treat high blood pressure.**
- **Rifampicin** (an antibiotic).
- **Cimetidine** (to treat stomach ulcers).
- **Digoxin, diltiazem, quinidine or beta-blockers** (to treat heart conditions).
- **Phenytoin, carbamazepine or valproic acid** (to treat epilepsy)
- **Magnesium sulphate injections during pregnancy** (may cause a severe fall in blood pressure).
- **Erythromycin** (an antibiotic).
- **Ketoconazole, itraconazole or fluconazole** (anti-fungal medicines).
- **Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir or amprenavir** (to treat HIV).
- **Fluoxetine or nefazodone** (to treat depression).
- **Tacrolimus** (to prevent the rejection of transplanted organs).
- **Phenobarbital** (usually used to treat insomnia or anxiety).

Do not drink grapefruit juice or eat grapefruit while taking Calcigard Retard.

Do not start taking Calcigard Retard within 3 days of drinking grapefruit juice or eating grapefruit. Tell your doctor if you have had grapefruit or grapefruit juice in this time. Also, do not drink grapefruit juice or eat grapefruit whilst taking Calcigard Retard. Grapefruit juice is known to increase the blood levels of the active ingredient, nifedipine. This effect can last for at least 3 days.

Pregnancy and breastfeeding

Do not take Calcigard Retard if you are pregnant. If you are pregnant, think you might be pregnant or are planning a family, tell your doctor before taking Calcigard Retard.

Do not take Calcigard Retard if you are breastfeeding. If you need to take Calcigard Retard, you should stop breastfeeding before you start taking the tablets.

Driving and using machines

Calcigard Retard may make you feel dizzy, faint, extremely tired or have visual disturbances. Do not drive or operate machinery if you are affected in this way.

This may be more likely when you first start treatment, if you change tablets, or if you have drunk alcohol.

3 How to take Calcigard Retard

Take the tablets as prescribed by your doctor.

- **The usual dose** of Calcigard Retard 20 mg is 1 tablet, every 12 hours (i.e. twice per day), but your doctor may increase or decrease the dose depending on how well your blood pressure or angina is being controlled. The maximum dose is 2 tablets (40 mg) every 12 hours.
- **Swallow the tablets whole with a little water.**
- **Continue to take the tablets** for as long as your doctor has told you to.

Do not take them with grapefruit juice.

You can take Calcigard Retard either with or without food.

Use in children: Adalat retard is not recommended for use in children and adolescents below 18 years of age, because there are only limited data on the safety and efficacy in this population.

If you take too many tablets

- **Get medical help immediately.** If possible, take your tablets or the box with you to show the doctor.

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become too low and your heartbeats to speed up or slow down. It may also lead to an increase in your blood sugar level or an increase in the acidity of your blood, swelling in the lungs, low blood oxygen levels and disturbances in consciousness, possibly leading to unconsciousness.

If you forget to take the tablets

Take your normal dose immediately and continue taking your tablets as prescribed, waiting 12 hours before taking your next dose.

Do not take a double dose to make up for the missed dose.

4 Possible side effects

Like all medicines, Calcigard Retard can have side effects, although not everybody gets them.

Serious side effects

If you notice:

- Severe, sudden generalised allergic reaction including very rarely life-threatening shock (e.g. difficulty in breathing, drop of blood pressure, fast pulse), swelling (including potentially life-threatening swelling of the airway)
- other allergic reactions causing swelling under the skin (possibly severe and including swelling of the larynx that may result in a life-threatening outcome)
- fast heart beat (*tachycardia*)
- shortness of breath or difficulty breathing
- mild to moderate allergic reactions
- itching (possibly severe), a rash or hives
- **Contact your doctor immediately and do not take the next dose** as these may be the first signs of allergic reaction which may become severe.

If you develop:

a skin reaction or blistering / peeling of the skin and/or mucosal reactions (in the mouth/nose or at the penis/vagina)

(*Toxic Epidermal Necrolysis*)

Contact your doctor immediately before you continue treatment as these may be signs of a severe reaction.

Less serious side effects

Apart from the side effects listed above, these are the other side effects of Calcigard Retard.

Common side effects

- headache
- flushing
- general feeling of being unwell
- constipation
- swelling, particularly of the ankles and legs

Uncommon side effects

stomach pain (*abdominal pain*)

unspecific pain

chills

low blood pressure when standing up (symptoms include fainting, dizziness, light headedness, occasional palpitations, blurred vision and sometimes confusion)

fainting

irregular heartbeat (*palpitations*)

dry mouth

indigestion or upset stomach

wind (*flatulence*)

feeling sick (*nausea*)

muscle cramps

joint swelling

sleep disorders

anxiety or nervousness

reddening of the skin

nose bleeds

nasal congestion

sensation of spinning or whirling motion (*vertigo*)

migraine

dizziness

trembling

increase in the need to pass water (*urinate*)

painful or difficult urination

inability to achieve or maintain an erection (*impotence*)

blurred vision

temporary increase in certain liver enzymes

Rare side effects

pins and needles

inflammation of the gums, tender or swollen gums, bleeding gums

sensitivity to light (*photosensitivity allergic reaction*)

small, raised areas of bleeding in the skin (palpable purpura)

joint pain

muscle pain

All of these symptoms usually go away when treatment with Calcigard Retard is stopped.

If you get side effects

Tell your doctor if any side effect gets serious, or if you get any effects not listed in this leaflet.

5 How to store Calcigard Retard

Keep this medicine out of the reach and sight of children.

Store your medicine in its original container. Protect from strong light and only remove the tablet from the blister strip when you are about to take it.

Do not use after the expiry date 'which is marked on both the outer carton and on each blister strip of tablets.

Disposal

Do not dispose of medicines in household rubbish. Any unused Calcigard Retard tablets should be returned to a pharmacist (chemist) who will dispose of them properly. This helps the environment.

6 Further information**What Calcigard Retard contains**

Calcigard Retard tablets contain the active ingredient, nifedipine.

It also contains microcrystalline cellulose, maize starch, lactose monohydrate, polysorbate 80, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose, stearic acid, ethyl cellulose, polyethylene glycol 6000, diethyl phthalate, polyvinyl pyrrolidone K30, talcum, sodium lauryl sulphate, lake of chocolate brown, and titanium dioxide (E171).

What's in the pack

Each sustained release tablet contains 20 mg of nifedipine. Each tablet is brown coloured, round, biconvex, film coated tablets with bisecting line on one side.

Packing: 2x5 strips packed in a box with a package insert. Each strip contains 10 tablets

Malaysia registration number: MAL06121021A

Manufacturer:

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Indrad-382 721, Dist. Mehsana, INDIA.

Marketing Authorisation Holder:

The Zyfas Medical Co.

No.7, Jalan Molek 3/10, Taman Molek,
81100 Johor Bahru,
Johor, Malaysia.

Leaflet prepared: April 2012.

Calcigard Retard Tablet 20 mg
(Nifedipine 20mg sustained release tablets)

Baca risalah ini dan fahami seluruh kandungannya sebelum menggunakan produk ini

- Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya semula.
- Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya terdapat sebarang keraguan mengenai kesan pengambilan ubat ini.
- Ubat ini dipreskripikan hanya untuk anda. Tidak dibenarkan diberi kepada orang lain walaupun ianya mempunyai simptom yang sama dengan anda tetapi berkemungkinan akan memudaratkan bagi pihak lain.

Jika terdapat kesan yang serius atau tiada diberitahu dalam risalah ini, sila hubungi doktor dan ahli farmasi anda.

Apa yang ada didalam risalah ini

- 1) Apa itu Calcigard Retard
- 2) Sebelum menggunakan Calcigard Retard
- 3) Cara pengambilan Calcigard Retard
- 4) Kesan-kesan sampingan
- 5) Keadaan penyimpanan Calcigard Retard
- 6) Maklumat lanjut

1) Apa itu Calcigard Retard

Calcigard Retard mengandungi nifedipine, iaitu termasuk didalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil 'calcium antagonists'

Calcigard Retard digunakan untuk mengawal tekanan darah tinggi atau sakit dada (angina).

Untuk tekanan darah tinggi: Calcigard Retard berfungsi untuk mengendurkan dan melebarkan dinding saluran darah. Oleh itu ianya dapat memperbanyakkan dan melancarkan perjalanan darah ke jantung. Seterusnya dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangkan kesakitan pada jantung.

Untuk sakit dada (angina): Dengan menggunakan Calcigard Retard, perjalanan darah dan oksigen ke jantung menjadi bertambah baik. Jadi jika jantung boleh berfungsi dengan baik, serangan sakit dada juga dapat dikurangkan.

2) Sebelum menggunakan Calcigard Retard

Jangan menggunakan ubat ini sekiranya anda dapati:-

- Anda telah menghadapi serangan jantung sebulan yang lepas

- **Anda dengan tiba-tiba mengalami sakit dada.** Calcigard retard tidak dapat memulihkannya dengan segera.
- **Anda mengalami 'unstable angina'**
- **Alahan kepada bahan aktif (nifedipine) atau bahan yang sama fungsinya (dikenali sebagai 'dihydropyridines') atau bahan-bahan yang lain didalam ubat ini (lihat Seksyen 6: Maklumat lanjut)**
- **Jika anda sedang hamil**
- **Jika anda menyusukan bayi.** Jika anda ingin menggunakan Calcigard Retard, anda harus berhenti menyusukan bayi sebelum merancang mengambil ubat ini.
- **Jika anda diberitahu bahawa saluran darah anda sempit (aortic stenosis)**
- **Jika anda pernah tidak sedarkan diri yang disebabkan masalah jantung (cardiogenic shock) dimana anda sukar bernafas, pucat, merasa sejuk dan mulut kering**
- **Jika anda dilarang mengambil produk yang diperbuat daripada laktose dimana anda ada keturunan (Lapp lactase deficiency/ glucose-galactose malabsorption)**

Maklumkan kepada doktor anda jika anda menghadapi masalah seperti diatas dan anda dilarang menggunakan Calcigard Retard.

Doktor anda perlu mengambil perhatian khas :

- **Jika anda mengalami tekanan darah rendah** dan doktor memberi Calcigard Retard untuk merawat 'angina'. Tekanan darah anda akan menjadi semakin rendah jika meneruskan dengan rawatan ini.
- **Jika anda menghadapi masalah jantung** dimana jantung sudah tidak boleh merima kesakitan lagi (poor cardiac reserve).
- **Jika anda seorang pesakit kencing manis.** Rawatan untuk kencing manis perlu dikaji semula. Rujuk kepada doktor anda tentang masalah anda.
- **Jika anda mengalami masalah buah pinggang dan menjalani rawatan dialisis.** Anda mengalami terlampau tinggi tekanan darah dan darah isi padu rendah. Dan jika anda mengambil Calcigard Retard, anda akan mengalami tekanan darah menurun dengan mendadak.
- **Jika anda mempunyai penyakit hati yang tidak berfungsi dengan baik.** Anda dikehendaki menjalani ujian darah dan akan diberi Calcigard Retard dengan dos yang rendah.

Maklumkan kepada doktor sebelum mengambil Calcigard Retard jika perkara yang diatas berlaku kepada anda.

Maklumkan kepada doktor

- **Jika menghadapi sakit dada (angina) yang kerap dan terlampau sakit beberapa jam atau sehari-hari.** Anda dinasihatkan tidak mengambil Calcigard Retard.
- **Jika anda mengalami sakit dada selepas kali pertama mengambil Calcigard Retard ,** doktor anda akan menukar dengan memberi rawatan yang lain.
- **Jika kesukaran bernafas anda bertambah teruk**
- **Jika anda dapati bengkak pada sendi dibuku lali**

Maklumkan kepada doktor sebelum mengambil Calcigard Retard untuk rawatan seterusnya jika perkara yang diatas berlaku kepada anda.

Mengambil ubat-ubatan yang lain bersama Calcigard Retard

Sila memberitahu doktor sekiranya anda sedang mengambil sebarang ubat lain dengan/ atau tanpa preskripsi doktor.

Sesetengah ubat boleh berinteraksi dengan Cacigard Retard dan ada juga boleh menyebabkan kesan sampingan kepada ubat-ubatan lain.

Sila maklumkan kepada doktor jika anda mengambil ubat lain seperti di bawah:

- **Ubat-ubatan yang lain bagi merawat tekanan darah tinggi**
- **Rifampicin (Antibiotik)**
- **Cimetidine (Rawatan untuk ulcer perut)**
- **Digoxin, diltiazem, quinidine atau 'beta-blockers (merawat masalah jantung)**
- **Phenytoin, carbamazepine atau valproic acid (merawat 'epilepsy')**
- **Magnesium sulphate injections semasa mengandung (boleh menyebabkan penurunan tekanan darah dengan mendadak)**
- **Erythromycin (Antibiotik)**
- **Ketoconazole, itraconazole atau fluconazole (Anti- fungal)**
- **Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir atau amprenavir (untuk merawat HIV).**
- **Fluoxetine atau nefazodone (untuk merawat tekanan perasaan)**
- **Tacrolimus (untuk menghalang penolakan organ)**
- **Phenobarbital (kebiasaannya untuk merawat insomnia atau kemurungan)**

Jangan mengambil buah atau jus limau gedang semasa menggunakan Calcigard Retard.

Jangan menggunakan Calcigard Retard sehingga selepas 3 hari mengambil buah atau jus limau gedang. Maklumkan kepada doktor anda jika anda telah mengambil buah atau jus limau gedang. Juga tidak dibenarkan mengambil buah atau jus limau gedang bersama Calcigard Retard. Buah atau jus limau gedang bertindak balas dengan nifedipine dan boleh menaikkan tekanan darah. Kesannya akan berakhir selepas 3 hari.

Kehamilan dan Penyusuan

Calcigard Retard tidak disarankan kepada ibu yang sedang hamil. Jika anda sedang hamil atau merancang untuk hamil anda hendaklah memaklumkan kepada doktor sebelum mengambil Calcigard Retard.

Calcigard Retard juga tidak disarankan kepada ibu yang menyusukan. Jika anda perlu mengambil Calcigard Retard anda hendaklah memberhentikan penyusuan sebelum mula menggunakan ubat ini.

Memandu dan mengendalikan jentera

Pengambilan Calcigard Retard akan memberi kesan sampingan seperti merasa pening-pening lalat, sangat penat dan letih, dan pandangan menjadi kabur. Jika anda mengalami kesan seperti ini, anda dinasihatkan tidak memandu atau mengendalikan jentera. Ini mungkin lebih cenderung jika ia adalah rawatan pertama, anda menukar tablet atau anda meminum arak.

3) Cara pengambilan Calcigard Retard

Berapa banyak harus diambil

Sentiasa mengambil ubat ini mengikut arahan doktor anda.

- **Dos permulaan** akan diberi ialah 1 biji setiap 12 jam (dua kali sehari), tetapi doktor anda akan menambah atau mengurangkan dos bergantung kepada toleransi dan keadaan pesakit. Dos akan ditambah kepada paling banyak 2 biji (40mg) setiap 12 jam.
- Hendaklah menelan bersama sedikit air.
- Hendaklah mengambil berterusan selagi doktor tidak mengarahkan supaya berhenti.

Jangan mengambil bersama jus limau gedang.

Anda boleh mengambil Calcigard Retard sebelum atau selepas makan.

Kanak-kanak : Calcigard Retard tidak dibenarkan untuk kanak-kanak / remaja dibawah umur 18 tahun.

Jika mengambil secara berlebihan

Hendaklah segera ke Bahagian Rawatan Kecemasan Hospital terdekat atau maklumkan kepada doktor anda dengan segera. Bawa bersama bungkusan atau baki ubat bersama anda supaya mudah dikenal pasti.

Jika anda telah mengambil ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah akan menjadi sangat rendah dan denyutan jantung akan menjadi cepat atau perlahan. Ianya juga boleh menyebabkan paras gula dalam darah akan meningkat atau menambahkan kandungan uric acid didalam darah, paru-paru membengkak, tahap oksigen darah yang rendah, pitam atau berkemungkinan tidak sedarkan diri.

Jika terlupa mengambil

Ambil dos anda dengan segera sejurus sahaja anda teringat dan teruskan mengambil seperti biasa selepas 12 jam dari masa dos yang diambil sebelumnya.

Jangan sesekali mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

4) Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Calcigard Retard boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan setiap individu akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang serius

Jika anda mendapati:

- Reaksi alahan yang teruk dan tiba-tiba termasuk kejutan yang mengancam nyawa (seperti susah bernafas, kemerosotan tekanan darah, nadi yang cepat, bengkak (termasuk potensi bengkak saluran penafasan)
- Reaksi alahan lain menyebabkan bengkak di bawah kulit (mungkin teruk dan termasuk bengkak larinks yang mungkin mengancam nyawa)
- Denyutan jantung menjadi cepat (*tachycardia*)
- Merasa mengah atau susah untuk bernafas
- Alahan yang ringan menjadi alahan sederhana
- Kulit menjadi gatal dan beruam
- Maklumkan kepada doktor dengan segera dan jangan mengambil dos seterusnya jika anda menghadapi alahan seperti diatas kerana ianya permulaan alahan yang boleh merebak menjadi serius.

Jika ada terjadi:

Tindak balas kulit atau kelecuman/pengelupasan kulit dengan/atau reaksi mukosa pada mulut/hidung atau pada zakar atau faraj (*Toxic Epidermal Necrolysis*)

Maklumkan kepada doktor dengan segera dan jangan mengambil dos seterusnya jika anda menghadapi alahan seperti diatas kerana ianya permulaan alahan yang boleh merebak menjadi serius.

Kesan sampingan yang kurang serius

Selain daripada kesan sampingan yang tersenarai diatas , di bawah adalah kesan sampingan yang biasa bagi Calcigard Retard.

Kesan sampingan yang biasa

- Pening kepala
- Kulit menjadi kemerah-merahan
- Merasa tidak selesa
- Sembelit
- Bengkak disendi buku lali

Kesan sampingan yang jarang berlaku

- Sakit perut (abdominal pain)
- Sakit yang tidak dapat ditentukan
- Merasa sejuk
- Tekanan darah rendah semasa berdiri (simptom seperti hendak pingsan, pening-pening lalat, pening kepala, berdebar-debar sekali-sekala, pandangan kabur dan kebingungan)

- Pengan
- Denyutan iantung yang tidak seimbang
- Mulut kering
- Masalah dalam sistem pencernaan atau perut merasa tidak selesa
- Senak perut
- Rasa mual
- Kekejangan otot
- Bengkak sendi
- Tidak lena tidur
- Kemurungan atau kebimbangan
- Kulit menjadi kemerah-merahan
- Hidung berdarah
- Hidung tersumbat
- Perasaan yang berputar-putar (vertigo)
- Migraine
- Pening-pening lalat
- menggeletar
- Kerap membuang air kencing
- Merasa sakit atau susah membuang air kencing
- Penurunan nafsu seks (impotensi)
- Penglihatan kabur
- Tambahan sementara dalam enzim hati

Kesan sampingan yang paling kurang

- Kebas (pins and needles)
- Gusi membengkak dan berdarah
- Sensitiv kepada cahaya (*photosensitivity allergic reaction*)
- *Kenaikan pendarahan dalam kulit pada tempat yang kecil (palpable purpura)*
- Sakit sendi
- Sakit otot

Semua simptom biasanya akan pulih jika berhenti mengambil Calcigard Retard.

Sila hubungi doktor atau ahli farmasi sekiranya kesan sampingan menjadi serius atau anda mendapati terdapat kesan sampingan yang tidak disenaraikan didalam risalah ini.

5) Keadaan penyimpanan

- Simpan ubat-ubatan ditempat yang selamat dan jauh dari kanak-kanak.
- Simpan ubat-ubatan didalam bungkusan yang asal. Simpan blister strip didalam kotaknya supaya dapat menghindarkan dari banyak cahaya dan ambil yang diperlukan sahaja.
- Jangan gunakan ubat-ubatan selepas tarikh luput seperti yang telah dicetak pada blister strip dan kotak. Tarikh akhir luput adalah tarikh akhir pada bulan itu.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak sepatutnya dibuang seperti biasa. Anda juga boleh kembalikan ubat yang berlebihan kepada doktor / ahli farmasi untuk pelupusan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

6) Maklumat lanjut

Sebiji Calcigard Retard mengandungi: bahan aktif, nifedipine 20mg

ianya juga mengandungi: microcrystalline cellulose, maize starch, lactose monohydrate, polysorbate 80, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose, stearic acid, ethyl cellulose, polyethylene glycol 6000, diethyl phthalate, polyvinyl pyrrolidone K30, talcum, sodium lauryl sulphate, lake of chocolate brown, and titanium dioxide (E171).

Pek: 2 x 5 keping dipek dalam sebuah kotak bersama sisip bungkusan.

Rupanya: Tablet berwarna coklat, berbentuk bulat, bersalut dengan garisan pembahagi dua disebelah permukaan.

Nombor Pendaftaran Produk: MAL06121021A

Dikilangkan oleh:

Torrent Pharmaceuticals Ltd
Indrad-382 721, Dist. Mehsana, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk:

The Zyfas Medical Co.,
No 7, Jalan Molek 3/10
Taman Molek
81100 Johor Bahru
Johor, Malaysia

Tarikh kemaskini: April 2012