

KETOZOL TABLET

Ketoconazole 200mg

What is in this leaflet

- What *Ketozol* is used for
- How *Ketozol* work
- Before you use *Ketozol*
- How to take *Ketozol*
- While you are using *Ketozol*
- Side effects
- After using *Ketozol*
- Product description
- Manufacturer
- Marketing authorization holder
- Date of revision

What *Ketozol* is used for

Local infections, (e.g. white spots, fungal infections and athlete's foot) provided these infections cannot be treated topically because of the location or severity of the infection; or if they fail to respond to local therapy. It is also for systemic mycotic infection, fungal infections and prevention of mycotic infections in patients with compromised body defenses. Note: Ketoconazole does not penetrate well into the central nervous system (CNS). Therefore, fungal inflammation of the brain membrane should not be treated with oral ketoconazole.

How *Ketozol* work

Ketoconazole is an antifungal agent which interferes with production and change the permeability of the cell membrane of sensitive fungi. It is reported to prevent fungal growth at concentration achieved clinically. Ketoconazole has a wide spectrum of antimicrobial activity including activity against *Candida* spp., *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Epidermophyton floccosum*, *Histoplasmosis capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis*, *malassezia furfur*, *Microsporum canis*, *Trichophyton mentagrophytes* and *T.rubrum*.

Before you use *Ketozol*

When you must not take it

- if used together with drugs eg. astemizole, cisapride and terfenadine, allergy patients,

pregnancy and pre-existing liver diseases.

Before you start to take it

For treatment longer than 2 weeks, liver function tests should be performed before start of therapy, after 2 weeks and monthly thereafter.

Taking other medications

- Co-administration of drugs that reduce stomach acidity includes anticholinergic agents, antacids and H₂-receptor antagonists, may decrease the absorption of ketoconazole. Ketoconazole has been reported to increase blood concentration of chlordiazepoxide, cyclosporine, methylprednisolone and quinidine. The effect of oral anticoagulants such as warfarin may be increased by ketoconazole. Ketoconazole inhibits the metabolism of terfenadine, thus increases the risk of damage to the heart. Absorption for sustained release oral dosage forms of theophylline may be decreased by ketoconazole. Co-administration of ketoconazole with rifampicin results in decreased antifungal activity. Concomitant use of ketoconazole and phenytoin may alter serum concentration of both drugs.

How to take *Ketozol*

How much to take

Children – under 2 yrs: Dosage has not been established. Over 2 yrs: 3.3 – 6.6mg/kg/day. Treatment should usually be continued for at least 1 week after symptoms have cleared and cultures have become negative. Adult -

Prevention of fungal infections: 200mg once daily. May be increased to 400mg if adequate response is not obtained.

Tinea versicolor: 200mg once dly for 5 – 10 days. Other infections: 200 – 400mg once daily for 5 – 10 days.

Vaginal candidiasis: 200mg once dly for 3 - 5 days. Mucocutaneous candidiasis: 200mg dly. May require indefinite maintenance to prevent recurrence.

Histoplasmosis: 400 – 800mg daily for minimum. 6 months.

All dosages should be taken with food to improve absorption.

When to take it

Take ketoconazole exactly as your doctor has told you.

How long to take it

You should check with your doctor or pharmacist.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you take too much (overdose)

If taken too much ketoconazole, contact your doctor, an emergency department or a poisoning center immediately.

While you are using *Ketozol*

Things you must do

Inform doctor of medications you are taking.

Things you must not do

You must take your medication as directed.

Things to be careful of

If you are pregnant or become pregnant or breast-feeding during treatment, you should inform your doctor prior to treatment.

Side effects

Gastrointestinal disturbance are the most frequently reported adverse effects following oral administration of ketoconazole. e.g. nausea, vomiting, diarrhoea, constipation and abdominal pain. These adverse effects are dose related and may be minimized with food. Non-symptomatic transient increase in blood concentration of liver enzymes may occur. Other adverse effects include hypersensitivity reactions, itchiness, rash, headache, dizziness and drowsiness, menstrual disorders, allergy to light, numbness, hair loss, impotence and reversible increased skull pressure. Reduction in blood platelets has been reported rarely.

After using *Ketozol*

Storage

Store in cool, dry place below 30°C. Protect from light. Keep out of reach of children.

Disposal

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

Product description

What it looks like?

White, round, top-scored tablet.

Ingredients

ketoconazole, cornstarch, polyvinylpyrrolidone and magnesium stearate.

MAL NO: MAL19987379A

Manufacturer

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Penang, Malaysia.

Date of revision

10-04-2012

KETOZOL TABLET

Ketoconazole 200mg

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Ketozol*
- Bagaimana *Ketozol* berfungsi
- Sebelum mengambil *Ketozol*
- Cara menggunakan *Ketozol*
- Semasa menggunakan *Ketozol*
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Ketozol*
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Ketozol*

Untuk jangkitan setempat (panau, jangkitan kulat dan bau kaki) jika jangkitan tidak dapat dirawat oleh secara topikal kerana tempat atau keterukan jangkitan; atau gagal dengan rawatan setempat. Ia juga digunakan untuk jangkitan kulat sistemik dan sebagai langkah kawalan untuk mengelakkan jangkitan kulat pesakit yang system pertahanan badan lemah. Nota: Ketokonazol tidak tembus ke dalam system saraf pusat. Jadi, ia tidak berkesan dalam rawatan inflamasi kulat lapisan otak.

Bagaimana *Ketozol* berfungsi

Ketokonazol adalah agen antikulat yang menjelaskan pembuatan dan penyerapan lapisan sel kulat sensitif. Ia dilaporkan menghalang pertumbuhan kulat. Ketokonazol mempunyai bidang aktiviti antimikrobial luas, termasuk terhadap *Candida spp*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Epidermophyton floccosum*, *Histoplasmosis capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis*, *malassezia furfur*, *Microsporum canis*, *Trichophyton mentagrophytes* and *T.rubrum*.

Sebelum mengambil *Ketozol*

Bila tidak boleh mengambil

Jikalau digunakan bersama dengan astemizole, cisapride dan terfenadine, alergi, kehamilan dan penyakit hati.

Sebelum mula mengambil

Untuk rawatan lebih daripada 2 minggu, ujian fungsi hati perlu dijalankan bermula rawatan, selepas 2 minggu dan setiap bulan berikutnya.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan bersama dengan ubat

yang mengurangkan keasidan perut seperti agen antikolinergik, antasid dan penghalang penerima H₂, mungkin mengurangkan penyerapan ketokonazol. Ketokonazol dilaporkan meningkatkan kepekatan darah klordiazeposida, siklosporin, metilprednisolon dan kuinidin. Kesan antibiku darah seperti warfarin mungkin ditingkatkan oleh ketokonazol. Ketokonazol merencat metabolisma terfenadine, lalu meningkatkan risiko jantung. Penyerapan bentuk dos terkawal teofilin dikurangkan oleh ketokonazol. Penggunaan bersama dengan rifampicin mengurangkan kesan antikulat. Penggunaan bersama dengan fenitoin mungkin menjelaskan kepekatan darah kedua-dua ubat.

Cara menggunakan *Ketozol*

Berapa banyak harus diambil

Kanak-kanak bawah 2 tahun: Dos tidak ditentukan. Lebih 2 tahun: 3.3 – 6.6mg/kg/hari. Rawatan perlu diteruskan selama 1 minggu selepas semua tanda hilang dan kultur negatif. Dewasa – Pencegahan jangkitan kulat: 200mg sekali sehari. Boleh ditingkatkan kepada 400mg jika alasan kesan tidak diperolehi. Tinea versicolor: 200mg sekali sehari untuk 5 – 10 hari. Jangkitan lain: 200 – 400mg sekali sehari untuk 5 – 10 hari. Vaginal candidiasis: 200mg sekali sehari untuk 3 – 5 hari.

Mucocutaneous candidiasis: 200mg sehari. Mungkin memerlukan pengubatan selamanya bagi mengelakkan penyakit berulang. Histoplasmosis: 400 – 800mg sehari untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Semua dos perlu diambil dengan makanan untuk meningkatkan penyerapan.

Bila perlu diambil

Ambil ketokonazol mengikut arahan oleh doktor

Berapa lama perlu diambil

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa mengambil

Jangan mengambil dos berganda sebagai gantian dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan *Ketozol*

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Pengambilan ubat mestilah seperti yang diarahkan.

Perkara yang perlu diberi perhatian
Beritahu doktor jika hamil atau penyusuan semasa rawatan,

Kesan-kesan sampingan

Gangguan gastrousus adalah kesan sampingan paling kerap dilaporkan seperti loya, muntah, cirit-birit, sembelit dan kesakitan abdomen. Kesan-kesan sampingan adalah berkaitan dengan dos dan boleh dikurangkan dengan pengambilan makanan. Peningkatan sementara enzim hati tanpa menonjolkan tandanya mungkin berlaku. Kesan-kesan sampingan lain termasuk alahan, kegatalan, ruam, sakit kepala, pening kepala, mengantuk, gangguan haid, alahan cahaya, rasa kebas, keguguran rambut, impotens dan peningkatan tekanan tengkorak. Pengurangan platelet darah jarang dilaporkan.

Cara penyimpanan dan pelupusan *Ketozol*

Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet putih, bulat dan skor atas.

Bahan-bahan kandungan

ketokonazol, tepung jagung, polivinilpirolidone, magnesium sterat.

MAL NO: MAL19987379A

Pengilang

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10-04-2012

Pemegang pendaftaran keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

Pulau Pinang, Malaysia.