

# NAFINE CREAM

Terbinafine hydrochloride (1% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nafine
2. Bagaimana Nafine berfungsi
3. Sebelum menggunakan Nafine
4. Cara menggunakan Nafine
5. Semasa menggunakan Nafine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nafine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Nafine

Ia digunakan untuk merawat jangkitan kulit oleh kulat, yis dan pityriasis versicolor (jangkitan kulat pada kulit).

## Bagaimana Nafine berfungsi

Nafine membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

## Sebelum menggunakan Nafine

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jika ada alahan terhadap terbinafine hydrochloride, atau ramuan-ramuan lain Nafine.

### - Sebelum mula menggunakan Nafine

Elakkan terkena mata. Jika iritasi berlaku pada anda yang sensitif, penggunaan dihentikan.

### *Kehamilan dan menyusukan anak*

Terbinafine tidak dicadangkan untuk wanita hamil dan ibu yang menyusukan anak kecuali penggunaannya mengatasi risiko yang ada. Terbinafine terdapat dalam susu ibu.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja dan biasanya kurang kesan ke atas ubat-ubat lain. Walaupun demikian, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika sedang mengambil ubat-ubat lain.

## Cara menggunakan Nafine

### - Berapa banyak harus digunakan

Basuh dan keringkan bahagian berkenaan. Sapu krim satu atau dua kali sehari. Jangka rawatan:

Jangkitan kulat kaki: 1 minggu.

Kaki, tangan dan celah paha: 1-2 minggu.

Kulit: 2 minggu.

Sapu bahagian berkenaan satu atau dua kali sehari sehingga tanda-tanda hilang sepenuhnya.

### - Bila perlu digunakan

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Berapa lama perlu digunakan

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Jika terlupa menggunakan

Guna sebaik sahaja teringat. Selepas itu, gunakan semula mengikut jadual biasa anda.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

## Semasa menggunakan Nafine

### - Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan ubat kecuali atas arahan doktor.

## Kesan-kesan sampingan

Iritasi setempat (kemerahan, sakit atau gatal) kadangkala berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

## Cara penyimpanan dan pelupusan Nafine

### - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

### - Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Krim warna putih.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: *terbinafine hydrochloride*
- Bahan tidak aktif: *methyl parabens, propyl parabens, propylene glycol, cetomacrogol emulsifying wax, white soft paraffin, sodium lauryl sulphate, cetostearyl alcohol, sodium hydroxide, sodium citrate, citric acid* dan air.

### - Nombor MAL:

MAL07010970X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

08/08/2017

## Nombor siri

NPRA(R4/1)070817/00194