

AVANDIA TABLET 2MG
AVANDIA TABLET 4MG
AVANDIA TABLET 8MG
Rosiglitazone maleate

What is in this leaflet

1. What AVANDIA Tablets are and what they are used for
2. Before you take AVANDIA Tablets
3. How to take AVANDIA Tablets
4. Possible side effects
5. How to store AVANDIA Tablets
6. Further Information

What AVANDIA is used for

AVANDIA is a prescription used with diet and exercise to treat certain adults with type 2 (“adult-onset” or “non-insulin dependent”) diabetes mellitus (“high blood sugar”) who are:

- Already taking AVANDIA or
- Unable to control their blood sugar on other diabetes medicines, and after talking with their doctor have decided not to take pioglitazone (ACTOS)

AVANDIA is not for people with type 1 diabetes mellitus or to treat a condition called diabetic ketoacidosis. It is not known if AVANDIA is safe and effective in children under 18 years old.

How AVANDIA works

AVANDIA helps to control high blood sugar. AVANDIA may be used alone or with other diabetes medicines. AVANDIA can help your body respond better to insulin made in your body. AVANDIA does not cause your body to make more insulin.

Before you take AVANDIA

When you must not take it

Many people with heart failure should not start taking AVANDIA. See “Before you start to take it”.

Before you start to take it

Before taking AVANDIA, ask your doctor about what the choices are for diabetes medicines, and what the expected benefits and possible risks are for you in particular. Before taking AVANDIA, tell your doctor about all your medical conditions, including if you:

- **Have heart problems or heart failure**
- **Have type 1 (“juvenile”) diabetes or had diabetic ketoacidosis.** These conditions should be treated with insulin.
- **Have a type of diabetic eye disease called macular edema** (swelling of the back of the eye)
- **Have liver problems.** Your doctor should do blood tests to check your liver before you start taking AVANDIA and during treatment as needed
- **Had liver problems while taking REZULIN[®]** (troglitazone), another medicine for diabetes
- **Are pregnant or plan to become pregnant.**

AVANDIA should not be used during pregnancy. It is not known if AVANDIA can harm your unborn baby. You and your doctor should talk about the best way to control your diabetes during pregnancy. If you are a premenopausal woman (before the “change of life”) who does not have regular monthly periods, AVANDIA may increase your chances of becoming pregnant. Talk to your doctor about birth control choices while taking AVANDIA. Tell your doctor

right away if you become pregnant while taking AVANDIA.

- **Are breast-feeding or planning to breast-feed.** It is not known if AVANDIA passes into breast milk. You should not use AVANDIA while breast-feeding.

Taking other medicines

Tell your doctor about all the medicines you take including prescription and non-prescription medicines, vitamins or herbal supplements. AVANDIA and certain other medicines can affect each other and may lead to serious side effects including high or low blood sugar, or heart problems. Especially tell your doctor if you take:

- **Insulin**
- **Any medicines for high blood pressure, high cholesterol or heart failure, or for prevention of heart disease or stroke**

Know the medicines you take. Keep a list of all your medicines and show it to your doctor or pharmacist before you start a new medicine. They will tell you if it is alright to take AVANDIA with other medicines.

How to take AVANDIA Tablets

How much to take

Take AVANDIA exactly as prescribed. Your doctor will tell you how many tablets to take and how often. The usual daily starting dose is 4mg a day taken one time each day or 2mg taken two times each day. Your doctor may need to adjust your dose until your blood sugar is better controlled.

When to take it

AVANDIA may be prescribed alone or with other diabetes medicines. This will depend on how well your blood sugar is controlled. Take AVANDIA with or without food.

How long to take it

It can take 2 weeks for AVANDIA to start lowering blood sugar. It may take 2 to 3 months to see the full effect on your blood sugar level.

If you forget to take it

If you miss a dose of AVANDIA, take it as soon as you remember, unless it is time to take your next dose. Take your next dose at the usual time. Do not take double doses to make up for a missed dose.

If you take too much (overdose)

If you take too much AVANDIA, call your doctor or poison control center right away.

While you are using AVANDIA)

Things you must do

Test your blood sugar regularly as your doctor tells you. Diet and exercise can help your body use its blood sugar better. It is important to stay on your recommended diet, lose extra weight, and get regular exercise while taking AVANDIA. Your doctor should do blood tests to check your liver before you start AVANDIA and during treatment as needed. Your doctor should also do regular blood sugar tests (for example, "A1C") to monitor your response to AVANDIA.

Things you must not do

Do not use AVANDIA for a condition for which it was not prescribed. Do not give AVANDIA to other people, even if they have the same

symptoms you have. It may harm them.

Things to be careful of

New or worse heart failure

- AVANDIA, can cause your body to keep extra fluid (fluid retention), which leads to swelling (edema) and weight gain. Extra body fluid can make some heart problems worse or lead to heart failure. Heart failure means your heart does not pump blood well enough.

- If you have severe heart failure, you cannot start AVANDIA.
- If you have heart failure with symptoms (such as shortness of breath or swelling), even if these symptoms are not severe, AVANDIA may not be right for you.

Call your doctor right away if you have any of the following:

- Swelling or fluid retention, especially in the ankles or legs
- Shortness of breath or trouble breathing, especially when you lie down
- An unusually fast increase in weight
- Unusual tiredness

Myocardial Infarction ("Heart Attack")

AVANDIA may raise the risk of heart attack. The risk of having a heart attack may be higher in people who take AVANDIA with insulin. Most people who take insulin should not also take AVANDIA.

Symptoms of a heart attack can include the following:

- Chest discomfort in the center of your chest that lasts for more than a few minutes, or that goes away or comes back
- Chest discomfort that feels like uncomfortable pressure, squeezing, fullness or pain
- Pain or discomfort in your arms, back, neck, jaw or stomach

- Shortness of breath with or without chest discomfort
- Breaking out in a cold sweat
- Nausea or vomiting
- Feeling lightheaded

Call your doctor or go to the nearest hospital emergency room right away if you think you are having a heart attack.

People with diabetes have a greater risk for heart problems. It is important to work with your doctor to manage other conditions, such as high blood pressure or high cholesterol. AVANDIA can have other serious side effects. Be sure to read the section below "Side Effects".

Side Effects

AVANDIA may cause serious side effects, including:

- **New or worse heart failure.** See "Things to be careful of"
- **Heart attack.** See "Things to be careful of"
- **Swelling (edema).** AVANDIA can cause swelling due to fluid retention. See "Things to be careful of"
- **Weight gain.** Rosiglitazone, one of the medicines in AVANDIA, can cause weight gain that may be due to fluid retention or extra body fat. Weight gain can be a serious problem for people with certain conditions including heart problems. See "Things to be careful of"
- **Liver problems.** It is important for your liver to be working normally when you take AVANDIA. Your doctor should do blood tests to check your liver before you start taking AVANDIA and during treatment as needed. Call your doctor right away if you have unexplained symptoms such as:
 - nausea or vomiting
 - stomach pain

- unusual or unexplained tiredness
- loss of appetite
- dark urine
- yellowing of your skin or the whites of your eyes
- **Macular edema** (a diabetic eye disease with swelling in the back of the eye). Tell your doctor right away if you have any changes in your vision. Your doctor should check your eyes regularly. Very rarely, some people have had vision changes due to swelling in the back of the eye while taking rosiglitazone, one of the medicines in AVANDIA.
- **Fractures** (broken bones), usually in the hand, upper arm or foot. Talk to your doctor for advice on how to keep your bones healthy.
- **Low red blood cell count (anemia)**
- **Low blood sugar (hypoglycemia).** Lightheadedness, dizziness, shakiness or hunger may mean that your blood sugar is too low. This can happen if you skip meals, if you use another medicine that lowers blood sugar, or if you have certain medical problems. Call your doctor if low blood sugar levels are a problem for you.
- **Ovulation** (release of egg from an ovary in a woman) leading to pregnancy. Ovulation may happen in premenopausal women who do not have regular monthly periods. This can increase the chance of pregnancy. See “Things to be careful of”

The most common side effects of AVANDIA reported in clinical trials included cold-like symptoms and headache.

Storage and Disposal of AVANDIA

- Store AVANDIA below 30°C

- Keep AVANDIA in the container it comes in. Keep the container closed tightly.
- Safely, throw away AVANDIA that is out of date or no longer needed. Keep AVANDIA and all medicines out of reach of children.

Product Description

What it looks like

Always check to make sure that the medicine you are taking is the correct one. AVANDIA tablets are triangles with rounded corners and look like this:

- 2mg – pink with “SB” on one side and “2” on the other
- 4mg – orange with “SB” on one side and “4” on the other
- 8mg – red-brown with “SB” on one side and “8” on the other

Ingredients

Active Ingredients:

Rosiglitazone maleate

Inactive Ingredients:

hydroxypropylmethyl cellulose, opadry OY-L-24802 or opadry orange OY-L-23028 or opadry OY-L-24803, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, magnesium stearate, sodium starch glycollate

AVANDIA TABLET 2MG
MAL20000007A

AVANDIA TABLET 4MG
MAL20000008A

AVANDIA TABLET 8MG
MAL20000009A

Manufacturer

Glaxo Wellcome S.A.
Avenida De Extremadura 3,
09400 Aranda De Duero,
Burgos, Spain

Date of Revision

16 April 2012

AVANDIA is a registered trademark of GlaxoSmithKline. The other brands listed are trademarks of their respective owners and are not trademarks of GlaxoSmithKline. The makers of these brands are not affiliated with and do not endorse GlaxoSmithKline or its products.

TABLET AVANDIA 2MG
TABLET AVANDIA 4MG
TABLET AVANDIA 8MG
Rosiglitazone maleate

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah dia Tablet AVANDIA dan apakah kegunaannya
2. Sebelum anda mengambil Tablet AVANDIA
3. Bagaimana untuk mengambil Tablet AVANDIA
4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku
5. Bagaimana untuk menyimpan Tablet AVANDIA
6. Maklumat lanjut

Apakah kegunaan AVANDIA

AVANDIA adalah ubat preskripsi yang digunakan bersama pemakanan yang seimbang dan senaman untuk merawat sesetengah orang dewasa yang menghadapi diabetes (paras gula yang tinggi dalam darah) jenis 2 (“peringkat permulaan dewasa” atau “tidak bergantung kepada insulin”) yang:

- Telah mengambil AVANDIA atau
- Tidak dapat mengawal paras gula dalam darah dengan penggunaan ubatan diabetes yang lain dan selepas berbincang dengan doktor mereka telah memutuskan untuk tidak mengambil pioglitazone (ACTOS)

AVANDIA bukan untuk kegunaan pesakit diabetes mellitus jenis 1 atau untuk merawat satu keadaan yang dikenali sebagai ketoasidosis diabetes.

Tidak diketahui sama ada AVANDIA selamat dan berkesan di kalangan kanak-kanak berusia di bawah umur 18 tahun.

Bagaimana AVANDIA berfungsi

AVANDIA membantu mengawal paras gula yang tinggi di dalam darah. AVANDIA boleh digunakan secara tunggal atau sebagai kombinasi dengan ubatan diabetes yang lain. AVANDIA membolehkan badan anda bertindak balas dengan lebih baik terhadap insulin yang dihasilkan di dalam badan anda. AVANDIA tidak menyebabkan badan anda menghasilkan lebih banyak insulin.

Sebelum mengambil AVANDIA

Bila tidak boleh mengambil
Ramai pesakit yang mengalami kegagalan jantung tidak sepatutnya mula mengambil AVANDIA. Sila lihat “Sebelum mula mengambil”.

Sebelum mula mengambil

Sebelum mula mengambil AVANDIA, tanya kepada doktor anda apakah pilihan yang ada untuk ubatan diabetes dan apakah manfaat yang dapat dijangka dan risiko yang mungkin terjadi secara khusus kepada anda.

Sebelum mengambil AVANDIA, beritahu doktor anda tentang semua keadaan perubatan anda termasuklah jika anda:

- Mempunyai masalah jantung atau kegagalan jantung
- Mempunyai diabetes jenis 1 (“awal remaja”) atau ketoasidosis diabetes. Keadaan ini perlu dirawat dengan insulin.
- Mempunyai sejenis penyakit mata disebabkan diabetes yang dikenali sebagai edema makular (bengkak pada bahagian belakang mata)
- Mempunyai masalah hati. Doktor anda perlu

menjalankan ujian darah untuk memeriksa hati anda sebelum memulakan pengambilan AVANDIA dan semasa rawatan jika diperlukan

- Mempunyai masalah hati ketika mengambil REZULIN® (troglitazone), ubatan lain bagi pesakit diabetes
- Hamil atau merancang untuk hamil. AVANDIA tidak sepatutnya digunakan ketika hamil. Adalah tidak diketahui samada AVANDIA selamat untuk bayi yang berada di dalam kandungan. Anda dan doktor anda seharusnya berbincang tentang cara yang terbaik untuk mengawal keadaan diabetes semasa anda hamil. Jika anda wanita yang berada dalam fasa pra putus haid (sebelum putus haid) yang mempunyai haid yang tidak teratur pada setiap bulan, AVANDIA boleh meningkatkan peluang anda untuk hamil. Bincang dengan doktor anda tentang pilihan perancang kehamilan semasa mengambil AVANDIA. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil ketika mengambil AVANDIA
- Sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi. Adalah tidak diketahui jika AVANDIA boleh menjadi sebahagian daripada susu ibu. Anda tidak sepatutnya mengambil AVANDIA ketika sedang menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda tentang semua ubatan yang diambil termasuklah ubat yang dipreskripsi dan tidak dipreskripsi, vitamin atau

suplemen herba. AVANDIA dan sesetengah ubatan lain boleh bertindakbalas sesama sendiri dan boleh membawa kepada kesan sampingan yang serius termasuklah kandungan gula yang tinggi atau rendah dalam darah, atau masalah jantung. Beritahu doktor anda terutamanya jika anda mengambil:

- Insulin
- Sebarang ubatan untuk tekanan darah tinggi, kandungan kolesterol yang tinggi atau kegagalan jantung, atau untuk pencegahan penyakit jantung atau angin ahmar

Kenali ubatan yang anda ambil. Simpan senarai ubatan anda dan tunjukkan kepada doktor dan ahli farmasi anda sebelum memulakan ubat yang baru. Mereka akan beritahu anda jika AVANDIA selamat diambil bersama ubatan yang lain.

Cara menggunakan AVANDIA

Berapa banyak harus diambil
Ambil AVANDIA seperti yang telah dipreskripsikan. Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak tablet yang perlu anda ambil dan berapa kerap anda perlu mengambilnya. Dos harian biasa bermula dari 4mg sehari diambil satu kali setiap hari atau 2mg diambil dua kali sehari. Doktor anda mungkin perlu menyesuaikan dos anda sehingga paras gula dalam darah anda dapat dikawal dengan lebih baik.

Bila perlu diambil

AVANDIA mungkin dipreskripsikan bersendirian atau bersama ubatan diabetes yang lain. Ia bergantung kepada sebaik mana gula dalam darah anda dikawal. Ambil AVANDIA bersama atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu diambil

AVANDIA mungkin mengambil masa sehingga 2 minggu untuk merendahkan gula dalam darah anda. Mungkin ia mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk menunjukkan kesan keseluruhan ke atas paras gula dalam darah anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda tertinggal satu dos AVANDIA, ambil dengan segera sebaik sahaja anda teringat, kecuali jika sudah sampai masa untuk anda mengambil dos yang seterusnya. Ambil dos yang seterusnya pada masa yang selalu anda ambil. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang telah tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak AVANDIA, sila hubungi doktor anda atau pusat pengawalan racun dengan segera.

Semasa menggunakan AVANDIA

Perkara yang perlu dilakukan
Periksa paras gula dalam darah anda secara kerap seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Pemakanan seimbang dan senaman dapat membantu tubuh anda menggunakan gula dalam darah dengan lebih baik. Adalah penting untuk mengikut pemakanan seimbang yang dicadangkan, menurunkan berat badan yang berlebihan dan bersenam secara teratur semasa mengambil AVANDIA. Doktor anda perlu menjalankan ujian darah untuk memeriksa hati anda sebelum anda mula mengambil AVANDIA dan semasa rawatan, jika perlu. Doktor anda juga perlu menjalankan pemeriksaan gula dalam darah secara kerap (contohnya, "A1C") untuk

memantau respon anda kepada AVANDIA.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat-ubatan kadang kala dipreskripsi untuk kegunaan selain daripada yang telah disenaraikan dalam RiMUP. Jangan gunakan AVANDIA untuk keadaan yang tidak dipreskripsikan. Jangan beri AVANDIA kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama seperti anda. Ia boleh membahayakan mereka.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Kegagalan jantung yang baru atau lebih teruk

- Rosiglitazone, salah satu ubat dalam AVANDIA, boleh menyebabkan tubuh anda menyimpan lebih cecair (pengumpulan cecair), yang boleh menyebabkan kebengkakan (edema) dan peningkatan berat badan. Cecair badan yang berlebihan boleh menyebabkan sesetengah masalah jantung menjadi lebih teruk atau membawa kepada kegagalan jantung. Kegagalan jantung bermaksud jantung anda tidak dapat mengepam darah dengan baik.
 - Jika anda mempunyai kegagalan jantung yang teruk, anda tidak boleh mula mengambil AVANDIA.
 - Jika anda mempunyai kegagalan jantung dengan tanda-tanda (seperti sesak nafas atau kebengkakan) walaupun ianya tidak teruk, AVANDIA mungkin tidak sesuai untuk anda.
- Sila hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami perkara berikut:
- Kebengkakan atau pengumpulan cecair,

terutamanya di bahagian buku lali atau kaki

- Sesak nafas atau kesukaran bernafas, terutamanya ketika anda baring
- Peningkatan berat badan yang luar biasa
- Keletihan yang luar biasa

Infark Miokardium (“Serangan Jantung”)

Rosiglitazone, salah satu ubat dalam AVANDIA, boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Risiko untuk mendapat serangan jantung mungkin meningkat dikalangan mereka yang mengambil AVANDIA bersama insulin. Kebanyakan orang yang mengambil insulin tidak sepatutnya mengambil AVANDIA pada masa yang sama.

Tanda-tanda serangan jantung boleh merangkumi perkara-perkara berikut:

- Rasa tidak selesa di bahagian tengah dada yang berlarutan lebih daripada beberapa minit, atau sakit yang hilang dan datang kembali
- Sakit atau tidak selesa pada lengan, bahagian belakang badan, leher, rahang atau perut
- Sesak nafas dengan atau tanpa rasa tidak selesa di dada
- Berpeluh walau kesejukan
- Loya atau muntah
- Rasa pitam

Jika anda berasa anda mengalami serangan jantung, hubungi doktor anda atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang berdekatan dengan segera.

Pesakit diabetes mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah jantung. Adalah penting untuk bekerjasama dengan doktor anda untuk mengawal keadaan lain seperti tekanan darah tinggi atau tahap kolesterol tinggi.

AVANDIA boleh mempunyai kesan sampingan lain yang

serius. Pastikan anda membaca bahagian di bawah “Kesan-kesan sampingan”.

Kesan-kesan sampingan

AVANDIA boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius termasuklah:

- Kegagalan jantung yang baru atau teruk. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Serangan jantung. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Bengkak (edema). AVANDIA boleh menyebabkan bengkak disebabkan pengumpulan cecair dalam badan. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Peningkatan berat badan. AVANDIA boleh menyebabkan peningkatan berat badan yang disebabkan oleh pengumpulan cecair atau lebih lemak dalam badan. Peningkatan berat badan boleh menjadi masalah serius bagi mereka yang mempunyai keadaan tertentu termasuk masalah jantung. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Masalah hati. Adalah penting untuk hati anda berfungsi dengan baik semasa pengambilan AVANDIA. Doktor anda perlu melakukan ujian darah untuk memeriksa hati anda sebelum anda mula mengambil AVANDIA dan semasa dalam rawatan, jika perlu. Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mempunyai tanda-tanda yang tidak dapat dijelaskan seperti berikut:
 - Loya atau muntah
 - Sakit perut
 - Keletihan luar biasa atau tidak dapat dijelaskan
 - Hilang selera makan
 - Warna air kencing yang gelap

- Warna kekuningan pada kulit atau pada mata anda
- Edema macula (satu penyakit mata disebabkan diabetes yang melibatkan bengkak pada bahagian belakang mata). Sila beritahu doktor anda dengan segera jika terdapat sebarang perubahan pada penglihatan anda. Doktor anda perlulah memeriksa mata anda secara berkala. Sesetengah orang mengalami perubahan pada penglihatan disebabkan pembengkakan di bahagian belakang mata semasa mengambil rosiglitazone, salah satu kandungan ubat di dalam AVANDIA namun keadaan ini jarang sekali berlaku.
- Retakan (patah tulang), selalunya berlaku pada bahagian tangan, bahagian atas lengan atau kaki. Bincanglah dengan doktor anda untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk memastikan tulang anda sihat.
- Kekurangan sel darah merah (anemia)
- Paras gula yang rendah dalam darah (hipoglisemia). Rasa pitam, pening, menggeletar atau berasa lapar mungkin bermaksud paras gula yang terlalu rendah dalam darah. Ia boleh berlaku jika anda mengakibatkan pemakanan anda, menggunakan ubatan lain yang boleh menurunkan gula dalam darah atau jika anda mempunyai masalah kesihatan tertentu. Sila hubungi doktor anda sekiranya paras gula yang rendah menjadi satu masalah bagi anda.
- Ovulasi (perlepasan telur dari ovary wanita) yang boleh menyebabkan kehamilan. Ovulasi mungkin berlaku kepada wanita pra putus haid yang tidak mempunyai kitaran

haid yang teratur. Keadaan ini boleh meningkatkan peluang untuk hamil. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”

Kesan sampingan AVANDIA yang selalu berlaku dan telah dilaporkan dalam ujian klinik termasuk tanda-tanda seperti selesema dan sakit kepala. Sila hubungi doktor anda untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang kesan sampingan ubatan.

Cara penyimpanan dan

pelupusan Tablet AVANDIA
Simpan AVANDIA di bawah suhu 30°C. Simpan AVANDIA di dalam bekas yang telah disediakan. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Sila lupuskan AVANDIA yang telah tamat tempoh dengan selamat. Simpan dan jauhkan AVANDIA dan ubatan lain daripada capaian kanak-kanak.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Sentiasa pastikan ubat yang anda ambil adalah betul. Tablet AVANDIA berbentuk segi tiga dengan sudut melengkung dan kelihatan seperti berikut:

- 2mg – merah jambu dengan “SB” di atas salah satu permukaan dan “2” di permukaan yang lain
- 4mg – oren dengan “SB” di atas salah satu permukaan dan “4” di permukaan yang lain
- 8mg – merah-coklat dengan “SB” di atas salah satu permukaan dan “8” di permukaan yang lain

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: Rosiglitazone maleate

Bahan Tidak Aktif: selulosa hidroxypropylmethyl, opadry OY-L-24802 or opadry orange OY-L-23028 or opadry OY-L-24803, selulosa mikrokristalin,

laktosa monohidrat, magnesium stearat, glikolat kanji natrium

AVANDIA TABLET 2MG
MAL20000007A

AVANDIA TABLET 4MG
MAL20000008A

AVANDIA TABLET 8MG
MAL20000009A

Pengilang

Glaxo Wellcome S.A.
Avenida De Extremadura 3,
09400 Aranda De Duero,
Burgos, Spain

Tarikh kemaskini RiMUP

16 April 2012

AVANDIA adalah cap dagangan berdaftar GlaxoSmithKline. Jenama lain yang tersenarai adalah cap dagangan pemilik masing-masing dan bukan cap dagangan GlaxoSmithKline. Pembuat jenama-jenama tersebut tidak berkaitan dan tidak mengesahkan GlaxoSmithKline atau produknya.