

UROSIN Film Coated Tablet

Atenolol 50mg & 100mg

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about UROSIN. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What UROSIN Film Coated Tablet is used for

For the treatment of hypertension and angina pectoris.

How UROSIN Film Coated Tablet works

UROSIN known as beta-blocker, are medication that reduces your blood pressure. UROSIN works by blocking the effects of the hormone epinephrine, also known as adrenaline. When you take UROSIN, the heart beats more slowly and with less force, thereby reducing blood pressure. UROSIN also help blood vessels open up to improve blood flow.

Before you use UROSIN Film Coated Tablet

When you must not take it

When you are allergic to atenolol or you have asthma as well as any history of obstructive airway diseases. Please consult your doctor if you have other heart problem.

Before you start to take it

Tell your doctor if you are using any other medicines.

Taking other medicines

Salbutamol and isoprenaline can be used together with atenolol but appropriate care should be taken. Care is needed when β -blockers are combined with class I antiarrhythmic agents, (e.g. disopyramide) or calcium antagonists of the verapamil type.

How to take UROSIN Film Coated Tablet

How much to take

For hypertension, 50-100mg per day alone or in conjunction with other antihypertensive agents. Angina pectoris: 50-100mg once a day or in divided doses for most patients. Increasing the dosage more than 100mg is unlikely to produce more beneficial effects.

When to take it

UROSIN Film Coated Tablet should be taken according to doctor's instruction.

How long to take it

UROSIN Film Coated Tablet should be taken according to doctor's advice.

If you forgot to take it

If you miss a dose of UROSIN and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else has taken too much UROSIN.

While you are using UROSIN Film Coated Tablet

Things you must do

Take the tablet according to doctor's instruction.

Things you must not do _____

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give UROSIN to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Should be used with caution in patient with bronchospastic disease, hyperthyroidism and hypoglycemia. This product should be avoided in pregnant and nursing women.

Side effects

Bradycardia, cold extremities, postural hypotension, dizziness, vertigo, nausea, diarrhea, fatigue, skin rash, and dry eyes.

After using UROSIN Film Coated Tablet

Storage


Keep in a tight container. Store below 30°C, protect from light & moisture.

Disposal


If your doctor or pharmacist tells you to stop taking UROSIN or the tablet has passed the expiry date, ask your doctor or pharmacist what to do with any that is left over.

Product description

What it looks like

UROSIN Film Coated Tablet 50mg: A white round film coated tablet and one side with the mark “”

UROSIN Film Coated Tablet 100mg: A white color film coated tablet, one side

impressed with the mark “”.

Ingredients

Atenolol
Hydroxypropyl Methycellulose
Silicon Dioxide
Dimethicone
Talc
Magnesium Stearate
Cellulose
Cellulose Calcium

MAL no.

MAL 20013576A (50mg)

MAL 19962580A (100mg)

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Date of revision :

17th November 2011

UROSIN Film Coated Tablet

Atenolol 50mg & 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang UROSIN. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan UROSIN Film Coated Tablet

Untuk rawatan tekanan darah tinggi dan pectoris angina.

Bagaimana UROSIN Film Coated Tablet berfungsi

UROSIN dikenali sebagai beta-blocker. Ia adalah sejenis ubat yang boleh mengurangkan tekanan darah. UROSIN berfungsi dengan menghalang kesan hormon epinephrine, juga dikenali sebagai adrenalin. Apabila anda mengambil UROSIN, jantung berdegup lebih perlahan dan dengan daya yang lebih lemah, seterusnya mengurangkan tekanan darah. UROSIN juga membantu dalam pembukaan saluran darah dan memperbaiki aliran darah.

Sebelum Mengambil UROSIN Film Coated Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah dengan atenolol atau anda mempunyai asma serta sejarah penyakit saluran pernafasan obstruktif. Sila rujuk kepada doktor anda jika anda mempunyai sebarang masalah jantung.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Salbutamol dan isoprenaline boleh diguna bersama dengan atenolol tetapi ubatan ini harus digunakan dengan berhati-hati. Perhatian perlu diberi semasa β -blockers digabung dengan agen antiaritmia kelas I (seperti, disopyramide) atau antagonis kalsium jenis verapamil.

Cara menggunakan UROSIN Film Coated Tablet

Berapa banyak harus diambil

Tekanan darah tinggi: 50-100mg sehari atau bergabung dengan agen antihipertensif yang lain. Pectoris angina: 50-100mg sekali sehari atau dibahagi kepada beberapa dos bagi kebanyakan pesakit. Penambahan dos melebihi 100mg tidak semestinya menghasilkan kesan yang lebih baik.

Bila perlu diambil

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

Berapa lama perlu diambil

Ia perlu diambil mengikut nasihat doktor.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan UROSIN Film Coated Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan beri ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit mempunyai penyakit bronkospastik, hiperthyroidism dan hipoglycemia. Elakkan pengambilan ubat ini pada wanita mengandung dan menyusu.

Kesan-kesan sampingan

Bradikardia, tangan dan kaki sejuk, hipotensi postur, pening, vertigo, loya, cirit-birit, keletihan, ruam, dan mata kering.

Selepas menggunakan UROSIN Film Coated Tablet

Cara penyimpanan


Simpan dalam bekas dan di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan


Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan supaya berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

UROSIN Film Coated Tablet 50mg: Tablet bersalut berwarna putih dengan bentuk “” pada satu permukaan.

UROSIN Film Coated Tablet 100mg: Tablet bersalut berwarna putih dengan

bentuk “” pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Atenolol
Hydroxypropyl Methylcellulose
Silicon Dioxide
Dimethicone
Talc
Magnesium Stearate
Cellulose
Cellulose Calcium

MAL no.

MAL 20013576A (50mg)

MAL 19962580A (100mg)

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

Marketing Authorization Holder:

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

17th November 2011