

# FRUSIX TABLET 40 mg®

FRUSEMIDE TABLET 40 mg

<p><b><u>What is in this leaflet:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. What Frusix Tablet 40 mg is used for</li><li>2. How Frusix Tablet 40 mg works</li><li>3. Before you use Frusix Tablet 40 mg</li><li>4. How to take Frusix Tablet 40 mg</li><li>5. While you are using Frusix Tablet 40 mg</li><li>6. Side Effects</li><li>7. How to store and dispose</li><li>8. Product description</li></ol>	<p>Speak to your doctor before you take Frusix Tablet 40 mg if you are pregnant, thinking of getting pregnant, or breast feeding.</p>	<p><b><u>Side Effects</u></b></p> <p>The most common side effect is fluid and electrolytes imbalance. Other side effects are allergy, nausea, diarrhoea, blurred vision, dizziness, headache, abdominal pain, low blood pressure and muscle cramps.</p>
<p><b><u>What Frusix Tablet 40 mg is used for</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg is used to treat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fluid retention caused by heart failure.</li><li>2. High blood pressure.</li><li>3. Certain kidney and liver disease.</li></ol>	<p><b><u>When to take it</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg should be swallowed with a drink of water at about the same time each day, on an empty stomach, unless your doctor tells you otherwise.</p> <p>Take the last dose not later than 2 pm to avoid sleep being disturbed.</p>	<p><b><u>How to store and dispose</u></b></p> <p><b><u>Storage</u></b></p> <p>Keep container tightly closed in a dry place, below 25°C. Protect from light. Keep out of the reach of children..</p>
<p><b><u>How Frusix Tablet 40 mg works</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg works by making your kidneys pass more water and salt. This helps reduce high blood pressure and some forms of swelling.</p>	<p><b><u>How long to take it</u></b></p> <p>Do not stop taking this medicine unless your doctor tells you to stop. Frusix Tablet 40 mg must be taken every day. Make sure you have enough Frusix Tablet 40 mg to last over weekends and holidays.</p>	<p><b><u>Disposal</u></b></p> <p>Do not dispose the medicine into wastewater or household garbage. Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required.</p>
<p><b><u>Before you use Frusix Tablet 40 mg</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg should not used in the following conditions:</p> <p>Allergic to any ingredient of the Frusix Tablet 40 mg and any diuretics or sulphonamides drugs, absence of urine production and overdose heart medicine.</p>	<p><b><u>If you forget to take it</u></b></p> <p>If you miss a dose of Frusix Tablet 40 mg, take it as soon as possible. Unless if nearly time for next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.</p>	<p><b><u>Product Description</u></b></p> <p><b><u>What it looks like?</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg is round, scored on one side and white color.</p> <p>The pack sizes are: Plastic Container of 30 tablets and 1000 tablets.</p>
<p><b><u>How to take Frusix Tablet 40 mg</u></b></p> <p><b><u>How much to take</u></b></p> <p>Always take the dose exactly as your doctor has told you.</p>	<p><b><u>If you take too much (overdose)</u></b></p> <p>If you have taken more than the prescribed dose, contact your doctor or pharmacist. Overdose symptoms are lightheadedness, dizziness, confusion and dehydrated.</p>	<p><b><u>Ingredients</u></b></p> <p>The active substance is Frusemide 40 mg per tablet.</p> <p>The other ingredients of Frusix Tablet 40 mg are lactose, maize starch, and magnesium stearate.</p>
<p><b><u>Adults dosage:</u></b></p> <p>The usual initial dose is 40 mg daily, reduced to 20 mg daily or 40 mg on alternate days. In some patients doses of 80 mg or more daily may be required (given as a single dose or 2 divided doses).</p> <p><b><u>Paediatric dosage:</u></b></p> <p>The usual dose is 1 to 3 mg per kg body weight daily or on alternate days.</p> <p>In the treatment of high blood pressure is given in doses of 40 to 80 mg daily, either alone, or in conjunction with other anti high blood pressure medicine.</p>	<p><b><u>While you are using Frusix Tablet 40 mg</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Do not suddenly stop taking the medicine.</li><li>2. Do not take more than the recommended dose.</li><li>3. You are advised to avoid alcohol.</li><li>4. Eat or drink foods with high potassium content e.g. oranges, banana or other citrus fruit juices to maintain fluid intake.</li><li>5. If you are about to start on any new medicine, tell your doctor that you are taking Frusix Tablet 40 mg.</li></ol>	<p><b><u>Registration Numbers:</u></b></p> <p>Frusix Tablet 40 mg: MAL19860186A</p> <p><b><u>Manufactured by:</u></b></p> <p>Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P) Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.</p>

Date of revision:

Marketing Authorisation Holder

June 8<sup>th</sup>, 2012

IDAMAN PHARMA MANUFACTURING SDN BHD

# FRUSIX TABLET 40 mg®

FRUSEMIDE TABLET 40 mg

## Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apa kegunaan Frusix Tablet 40 mg
2. Bagaimana Frusix Tablet 40 mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Frusix Tablet 40 mg
4. Cara pengambilan Frusix Tablet 40 mg
5. Semasa menggunakan Frusix Tablet 40 mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Deskripsi produk

## Apa kegunaan Frusix Tablet 40 mg

Frusix Tablet 40 mg digunakan untuk mengubati:

1. Kekurangan cairan disebabkan oleh kegagalan jantung.
2. Tekanan darah tinggi.
3. Penyakit buah pinggang dan hati tertentu.

## Bagaimana Frusix Tablet 40 mg berfungsi

Frusix tablet 40 mg bekerja dengan membuat buah pinggang anda melepasi lebih banyak air dan garam. Hal ini membantu mengurangi tekanan darah tinggi dan bentuk bengkak.

## Sebelum mengambil Frusix Tablet 40 mg

Frusix Tablet 40 mg tidak boleh digunakan dalam keadaan berikut:

Alergi terhadap bahan Frusix Tablet 40 mg dan ubat diuretik atau sulphonamide, ketiadaan pengeluaran air kencing dan mengambil ubat jantung yang terlalu banyak.

## Cara pengambilan Frusix Tablet 40 mg

### Berapa banyak untuk diambil

Dos yang diambil mengikuti arahan doktor kepada anda.

### Dos dewasa:

Dos awal yang biasa adalah 40 mg setiap hari, dikurangkan kepada 20 mg sehari atau 40 mg pada hari alternatif. Pada beberapa pesakit mungkin diperlukan dos 80 mg atau lebih setiap hari (dibahagikan sebagai dos tunggal atau dibahagikan 2 dos).

### Dos kanak-kanak:

Dos yang biasa adalah 1-3 mg bagi setiap kg berat badan setiap hari atau selang sehari.

Dalam rawatan tekanan darah tinggi dos yang diberi adalah 40 hingga 80 mg dalam sehari, samada bersendirian atau bersama ubat tekanan darah tinggi lain.

Beritahu doktor anda sebelum mengambil Frusix Tablet 40 mg jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, atau sedang dalam penyusuan

### Bila ubat diambil

Frusix Tablet 40 mg di ambil dengan air pada waktu yang sama setiap hari, dengan perut kosong, kecuali atas arahan doktor. Mengambil dos terakhir tidak lewat daripada pukul 2 petang untuk mengelakkan tidur terganggu.

### Berapa lama ubat diambil

Jangan berhenti minum ubat ini kecuali atas arahan doktor anda. Frusix Tablet 40 mg harus diambil setiap hari. Pastikan Frusix Tablet 40 mg cukup untuk diambil pada hujung minggu dan pada masa cuti.

### Jika anda lupa mengambil ubat

Jika anda terlewat mengambil dos Frusix Tablet 40 mg, ambil ubat secepat mungkin. Kecuali jika hampir masa untuk dos berikutnya, lewatkan dos tersebut dan kembali ke jadual dos rutin. Jangan mengambil 2 dos sekaligus.

### Jika anda mengambil ubat terlalu banyak

Jika anda mengambil dos lebih dari yang ditetapkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda. Tanda-tanda dos berlebihan adalah seperti rasa ringan kepala, pening, keliru dan dehidrasi.

### Semasa menggunakan Frusix Tablet 40 mg

1. Jangan berhenti mengambil ubat secara mendadak.
2. Jangan mengambil lebih dari dos yang disyorkan.
3. Anda dinasihatkan untuk mengelakkan pengambilan alkohol.
4. Makan atau minum dengan kandungan kalium yang tinggi contohnya buah oren, pisang, atau jus buah sitrus lain untuk mengekalkan kemasukan cecair.
5. Jika anda akan mula mengambil ubat baru, beritahu doktor yang anda mengambil Frusix Tablet 40 mg.

## Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan yang biasa semasa pengambilan ubat ini adalah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kesan sampingan lain adalah alahan, rasa loya, cirit-birit, penglihatan kabur, pening, sakit kepala, sakit perut, tekanan darah rendah dan kejang otot.

## Cara penyimpanan dan pelupusan

### Penyimpanan

Simpan ke dalam bekas yang tertutup rapat dan diletak ditempat yang kering, dibawah suhu 25°C. Jauhi dari cahaya dan kanak-kanak.

### Pelupusan

Jangan buang ubat ke dalam longkang dan tong sampah. Bertanya kepada ahli farmasi anda cara membuang ubat yang tidak diperlukan lagi.

## Diskripsi produk

### Rupa dan warna tablet

Frusix Tablet 40 mg berbentuk tablet bulat, bergaris pada satu sisi dan berwarna putih. Saiz pek adalah: Botol plastik mengandungi 30 dan 1000 tablet.

### Bahan-bahan

Bahan aktif adalah Frusemide 40 mg per tablet.

Bahan lain dalam Frusix Tablet 40 mg adalah laktosa, pati jagung dan magnesium stearat.

### Nombor Pendaftaran:

Frusix Tablet 40 mg: MAL19860186A

### Dikilangkan oleh:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)  
Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate,  
Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Tarikh semakan:

Pemegang Kuasa Pemasaran