

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about CARDIOL Tablet. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What CARDIOL Tablet is used for

For the management of essential hypertension as well as the treatment of angina pectoris and symptomatic chronic heart failure.

How CARDIOL Tablet works

CARDIOL reduces the heart's rate and force of contraction and thereby reduces the work of the heart. CARDIOL also blocks receptors on arteries and causes the arteries to relax and the blood pressure to fall.

Before you use CARDIOL Tablet

When you must not take it

When you are allergic to Carvedilol or you have liver dysfunction, respiratory problems or other medical condition related with heart disease.

Before you start to take it

Tell your doctor if you are using any other medicines.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medications. There may be medications interactions, including general anesthetics, antidiabetic agents, calcium channel blocking agents, catecholamine-depleting agents, clonidine, digoxin, hepatic enzyme inducers, hepatic enzyme inhibitors and cyclosporine.

How to take CARDIOL Tablet

How much to take

The dosage must be adjusted by doctor to suit each patient because efficacy and tolerability vary from one individual to another. Please consult your doctor or pharmacist.

When to take it

CARDIOL Tablet should be taken according to doctor's instruction.

How long to take it

CARDIOL Tablet should be taken according to doctor's instruction.

If you forgot to take it

If you miss a dose of CARDIOL and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else have taken too much CARDIOL.

While you are using CARDIOL Tablet

Things you must do

Take the tablet according to doctor's instruction.

Things you must not do

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give CARDIOL to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Should be used cautiously in patient with heart problems, impaired renal function, diabetes and with a history of psoriasis. Consult physician if encounter any abnormal condition after taking the medication. The use of this product during pregnancy should be advised by your doctor.

Side effects

Abnormally low platelet count, high blood sugar; dizziness, headaches, fatigue, depression, sleep disturbance; slow heart rate, drop of blood pressure due to a change of body position, swelling, fainting, irregular heartbeat, and heart attack; allergy, fever, blood in urine, hepatic injury.

After using CARDIOL Tablet

Storage

Store below 25°C, protect from light & moisture.


Disposal

If your doctor or pharmacist tells you to stop taking CARDIOL or the tablet has passed the expiry date, ask your doctor or pharmacist what to do with any that is left over.


Product description

What it looks like

CARDIOL Tablet 25mg: A white to off-white round tablet, in the shape of

“”.

CARDIOL Tablet 6.25mg: A yellow

round tablet, in the shape of “”.

Ingredients

Carvedilol 6.25mg
Crospovidone, Magnesium Stearate,
Lactose, Cellulose, Silicon Dioxide, Iron
Oxide Yellow & Povidone.

Carvedilol 25mg

Crospovidone, Magnesium Stearate,
Lactose, Cellulose, Silicon Dioxide,
Sucrose & Povidone.

MAL no.

MAL 09011472A
MAL 09011459A

Manufacturer

Yung Shin Pharmaceutical Ind. Co. Ltd.
(Taichung Youth Factory)
No. 27 Kung Chiu Rd.,
Tachia, Taichung, Taiwan, R.O.C.

Date of revision :

16th Dec. 2011

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

CARDIOL Tablet

Carvedilol 6.25mg & 25mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang CARDIOL Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada pakar kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan CARDIOL Tablet

Digunakan untuk pengurusan hipertensi essential serta rawatan untuk pectoris angina dan kegagalan jantung kronik yang mempunyai simptom.

Bagaimana CARDIOL Tablet berfungsi

CARDIOL mengurangkan kadar jantung dan daya penguncupan dan dengan itu mengurangkan kadar kerja jantung. CARDIOL juga menghalang reseptor pada arteri dan menyebabkan arteri berkembang dan justera itu menyebabkan tekanan darah jatuh.

Sebelum Mengambil CARDIOL Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah dengan Carvedilol atau anda mempunyai masalah disfungsi hati, masalah pernafasan atau keadaan perubatan lain yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi diantara CARDIOL dengan ubat yang lain seperti anestetik umum, agen antidiabetik, agen penyekat saluran kalsium, agen pengurangan katekolamin, clonidine, digoxin, pencetus enzim hepatic, perencat enzim hepatic dan cyclosporine mungkin akan berlaku.

Cara menggunakan CARDIOL Tablet

Berapa banyak harus diambil

Dos CARDIOL harus diberi berdasarkan keadaan pesakit kerana keberkesanan ubat dan toleransi untuk setiap individu adalah berbeza. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk keterangan lanjutan.

Bila perlu diambil

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

Berapa lama perlu diambil

Ia perlu diambil berdasarkan arahan doktor.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan CARDIOL Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan beri ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit yang mempunyai masalah jantung, kemerosotan fungsi ginjal, diabetes, dan sejarah perubatan psoriasis. Dapatkan nasihat doktor jika anda terdapat sebarang keadaan yang abnormal selepas mengambil ubat ini. Dapatkan nasihat doktor jika anda hendak menggunakan ubat ini semasa mengandung.

Kesan-kesan sampingan

Kiraan platelet yang rendah; glukos darah yang tinggi, pening, sakit kepala, tidak bermaya, kemurungan, gangguan tidur, kadar jantung yang rendah, penurunan tekanan darah disebabkan oleh perubahan kedudukan badan, kebengkakan, pengsan, degupan jantung yang tidak teratur, dan serangan sakit jantung; alah, demam, darah dalam kencing, kecederaan hati.

Selepas menggunakan CARDIOL Tablet

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 25°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.


Cara pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda supaya berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.


Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Cardiol Tablet 25mg: Tablet berbentuk bulat

yang berwarna putih, dalam bentuk "  "

Cardiol Tablet 6.25mg: Tablet berbentuk bulat yang berwarna kuning, dalam bentuk

"  "

Bahan-bahan kandungan

Carvedilol 6.25mg
Crosopovidone, Magnesium Stearate, Lactose, Cellulose, Silicon Dioxide, Iron Oxide Yellow & Povidone

Cervedilol 25mg

Crosopovidone, Magnesium Stearate, Lactose, Cellulose, Silicon Dioxide, Sucrose & Povidone

MAL no.

MAL 09011472A

MAL 09011459A

Pengilang

Yung Shin Pharmaceutical Ind. Co. Ltd.

(Taichung Youth Factory)

No. 27 Kung Chiu Rd.,

Tachia, Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tarikh kemaskini RiMUP :

16th Dec. 2011

Marketing Authorization Holder:

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,

Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,

43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.