

# **Patient Information Leaflet**

# **DERMACORT CREAM 0.1%**

Triamcinolone Acetonide

## **What is in this leaflet**

- What DERMACORT Cream 0.1% is used for
- How DERMACORT Cream 0.1% works
- Before you use DERMACORT Cream 0.1%
- How to take DERMACORT Cream 0.1%
- While you are using DERMACORT Cream 0.1%
- Side Effects
- After using DERMACORT Cream 0.1%
- Product description
- Manufacturer
- Marketing Authorization Holder
- Date of Revision

## **What DERMACORT Cream 0.1% is used for**

Dermacort is used to help reduce the redness and itchiness of certain skin problems, such as eczema, psoriasis, dermatitis and pemphigus.

## **How DERMACORT Cream 0.1% works**

Dermacort contains a medicine called Triamcinolone Acetonide. It belongs to a group of medicines called steroids. It helps to reduce swelling and irritation.

## **Before you use DERMACORT Cream 0.1%**

- When you must not use it
  - if you are allergic (hypersensitive) to triamcinolone
  - on a child under 1 year
  - to treat any of the following skin problems, it could make them worse:
    - acne
    - severe flushing of skin on and around your nose (rosacea)
    - spotty red rash around your mouth (perioral dermatitis)
    - itching around your back passage or private parts - unless your doctor has told you to do so
    - viral infections, such as cold sores, herpes or chicken pox
    - fungal infections, such as ringworm, athletes foot or thrush

- skin blisters or sores that are caused by bacterial infections, such as impetigo.

Do not use if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before using Dermacort.

- Before you start to use it Check with your doctor or pharmacist before using your medicine if:

- you are applying the cream under an airtight dressing, including a child's nappy. These dressings make it easier for the active ingredient to pass through the skin. It is possible to accidentally end up using too much.
- you have psoriasis, your doctor will want to see you more often.

- Taking other medicines Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including those obtained without a prescription and herbal medicines.

## **How to take DERMACORT Cream 0.1%**

- How much to use Apply sparingly 2 - 3 times daily, reducing frequency as condition responds.

- When to use it Treatment should start as early as possible after the start of an infection.

- How long to take it Continue treatment for 5 days. Treatment may be continued for up to 10 days if healing has not occurred.

- If you forget to take it If you forget to use Dermacort, use it as soon as you remember. However, if it is nearly time for your next application, skip the missed application.

- If you take too much (overdose)

If, by mistake on a few occasions you use more than you should, do not worry. If you apply a lot or a lot is accidentally

swallowed, it could make you ill. Talk to your doctor or go to the hospital as soon as possible.

## **While you are using DERMACORT Cream 0.1%**

- Things you must do Always wash your hands before and after you use the cream.

- Things you must not do It should not be used for more than 5 days, as the skin on your face thins easily. Do not let the cream get into your eyes. Do not use it on children or infants unless directed by a doctor.

- Things to be careful of You should only apply the cream to your face if your doctor tells you to.

## **Side Effects**

Like all medicines, Dermacort can cause side effects, although not everybody gets them. Stop using Dermacort and tell your doctor as soon as possible if:

- You find that your skin condition gets worse or becomes swollen during treatment. You may be allergic to the Dermacort, have an infection or need other treatment.
- You have psoriasis you may get raised bumps with pus under the skin. This can happen very rarely during or after treatment and is known as pustular psoriasis.

Other side effects you may notice when using Dermacort include:

### **Common**

- a feeling of burning, irritation or itching where the cream is applied. Side effects if you use Dhacort for a long time, you use a lot each time you apply it, or you apply it under an airtight dressing.

### **Very rare**

- stretch marks may develop
- veins under the surface of your skin may become more noticeable
- increased hair growth and changes in skin colour

# **DERMACORT CREAM 0.1%**

Triamcinolone Acetonide

- thinning of your skin and it may also damage more easily
- weight gain, rounding of the face and high blood pressure. These are more likely to happen in infants and children.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

## **Storage and Disposal of DERMACORT Cream 0.1%**

### *Storage*

Store below 25°C. Do not freeze.

### *Disposal*

Do not use after the expiry date stated on the label.

Take any unused cream back to your pharmacist to be destroyed. Only keep the cream if the doctor tells you to. Do not throw them away with your normal household waste. This will help to protect the environment.

## **Product Description**

- What it looks like

Non-greasy white cream

- Ingredients

### *Active ingredient*

Triamcinolone Acetonide 0.1%  
w/w (Micronised)

### *Inactive ingredients*

White soft paraffin, Light liquid Paraffin, Cetostearyl alcohol, Cetomacrogol 1000, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol, Triethanolamine, Purified Water

- MAL No.

MAL 19890642A

## **Manufacturer**

**Drug Houses of Australia Pte.  
Ltd.,**  
#09-01/02 Haw Par Tiger Balm  
Building  
No.2 Chia Ping Road, Singapore  
619968.

## **Marketing Authorization Holder**

**Ascent Pharmahealth Malaysia  
Sdn Bhd**

Unit 304, Level 3, Uptown 2, 2  
Jalan SS21/37, Damansara  
Uptown, 47400 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

## **Date of Revision**

09-2011

**RiMUP**

# **DERMACORT CREAM 0.1%**

Triamcinolone Acetonide

## **Apakah yang ada pada risalah ini**

- Apakah kegunaan DERMACORT Cream 0.1%
- Bagaimana DERMACORT Cream 0.1% berfungsi
- Sebelum mengambil DERMACORT Cream 0.1%
- Cara menggunakan DERMACORT Cream 0.1%
- Semasa menggunakan DERMACORT Cream 0.1%
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan DERMACORT Cream 0.1%
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

## **Apakah kegunaan DERMACORT 0.1% w/w Cream**

Dermacort digunakan untuk membantu mengurangkan kemerahan dan kegatalan masalah kulit tertentu seperti ekzema, psoriasis dermatitis, dan pemphigus.

## **Bagaimana DERMACORT Cream 0.1% berfungsi**

Dermacort mengandungi ubat yang dipanggil Triamcinolone Acetonide. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai steroid. Ia membantu untuk mengurangkan bengkak dan kerengsaan.

## **Sebelum mengambil DERMACORT Cream 0.1%**

- Bila tidak boleh mengambil
  - jika anda alah (hipersensitif) kepada triamcinolone
  - jika kanak-kanak di bawah 1 tahun
  - untuk merawat masalah-masalah kulit yang berikut, ia boleh menjadikan mereka lebih teruk:
    - Jerawat

- Curahan yang teruk pada kulit dan di sekitar hidung anda (rosacea)
- Bintik-bintik ruam merah sekitar mulut (perioral dermatitis)
- Gatal sekitar laluan belakang anda atau bahagian swasta - kecuali doktor anda memberitahu anda untuk berbuat demikian
- Jangkitan virus, seperti kudis herpes, sejuk atau cacar air
- Jangkitan kulat seperti kurap, atlet kaki atau seriawan
- Kulit melecat atau luka yang disebabkan oleh jangkitan bakteria seperti impetigo

Jangan gunakan jika mana-mana di atas dialami oleh anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Dermacort.

- Sebelum mula mengambil Semak dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat anda jika:
  - anda memakai krim di bawah berpakaian kedap udara, termasuk lampin kanak-kanak. Balutan ini memudahkan bahan aktif untuk melalui kulit. Ia adalah mungkin menyebabkan tidak sengaja menggunakan terlalu banyak.
  - anda mengalami psoriasis, doktor anda akan mahu periksa anda lebih kerap.

- Jika mengambil ubat-ubat lain
 

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru pernah mengambil sebarang ubat-ubatan, termasuk ubat-ubat tanpa preskripsi dan ubat herba.

## **Cara menggunakan DERMACORT Cream 0.1%**

- Berapa banyak kali harus disapu

Guna dengan berhati-hati 2 - 3 kali sehari, mengurangkan kekerapan apabila keadaan beransur pulih.

- Bila perlu diambil Rawatan patut bermula seawal mungkin.

- Berapa lama perlu diambil Teruskan rawatan untuk 5 hari. Rawatan boleh diteruskan sehingga 10 hari jika penyembuhan tidak berlaku.

- Jika terlupa mengambil Jika anda terlupa menggunakan Dermacort, gunakan sebaik saja anda mengingatinya. Walaubagaimanapun, jika ia berhampiran masa untuk menggunakan dos seterusnya, lepaskan dos yang dilupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)
 

Jika, dengan tidak sengaja beberapa kali anda menggunakan lebih daripada yang anda perlu, jangan bimbang. Jika anda memakai banyak atau tidak sengaja tertelan, ia boleh membuat anda sakit. Berbincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital secepat mungkin.

## **Semasa menggunakan DERMACORT Cream 0.1%**

- Perkara yang perlu dilakukan Selalu bersih tangan anda sebelum dan selepas menggunakan krim.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
 

Ia tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari, kerana ia boleh membuat kulit pada muka anda menipis dengan mudah. Jangan biarkan krim masuk ke dalam mata anda.

Jangan gunakan ia pada kanak-kanak atau bayi melainkan jika diarahkan oleh doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

# **DERMACORT CREAM 0.1%**

Triamcinolone Acetonide

Hanya gunakan pada tempat berkenaan.

## **Kesan-sampangan**

Seperti semua ubat, Dermacort boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Hentikan penggunaan Dermacort dan beritahu doktor anda secepat mungkin jika.:

- Anda mendapati bahawa keadaan kulit anda menjadi lebih teruk atau menjadi bengkak semasa rawatan. Anda mungkin alah kepada Dermacort, mempunyai jangkitan atau memerlukan rawatan lain.
- Anda mempunyai psoriasis anda mungkin mendapat lebam yang dibangkitkan dengan nanah di bawah kulit. Ini boleh berlaku jarang sekali semasa atau selepas rawatan dan dikenali sebagai psoriasis berjerawat.

Kesan sampingan yang lain anda boleh memerhati apabila menggunakan Dermacort termasuk:

## **Biasa**

- rasa membakar kerengsaan, atau gatal di mana krim digunakan. Kesan sampingan jika anda menggunakan Dermacort untuk masa yang lama, anda menggunakan banyak setiap kali anda menggunakanannya, atau anda memohon di bawah berpakaian kedap udara.

## **Sangat jarang**

- kesan parut boleh muncul
- urat di bawah permukaan kulit anda mungkin menjadi lebih ketara
- pertumbuhan rambut meningkat dan perubahan dalam warna kulit
- penipisan kulit dan ia lebih mudah rosak
- berat badan, pembundaran muka dan tekanan darah tinggi. Ini lebih cenderung

berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak.

Jika mana-mana kesan sampingan mendapat serius, atau jika anda notis sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

## **Cara penyimpanan dan pelupusan DERMACORT Cream 0.1%**

### *Penyimpanan*

Simpan di bawah suhu 25°C. Jangan beku.

### *Pelupusan*

Jangan guna ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya. Pulang krim yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan krim jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang krim tersebut bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

## **Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk  
Krim berwarna putih dan tidak berminyak
- Bahan-bahan kandungan  
*Ramuan aktif*  
Triamcinolone Acetonide 1%  
w/w

### *Bahan-bahan tidak aktif:*

White soft paraffin, Light liquid Paraffin, Cetostearyl alcohol, Cetomacrogol 1000, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol, Triethanolamine, Purified Water

- Nombor MAL  
MAL 19890642A

## **Pengilang**

**Drug Houses of Australia Pte. Ltd.,**

#09-01/02 Haw Par Tiger Balm Building

No.2 Chia Ping Road,  
Singapore 619968.

## **Pemegang Pendaftaran Produk**

**Ascent Pharmahealth Malaysia Sdn Bhd**  
Unit 304, Level 3, Uptown 2, 2 Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

## **Tarikh kemaskini RiMUP**

09-2011