

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

Consumer Medical Information Leaflet (CMIL)

What is in this leaflet?

1. What Blopress is used for
2. Before you take Blopress
3. How to take Blopress
4. While you are taking Blopress
5. Side effects
6. Further information

What Blopress is used for

Blopress is used to treat hypertension.

How Blopress works:

- Blopress causes a dose-dependent, long lasting reduction in arterial blood pressure.
- Blopress increases renal blood flow and maintains or increases glomerular filtration rate while renal vascular resistance and filtration fraction are reduced.
- Blopress has no adverse effect on blood glucose or lipid profile.

Before you take Blopress

When you must not take it

- Do not take Blopress if you are pregnant.
- Do not take Blopress if you are hypersensitive to any component of Blopress

Taking other medicines

- If you take potassium-sparing diurectics while you are taking Blopress, this may cause an increased of serum potassium level. If co-administration of both drugs are necessary, caution is advised.
- No drug interactions have been identified with hydrochlorothiazide, warfarin, digoxin, oral contraceptive (i.e, ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamide and nifedipine.

How to take Blopress Tablet

How much to take

You may start with the dosage of 4mg once daily. The dosage should be

increased according to the therapeutical response until 16mg once daily. The maximum antihypertensive effect is attained within 4 weeks of initiation treatment.

Use in the elderly

No dosage adjustment is necessary in patient up to 75 years old. For patient who is 75 years and above, an initial dose of 2mg is recommended. The dose may be adjusted according to response.

Use in children

The safety and efficacy of Blopress have not been established in children.

Use in impaired renal function

No dosage adjustment is necessary in patients with mild renal impairment. In patients with moderate to severe renal impairment, an initial dose of 2mg once daily is recommended. The dose may be adjusted according to response.

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

Use in impaired hepatic function

An initial dose of 2mg once daily is recommended in patients with mild to moderate hepatic impairment. The dose may be adjusted according to response. Blopress may be administered with other antihypertensive agents.

When and how to take it

Blopress should be taken orally, once daily with or without food.

If you take more Blopress than you should (Overdose)

- You may experience hypotension. You should be placed supine with legs elevated. If this is not sufficient, plasma volume should be increased, for example taking isotonic saline or sympathomimetic drugs.
- Candesartan is unlikely to be removed by haemodialysis.

While you are taking Blopress Tablet

- Do not use Blopress if you are pregnant.
- Use of Blopress is not recommended for patients with cardiac failure.

Things to be careful of

You should consult your doctor to know the reaction of Blopress.

Side Effects

Like all medicines, Blopress can cause side effects, although not everybody will experience them. If you experience any of these symptoms while taking Blopress, please contact your doctor immediately:

- a) Headache
- b) Upper respiratory tract infection
- c) Back pain
- d) Dizziness
- e) Angioedema and rash (very rare)
- f) Leucopenia, neutropenia and agranulocytosis (very rare)

Further Information

Storage

- Keep out of reach and sight of children.
- Keep Blopress below 25°C.
- Do not use Blopress after the expiry date which is printed on the carton.

Product Description

- Blopress Tablet 8mg is pale pink tablet with score line on both sides. It is packed 2 blisters in each box, with 7 tablets in each blister.
- Blopress Tablet 16mg is light pink tablet with one convex side and one scored flat side, embossing 16 on convex side. It is packed 2 blisters in each box, with 7 tablets in each blister.

Ingredients

Active – Candesartan cilextil.

Excipients – Maize starch, lactose monohydrate, polyethylene glycol, hydroxypropyl cellulose, iron oxide red, water purified, magnesium

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

stearate, calcium
carboxymethylcellulose.

Malaysia Registration

Number (MAL)

- Blopress Tablet 8mg
(MAL20002652AR)
- Blopress Tablet 16mg
(MAL20002653A)

Manufacturer

Takeda Pharmaceutical
Company Ltd., Osaka,
Japan.

Marketing Authorization

Holder

Invida (Singapore) Pte.
Ltd. Malaysia Branch,
Level 2, No. 10 Jalan
Bersatu 13/4, 46200
Petaling Jaya, Selangor.

Date of Revision

May 2012.

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

Risalah Maklumat Perubatan Pengguna (RiMUP)

Apakah yang terkandung dalam risalah ini?

1. Apakah kegunaan Blopress
2. Sebelum anda mengambil Blopress
3. Cara mengambil Blopress
4. Semasa anda mengambil Blopress
5. Kesan sampingan
6. Maklumat lanjut

Apakah kegunaan Blopress? Blopress digunakan untuk merawat hipertensi.

Cara Blopress berfungsi:

- Blopress menyebabkan penurunan tekanan darah arteri yang berpanjangan dan bersandarkan dos.
- Blopress meningkatkan aliran darah renal dan mengekalkan atau meningkatkan kadar penurasan glomerulus manakala rintangan vaskular dan pecahan penurasan renal berkurang.
- Blopress tidak memberikan kesan

menjejaskan ke atas profil glukosa atau lipid darah.

Sebelum anda mengambil Blopress
Bila anda tidak boleh mengambilnya

- Jangan ambil Blopress jika anda hamil.
- Jangan ambil Blopress jika anda hipersensitif kepada apa-apa komponen Blopress.

Mengambil ubat lain

- Jika anda mengambil diurektik penjimatan kalium semasa anda mengambil Blopress, ini boleh menyebabkan paras kalium serum meningkat. Jika pemberian bersama kedua-dua dadah diperlukan, dinasihatkan supaya anda berhati-hati.
- Tiada interaksi dadah dikenal pasti dengan hydrochlorothiazide, warfarin, digoxin, kontraseptif oral (iaitu, ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamide dan nifedipine.

Cara mengambil Tablet Blopress

Berapa banyak perlu diambil
Anda boleh mula dengan dos 4 mg sekali sehari. Dos hendaklah ditambah mengikut respons terapeutik sehingga 16mg sekali sehari. Kesan maksimum antihipertensi dicapai dalam tempoh 4 minggu selepas memulakan rawatan.

Kegunaan pada orang tua
Penyesuaian dos tidak perlu pada pesakit yang berumur sehingga 75 tahun. Bagi pesakit berumur 75 tahun dan ke atas, dos awal 2mg disyorkan. Dos boleh disesuaikan mengikut respons.

Kegunaan pada kanak-kanak
Keselamatan dan keberkesanan Blopress belum ditentukan pada kanak-kanak.

Kegunaan pada fungsi renal yang terganggu
Penyesuaian dos tidak diperlukan pada pesakit dengan gangguan renal

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

ringan. Pada pesakit dengan gangguan renal sederhana hingga teruk, dos awal 2mg sekali sehari disyorkan. Dos boleh disesuaikan mengikut respons.

Penggunaan dalam fungsi hepar terganggu
Dos awal 2 mg sekali sehari disyorkan pada pesakit dengan gangguan hepar yang ringan hingga sederhana. Dos boleh disesuaikan mengikut respons. Blopress boleh diberikan dengan ejen antihipertensi lain.

Bila perlu dan cara mengambilnya
Blopress hendaklah diambil secara oral, sekali sehari dengan atau tanpa makanan.

Jika anda mengambil Blopress lebih daripada yang sepatutnya (Dos lebih)
• Anda mungkin mengalami hipotensi. Anda perlu baring telentang dengan kaki ditinggikan. Jika ini tidak memadai, isipadu plasma hendaklah ditambah,

sebagai contoh, mengambil salina isotonik atau dadah simpatomimetik.
• Candesartan tidak mungkin dapat disingkirkan melalui hemodialisis.

Semasa anda mengambil Tablet Blopress
• Jangan ambil Blopress jika anda hamil.
• Penggunaan Blopress tidak disyorkan untuk pesakit dengan kegagalan jantung.

Perkara yang perlu diberi perhatian
Anda perlu menghubungi doktor untuk mengetahui tindak balas Blopress.

Kesan Sampingan
Seperti semua ubat, Blopress boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jika anda mengalami mana-mana gejala ini semasa mengambil Blopress, hubungi doktor anda dengan segera:
a) Sakit kepala

- b) Jangkitan salur pernafasan atas
- c) Sakit belakang
- d) Pening kepala
- e) Angioedema dan ruam (sangat jarang)
- f) Leukopenia, neutropenia dan agranulositosis (sangat jarang)

- Maklumat Lanjut
Penyimpanan
- Simpan di tempat yang tidak dapat dicapai dan dilihat oleh kanak-kanak.
 - Simpan Blopress di bawah suhu 25°C.
 - Jangan guna Blopress selepas tarikh tamat tempoh yang dicetak pada kotak.

- Keterangan Produk
Tablet Blopress 8 mg ialah tablet merah jambu pucat dengan garis skor pada kedua-dua sisi. Terdapat dua blister di dalam setiap kotak, dengan 7 tablet di dalam setiap blister.
- Tablet Blopress 16mg ialah tablet merah jambu pucat dengan satu sisi cembung dan satu sisi rata dengan garis skor,

BLOPRESS Tablet 8mg

BLOPRESS Tablet 16mg

Candesartan cilextil

dengan cetak timbul 16
pada sisi cembung.
Terdapat 2 blister di dalam
setiap kotak, dengan 7
tablet di dalam setiap
blister.

Level 2, No. 10 Jalan
Bersatu 13/4, 46200
Petaling Jaya, Selangor.

Tarikh Semakan
Mei 2012.

Ramuan
Aktif – Candesartan
cilextil.

Eksipien – Kanji jagung,
lactose monohydrate,
polyethylene glycol,
hydroxypropyl cellulose,
iron oxide red, air tulen,
magnesium stearate,
calcium
carboxymethylcellulose.

Nombor Pendaftaran
Malaysia (MAL)
• Blopess Tablet
8mg (MAL20002652AR)
• Blopess Tablet
16mg (MAL20002653A)

Pengilang
Takeda Pharmaceutical
Company Ltd., Osaka,
Jepun.

Pemegang Kuasa
Pemasaran
Invida (Singapore) Pte.
Ltd. Malaysia Branch,