

ENAPRIL Tablet

Enalapril Maleate 10mg & 20mg

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about ENAPRIL. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What ENAPRIL Tablet is used for

For the treatment of high blood pressure, heart failure, heart attack (myocardial infarction) and kidney disease resulted by uncontrolled high blood sugar (diabetic nephropathy).

How ENAPRIL Tablet works

ENAPRIL prevent the body from creating a hormone known as angiotensin II. They do this by blocking (inhibiting) a chemical called angiotensin-converting enzyme. This has a variety of effects but essentially relaxes blood vessels and helps to reduce the amount of water re-absorbed by the kidneys. These actions help to decrease blood pressure

Before you use ENAPRIL Tablet

When you must not take it

You must not take ENAPRIL if you are pregnant, allergic to enalapril or you have any history of medical condition caused by previous treatment with this group of drugs.

Before you start to take it

Tell your doctor if you are taking any other medicines or you have any other health problems.

Taking other medicines

ENAPRIL may cause unwanted effects if used together with other medicines such as anti-hypertensive drugs, potassium containing drugs and supplements. Tell your doctor or pharmacist if you are taking any other medicines.

How to take ENAPRIL Tablet

How much to take

The dosage you need depends on your medical condition. Please consult your doctor for further enquiries.

When to take it

ENAPRIL should be taken orally with or without food.

How long to take it

ENAPRIL should be taken according to doctor's advice.

If you forgot to take it

If you miss a dose of ENAPRIL and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else have taken too much ENAPRIL.

While you are using ENAPRIL Tablet

Things you must do

Follow your doctor's prescription when you are using ENAPRIL.

Things you must not do

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give ENAPRIL to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Should be used with caution in patient with heart problems, impaired renal function, lactating women and children. ENAPRIL is not recommended for use in pregnant women.

Side effects

Commonly observed: headache and dizziness.

Less commonly observed: fatigue and weakness.

Rarely observed: low blood pressure, drop of blood pressure due to a change of body position, nausea, diarrhea, muscle cramps, rash and cough, kidney dysfunction, kidney failure and low urine output.

After using ENAPRIL Tablet

Storage

Store below 25°C. Protect from light and moisture.

Disposal

If your doctor or pharmacist tells you to stop taking ENAPRIL or the tablet has passed the expiry date, ask your doctor or pharmacist what to do with any that is left over.

Product description

What it looks like

Enapril tablet 10mg:

A brownish-red tablet, in the shape of “ YSP 19”.

Enapril tablet 20mg

A light orange tablet, in the shape of “ YSP 20”.

Ingredients

Enalapril Maleate

Polyethylene Glycol

Sodium Starch Glycolate

Povidone

Iron Oxide Red

Sunset Yellow Lake

Magnesium Stearate

Lactose

MAL no.

MAL 20051466A (10mg)

MAL 20051467A (20mg)

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Date of revision :

16th November 2011

ENAPRIL Tablet

Enalapril Maleate 10mg & 20mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang ENAPRIL Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan ENAPRIL Tablet

Digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, sakit jantung, serangan sakit jantung dan penyakit buah-pinggang yang disebabkan oleh penyakit kencing manis yang tidak terkawal.

Bagaimana ENAPRIL Tablet berfungsi

ENAPRIL menghalang badan daripada menghasilkan hormon yang dikenali sebagai angiotensin II. Ini berlaku disebabkan dengan penghalangan bahan kimia yang dipanggil enzim penukar angiotensin. Pelbagai kesan boleh didapati, tetapi asasnya melegakan saluran darah dan membantu untuk mengurangkan jumlah air yang diserap semula oleh buah pinggang. Tindakan ini membantu untuk mengurangkan tekanan darah

Selbelum Mengambil ENAPRIL Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda mengandung, alah terhadap enalapril ataupun jika anda pernah menghadapi masalah perubatan yang disebabkan oleh penggunaan kumpulan dadah ini dalam rawatan yang lepas.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan ENAPRIL bersama dengan ubat yang lain seperti ubat anti-hipertensi, ubat dan suplemen mengandungi kalium akan mengakibat kesan-kesan yang tidak dikehendaki. Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat.

Cara menggunakan ENAPRIL Tablet

Berapa banyak harus diambil

Dos yang diambil bergantung kepada keadaan perubatan semasa anda. Sila rujuk kepada doktor anda untuk pertanyaan lanjutan.

Bila perlu diambil

Ia perlu diambil secara oral bersama dengan makanan atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu diambil

Ia perlu diambil mengikut nasihat doktor.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat itu secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk mengantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil terlebih (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil terlebih dos.

Semasa menggunakan ENAPRIL Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Iikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit yang mempunyai masalah jantung, kemerosotan fungsi ginjal, wanita menyusu dan kanak-kanak. Penggunaan ENAPRIL tidak digalakkan pada wanita mengandung.

Kesan-sesan sampingan

Kesan sampingan umum: sakit kepala dan pening.

Kesan sampingan yang kurang umum: keletihan dan kelemahan.

Kesan sampingan yang jarang dilihat: tekanan darah rendah, penurunan tekanan darah disebabkan oleh perubahan kedudukan badan, loya, cirit-birit, kekejangan otot, ruam dan batuk, disfungsi dan kegagalan ginjal serta kekurangan air kencing.

Selepas menggunakan ENAPRIL Tablet

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 25°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Enapril tablet 10mg:

Tablet berwarna merah coklat, dalam bentuk " () YSP 19".

Enapril tablet 20mg

Tablet berwarna jingga, dalam bentuk " () YSP 20".

Bahan-bahan kandungan

Enalapril Maleate
Polyethelyne Glycol
Sodium Starch Glycolate
Povidone
Iron Oxide Red
Sunset Yellow Lake
Magnesium Stearate
Lactose

MAL no.

MAL 20051466A (10mg)
MAL 20051467A (20mg)

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd

Marketing Authorization Holder
Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Date of revision :

16th November 2011