

**In this leaflet:**

- What is Melicron used for
- How Melicron works
- Before you take Melicron
- How to take Melicron
- While you are taking Melicron
- Possible side effects
- How should you keep Melicron
- Product description

**What is Melicron used for**

It is used to treat diabetes (Type 2, non-insulin-dependent) when dietary modification is not effective in maintaining blood sugar at desirable levels.

**How Melicron works**

Gliclazide is the blood sugar lowering agent in the sulphonylurea group. It stimulates the secretion of insulin (the hormone produced by pancreas) which regulates blood sugar in the body.

**Before you take Melicron**

**When you must not take it**

Do not take Melicron if you:

- are allergic (hypersensitivity) to gliclazide, sulphonylureas or any ingredients in this medicine.
- suffer from severe liver and kidney insufficiency.
- have diabetes with too much acid and by-product of fatty acids in urine
- have Type 1 (insulin dependent) diabetes.
- are pre-coma or coma.
- undergo surgery.
- are after severe trauma or during infection.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

**Before start to take it**

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic (hypersensitivity) to gliclazide, sulphonylureas or any ingredients in this medicine.
- have liver and/or kidney impairment.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

**Taking other medicines**

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without prescription.

**How to take Melicron**

**How much to take**

**Adults**

Two tablets daily, one tablet with breakfast, and another tablet with dinner.

Starting dose is usually 40 to 80mg daily and up to a maximum dose of 320mg daily. Doses more than 160mg should be given in 2 divided doses.

Your doctor or pharmacist will determine the appropriate tablet strength for you, depending on your condition, current treatment and personal risk status.

**When to take it**

Twice daily, usually with breakfast and with dinner.

**How long to take it**

Follow the prescription from your doctor or pharmacist. Ask your doctor or pharmacist before prolonged use of this medicine.

**If you forget to take it**

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

**If you take too much**

Symptoms of overdose include low blood sugar levels.

Seek immediate medical attention if you have taken too much or worried with your conditions.

**While you are using Melicron**

**Things you must do**

Always wash your hand before handle the tablets. Take the tablets with water and try to take at the same time each day.

**Things you must not do**

Do not chew the tablet and swallow it with water.

Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

**Things to be careful of**

Tell your doctor or pharmacist if you:

- have problems with your liver or kidney.
- are allergic to any ingredients in this medicine.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

**Possible side effects**

- Low blood sugar
- Skin rashes, itchiness, sun allergy (photosensitivity).
- Nausea, vomiting, heartburn, excessive food restriction (anorexia), diarrhoea.
- Metallic taste.

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

**How should you keep Melicron**

Store at room temperature below 30 °C. Keep out of the reach of the children. Do not use this medicine after the expiry date.

**Product Description**

**How Melicron looks like**

White, round, 7.9 mm diameter, flat-bevelled edge with a cross-line on one side and plain on reverse.

Available in blister strips of 10's in packing of 60 and 100 tablets per box.

**What Melicron contains**

It contains Gliclazide 80mg.

Other ingredients are Lactose, Sodium Starch Glycolate, Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Povidone, Colloidal Silicone Dioxide, Maize Starch, Purified Water.

**Manufactured and Marketed by**  
Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,  
Malaysia.

**Registration number**

MAL19990603A

**Date of Revision:** 17 August 2012

# Melicron Tablet 80mg

Setiap tablet mengandungi Gliclazide 80mg.

## Apakah yang ada pada risalah ini:

- Apakah kegunaan Melicron
- Bagaimana Melicron berfungsi
- Sebelum mengambil Melicron
- Cara mengambil Melicron
- Semasa mengambil Melicron
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan Melicron
- Deskripsi produk

## Apakah kegunaan Melicron

Ia digunakan untuk merawat kencing manis (Type 2, non-insulin-dependent) apabila pengubahan diet tidak berkesan untuk mengekalkan paras gula darah pada tahap yang dikehendaki.

## Bagaimana Melicron berfungsi

Gliclazide adalah kumpulan sulphonylurea yang menurunkan paras gula. Ia merangsang rembesan insulin (hormon yang dihasilkan oleh pankreas) yang mengawal paras gula darah.

## Sebelum mengambil Melicron

### Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap gliclazide, sulfonylurea atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- mengalami kegagalan fungsi hati dan ginjal yang serius.
- mempunyai kencing manis di mana terlalu banyak asid dan bahan berkaitan asid lemak dalam air kencing.
- mempunyai kencing manis (Type 1, insulin dependent).
- separa-koma atau koma.
- menjalani pembedahan.
- selepas trauma yang teruk atau (sedang mengalami) jangkitan.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

## Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap gliclazide, sulfonylurea atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- mempunyai kerosakan hati dan/atau ginjal.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

## Jika mengambil lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

## Cara mengambil Melicron

### Berapa banyak harus diambil

#### Dewasa

Dua tablet setiap hari, satu tablet selepas sarapan, dan satu tablet selepas makan malam.

Dos permulaan biasanya 40mg hingga 80mg sehari dan boleh mencapai dos maksimum 320mg sehari. Bagi dos yang melebihi 160mg, 2 dos berasingan patut diberi.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip kekuatan ubat yang bersesuaian, bergantung kepada keadaan anda, rawatan semasa dan risiko berlainan setiap individu.

### Bila perlu diambil

Dua kali sehari, diambil selepas sarapan dan selepas makan malam.

### Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

### Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

### Jika mengambil berlebihan

Simptom akibat dos berlebihan termasuk paras gula darah yang darah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang akan keadaan yang dialami.

## Semasa mengambil Melicron

### Perkara yang harus dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

### Perkara yang tidak harus dilakukan

Jangan kunyah tablet. Telah tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

## Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai masalah hati dan/atau ginjal.
- alahan (hipersensitif) terhadap gliclazide, sulfonylurea atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

## Kesan-kesan sampingan

- Kandungan gula darah yang rendah.
- Ruam pada kulit, kegatalan, alahan pancaran matahari (photosensitivity).
- Loya, muntah-muntah, pedih hulu hati, penyekatan pengambilan makanan yang melampau, (anoreksia), cirit-birit.
- Rasa metalik.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

## Cara penyimpanan Melicron

Simpan pada suhu bilik di bawah 30°C. Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

## Deskripsi produk

### Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk bulat, 7.9 mm diameter, dengan garis silang pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain. Terdapat dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkus 60 dan 100 tablet.

## Bahan-bahan kandungan

mengandungi Gliclazide 80mg.

bahan-bahan kandungan lain ialah Lactose, Sodium Starch Glycolate, Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Povidone, Colloidal Silicone Dioxide, Maize Starch, Purified Water.

## Dikelangkan dan dipasarkan oleh

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,  
Malaysia.

## Nombor pendaftaran

MAL19990603A

Tarikh kemaskini: 17 Ogos 2012