

GLUCORID

Acarbose

Consumer Medicine Information

WHAT IS IN THIS LEAFLET

This leaflet answers some common questions about Glucorid. It does not contain all the available information. It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor has weighed the risks of you taking Glucorid against the benefits they expect it will have for you.

As Glucorid is a prescription medicine, it should only be used under medical supervision.

If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Keep this leaflet with the medicine.

You may need to read it again.

WHAT GLUCORID IS USED FOR

Glucorid tablets contain the active drug acarbose. They are used for the treatment of a type of diabetes commonly known as Type 2 diabetes mellitus.

Glucorid helps to control your blood sugar levels in conjunction with diet, exercise, weight loss and other measures by slowing down the digestion of carbohydrates (complex sugars) from your diet. This reduces the abnormally high blood sugar levels that occur after each meal.

Ask your doctor if you have any questions about why this medicine has been prescribed for you.

Your doctor may have prescribed it for another reason.

BEFORE YOU TAKE GLUCORID

When you must not take it

Do not take Glucorid if you have an allergy to:

- acarbose, the active ingredient in Glucorid.
- any of the ingredients listed at the end of this leaflet.

Some of the symptoms of an allergic reaction may include:

- shortness of breath
- wheezing or difficulty breathing
- swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body
- rash, itching or hives on the skin.

Do not take Glucorid if:

- you have a severe kidney disorder (creatinine clearance <25 mL/min).
- you suffer from intestinal obstruction, inflammation or ulceration of the bowel, e.g. ulcerative colitis or Crohn's disease.
- you have a hernia or have had previous abdominal surgery. If so, consult your doctor first.

Do not give this medicine to a child under the age of 18 years.

Do not take this medicine after the expiry date printed on the pack and blister.

If it has expired return it to your pharmacist for disposal.

Do not take this medicine if the packaging is torn or shows signs of tampering.

If the packaging is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

If you are not sure whether you should start taking this medicine, talk to your doctor.

Before you start to take it

Tell your doctor if you have allergies to any other medicines, foods, preservatives or dyes.

Tell your doctor if you are pregnant or intend to become pregnant.

Like most medicines of this kind, Glucorid is not recommended to be used during pregnancy. Your doctor will discuss the risks and benefits of using it if you are pregnant.

Tell your doctor if you are breastfeeding or planning to breastfeed.

It is not known whether Glucorid passes into breast milk.

If you have not told your doctor about any of the above, tell him/her before you start taking Glucorid.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking other medicines, including any you have bought without a prescription from your pharmacy, supermarket or health food shop.

Some medicines and Glucorid may interfere with each other. These include:

- Neomycin
- Cholestyramine
- Intestinal adsorbents
- Digestive enzyme preparations
- Digoxin

These medicines may be affected by Glucorid or may affect how well it works. You may need different amounts of your medicines, or you may need to take different medicines.

Your doctor and pharmacist have more information on medicines to be careful with or avoid while taking this medicine.

You should avoid taking cane sugar (sucrose) and products containing sugar. They may cause stomach discomfort or even diarrhoea if taken while you are on Glucorid tablets.

If you are taking other medicines containing sulfonyleureas or metformin and tend to have low blood sugar levels, tell your doctor before using Glucorid.

If you have not told your doctor or pharmacist about any of the above, tell them before you start taking Glucorid.

HOW TO TAKE GLUCORID

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully.

They may differ from the information contained in this leaflet.

If you do not understand the instructions printed on the pharmacist label, ask your doctor or pharmacist for help.

How much to take

To gain the maximum benefit from Glucorid it is important that you follow the prescribed diet as well as taking the exact dose prescribed by your doctor. This will help control your blood sugar levels and reduce side effects experienced.

The average adult dose is one Glucorid 100 mg tablet taken three times daily.

How to take it

Chew the tablets with the first few mouthfuls of food. If you prefer not to chew the tablets then swallow them whole with a little liquid immediately before the meal.

When to take it

Take your medicine at about the same time each day with breakfast, lunch and dinner.

Taking it at the same time each day will have the best effect. It will also help you remember when to take it.

When you first start your treatment, your doctor may recommend that you take your tablets once or twice a day, before increasing your dose to three times a day.

How long to take it

Do not stop taking the tablets unless you are told to do so by your doctor.

This medicine helps to control your condition, but does not cure it. It is important to keep taking your medicine even if you feel well.

If you do not feel well while you are taking them, see your doctor. (see **SIDE EFFECTS**).

If you forget to take it

If you forget to take Glucorid at the time you are supposed to, do not take the tablets between meals.

Wait until it is time for you to take your next dose and take Glucorid with your meal and continue as before. Do not take a double dose.

If you take too much (Overdose)

If you have taken too many Glucorid tablets, avoid foods or drinks containing carbohydrates and telephone your or go to Accident and Emergency at the nearest hospital, if you think that you or anyone else may have taken too much Glucorid. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning.

You may need urgent medical attention.

When Glucorid is taken with drinks and/or meals containing carbohydrates, over dosage can lead to diarrhoea and other intestinal symptoms such as flatulence (wind) and abdominal cramps.

WHILE YOU ARE TAKING GLUCORID

Things you must do

If you are about to be started on any new medicine, remind your doctor and pharmacist that you are taking Glucorid.

Tell any other doctors, dentists, and pharmacists who treat you that you are taking this medicine.

Take Glucorid exactly as instructed by your doctor. If you do not follow your doctor's instructions, your blood sugar level may not be controlled.

Things you must not do

Do not take Glucorid to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

Do not give your medicine to anyone else, even if they have the same condition as you.

Do not stop taking your medicine or lower the dosage without checking with your doctor.

If you stop taking it suddenly, your condition may worsen or you may have unwanted side effects.

What to be careful of

Treating hypoglycaemia: (“hypos” or low blood sugar):

As a diabetic you may also be receiving other medicines for your diabetes. If Glucorid is prescribed for you in addition to sulfonylureas, metformin or insulin to control your diabetes, your doctor may need to adjust the dosages of these drugs to avoid the occurrence of “hypos” (low blood sugar levels).

When taking Glucorid together with these drugs, do not treat a “hypo” with ordinary sugar (sucrose). It will not work fast enough. Instead, you should take some GLUCOSE (also known as dextrose) tablets, honey, syrup or sweets which should be available from your local chemist.

SIDE EFFECTS

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking Glucorid.

All medicines have side effects. Sometimes they are serious; most of the time they are not. In serious cases, you may need to obtain medical treatment.

Some patients may experience unwanted side effects during Glucorid treatment. These side effects are more common at the start of the treatment, but some may

persist or develop after treatment, or when dosage of Glucorid is adjusted by your doctor.

Do not be alarmed by the following lists of side effects. You may not experience any of them. Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

Tell your doctor or pharmacist if you notice any of the following and they worry you:

- flatulence (wind)
- abdominal “rumbling” noises
- a feeling of fullness
- softer stools or have diarrhea; particularly if you have eaten foods containing sugar

The above list includes the more common side effects of your medicine. Normally these symptoms will disappear if you continue treatment and keep to your prescribed diet. These symptoms may get worse if you do not keep to your prescribed diet.

If your symptoms persist for more than 2 or 3 days, or if they are severe, consult your doctor or nearest emergency department particularly in the case of diarrhoea.

Do not take antacids to treat these symptoms as they are unlikely to give you any relief.

This list includes the less common side effects of your medicine.

- stomach cramps
- nausea
- indigestion
- vomiting
- increased appetite
- dizziness
- loss of appetite

Tell your doctor as soon as possible if you notice any of the following. This list includes rare side effects of your medicine.

- jaundice (yellowing of the skin)
- swelling from fluid retention
- inflammation of the liver (hepatitis)
- intestinal obstruction
- decrease in platelet count
- skin reactions such as redness, rash and urticaria (hives)

If while undergoing treatment with Glucorid, you experience any side-effects or symptoms which you think may be due to this medication (whether or not it is mentioned in this leaflet) please inform your doctor or pharmacist as early as possible. You may need medical treatment in some cases.

Glucorid tablets may cause an increase in the results of certain liver function tests.

These effects go away when treatment is stopped.

Tell your doctor or pharmacist if you notice anything that is making you feel unwell.

Other side effects not listed above may also occur in some people.

AFTER TAKING GLUCORID

When treatment with Glucorid is to be stopped, your prescribing doctor may need to alter the dose of other medication(s) accordingly and monitor your condition.

Storage

Keep your tablets in the pack until it is time to take them.

If you take the tablets out of the pack they may not keep well.

Keep your tablets in a cool dry place where the temperature stays below 30°C.

Do not store it or any other medicine in the bathroom, near a sink, or on a window-sill.

Do not leave it in the car.
Heat and damp can destroy some medicines.

Keep it where children cannot reach it.

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

Disposal

If your doctor tells you to stop taking this medicine or the expiry date has passed, ask your pharmacist what to do with any medicine that is left over.

Return any unused medicine to your pharmacist.

PRODUCT DESCRIPTION

What it looks like

Glucorid tablets are available in a blister pack of 100s in two strengths.

Glucorid Tablets 50mg are white to off-white, round convex, scored tablet with "CCM G50" marking.

Glucorid Tablets 100mg are white to off-white, round convex, scored tablet with "CCM G100" marking.

Ingredients

Active Ingredient per tablet:

- Glucorid 50 – acarbose 50 mg
- Glucorid 100 – acarbose 100mg

Manufacturer/Distributor

GLUCORID is manufactured by:
UPHA Pharmaceuticals Mfg (M) Sdn.Bhd.(53667-M)
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

GLUCORID is distributed by:
CCM Pharmaceuticals Sdn.Bhd.
(27754-W)
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Malaysian Registration Numbers:
GLUCORID 5mg - MAL 08051938A
GLUCORID 10mg - MAL08051939A

This leaflet was prepared on
September 2011.

GLUCORID

Acarbose

MAKLUMAT UBAT PENGGUNA

APA YANG ADA PADA RISALAH INI

Risalah ini menjawab beberapa soalan umum tentang Glucorid. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang boleh didapati. Ia tidak mengganti perbincangan dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Semua ubat mempunyai manfaat dan risiko. Doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Glucorid berbanding manfaat yang dijangkakan.

Glucorid merupakan ubat preskripsi, ia hanya boleh diambil di bawah penyeliaan perubatan.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan untuk mengambil ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Simpan risalah ini bersama dengan ubat.

Anda mungkin perlu membacanya semula.

APAKAH KEGUNAAN GLUCORID

Pil Glucorid mengandungi bahan aktif acarbose. Ia digunakan sebagai rawatan jenis diabetes yang dikenali sebagai diabetes melitus jenis 2.

Glucorid membantu mengawal tahap gula darah anda bersama-

sama dengan diet, senaman, kehilangan berat badan dan langkah-langkah lain dengan melambatkan penghadaman karbohidrat (gula kompleks) daripada diet anda. Ini mengurangkan tahap gula darah luar biasa tinggi yang berlaku selepas setiap waktu makan.

Tanya doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang tujuan Glucorid dibekalkan kepada anda.

Doktor anda mungkin membekalkan Glucorid untuk tujuan lain.

SEBELUM ANDA MENGAMBIL GLUCORID

Bila anda tidak boleh mengambilnya

Jangan mengambil Glucorid jika anda alah kepada:

- Acarbose, bahan aktif dalam Glucorid
- sebarang bahan yang disenaraikan di hujung risalah ini

Simptom-simptom alahan termasuklah:

- sesak nafas
- berdehit atau sukar bernafas
- bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain
- ruam kulit, gatal atau bintik-bintik merah pada kulit

Jangan mengambil Glucorid jika:

- anda ada penyakit ginjal yang teruk (pelepasan kreatinin <25 mL/min).
- anda ada usus halangan, radang dan ulser usus, contohnya kolitis ulser atau penyakit Crohn.
- anda mempunyai hernia atau pernah menjalani pembedahan abdomen. Jika ya, rujuk kepada doktor anda terlebih dahulu

Jangan beri ubat ini kepada kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun.

Jangan mengambil Glucorid jika tarikh luput yang tertera pada pek telah lepas.

Jika Glucorid sudah melepasi tarikh luputnya, pulangkannya kepada ahli farmasi anda untuk pelupusan.

Jangan mengambil ubat ini jika pembungkusan koyak atau terdapat tanda salahguna.

Jika pembungkusan telah koyak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk pelupusan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil ubat ini, bincang dengan doktor anda.

Sebelum anda mula mengambilnya

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada sebarang ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil.

Seperti kebanyakan ubat jenis ini, Glucorid tidak disyorkan untuk digunakan semasa mengandung. Doktor anda akan membincangkan risiko dan manfaat menggunakannya jika anda hamil.

Beritahu doktor anda jika anda menyusukan bayi atau bercadang untuk menyusukan bayi.

Adalah tidak diketahui sama ada Glucorid meresap ke dalam susu ibu.

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang mana-mana perkara di atas, beritahunya sebelum anda mula mengambil Glucorid.

Jika mengambil ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Glucorid boleh bertindak balas antara satu sama lain. Ini termasuklah:

- Neomycin
- Cholestyramine
- Absorben usus
- Bahan enzim penghadaman
- Digoxin.

Jika mana-mana ubat ini diambil bersama Glucorid, keberkesanan ubat-ubat ini akan dipengaruhi. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih maklumat tentang ubat yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa mengambil Glucorid.

Anda harus mengelak daripada mengambil gula tebu (sukrosa) dan produk yang mengandungi gula. Mereka mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut atau cirit-birit jika diambil semasa anda mengambil pil Glucorid.

Jika anda mengambil ubat lain yang mengandungi sulfonilureas atau metformin dan cenderung mempunyai tahap gula darah yang rendah, beritahu doktor anda sebelum mula mengambil Glucorid.

Jika anda belum memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang mana-mana perkara di atas, beritahu mereka sebelum anda mula mengambil Glucorid.

CARA PENGAMBILAN GLUCORID

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan tercetak pada label farmasi, minta bantuan daripada doktor atau ahli farmasi anda.

Kuantiti yang perlu diambil

Ia adalah penting bahawa anda mengikuti diet yang ditetapkan serta mengambil dos tetap yang dipreskripsikan oleh doktor anda supaya mendapat manfaat maksimum daripada Glucorid. Ini akan membantu mengawal tahap gula darah anda dan mengurangkan kesan-kesan sampingan yang dialami.

Dos dewasa yang biasa ialah satu pil Glucorid 100 mg diambil tiga kali setiap hari.

Cara pengambilan ubat

Kunyah pil bersama dengan makanan. Jika anda tidak suka mengunyah tablet anda boleh menelan seluruh ubat dengan sedikit cecair sebaik sebelum makan.

Masa pengambilan ubat

Ambil pil anda pada masa yang sama setiap hari bersama sarapan, makan tengah hari dan makan malam.

Ambil pil anda pada masa yang sama setiap hari akan memberi kesan yang terbaik. Ia juga membantu anda mengingati masa untuk mengambil ubat.

Semasa anda baru memulakan rawatan anda, doktor anda boleh mengesyorkan anda mengambil pil anda sekali atau dua kali sehari, sebelum meningkatkan dos anda kepada tiga kali sehari.

Berapa lama perlu mengambil ubat

Jangan berhenti mengambil pil melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Ubat ini membantu mengawal keadaan anda, tetapi tidak menyembuhkannya. Ia adalah penting untuk terus mengambil ubat anda walaupun anda berasa sihat. Jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil ubat, jumpa doktor anda. (lihat **KESAN SAMPINGAN**).

Jika anda terlupa mengambil ubat

Jika anda terlupa untuk mengambil Glucorid pada masa yang sepatutnya, jangan mengambil pil antara waktu makan.

Tunggu sehingga tiba masanya untuk anda mengambil dos seterusnya dan mengambil Glucorid bersama dengan makan dan teruskan seperti sebelum ini. Jangan gandakan dos.

Jika anda terlebih ambil ubat (terlebih dos)

Jika anda telah mengambil terlalu banyak pil Glucorid, elakkan makanan atau minuman yang mengandungi karbohidrat.

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Glucorid, hubungi doktor anda atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaian atau keracunan.

Anda mungkin perlu mendapatkan perhatian perubatan yang segera.

Apabila Glucorid diambil bersama dengan minuman dan / atau makanan yang mengandungi karbohidrat, terlebih dos boleh menyebabkan cirit-birit dan simptom usus lain seperti perut kembung (angin) dan kekejangan perut.

SEMASA ANDA MENGAMBIL GLUCORID

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan mula mengambil ubat lain baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Glucorid.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi lain yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini.

Ambil Glucorid dengan tepat seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jika anda tidak ikut arahan doktor anda, tahap gula darah anda mungkin tidak boleh dikawal.

Perkara yang tidak patut anda lakukan

Jangan menggunakan Glucorid untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri Glucorid kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan berhenti mengambil Glucorid atau mengurangkan dos Glucorid tanpa bertanya dengan doktor anda.

Jika anda tiba-tiba berhenti mengambilnya, keadaan anda mungkin bertambah teruk atau anda boleh mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Merawat hipoglisemia: ("hypos" atau gula darah rendah):

Sebagai pesakit diabetes, anda mungkin menerima ubat lain untuk diabetes anda. Jika Glucorid dipreskripsikan untuk anda sebagai tambahan kepada sulfonilureas, metformin atau insulin untuk mengawal diabetes anda, doktor anda mungkin perlu menyesuaikan dos ubat-ubat ini untuk mengelakkan berlakunya "hypos" (tahap gula darah rendah).

Semasa mengambil Glucorid bersama dengan ubat-ubat ni, jangan merawat "hypo" dengan gula biasa (sukrosa). Ia tidak akan sempat bertindak. Sebaliknya, anda perlu mengambil sedikit pil glukosa (juga dikenali sebagai dekstrosa), madu, sirap atau gula-gula yang boleh didapati dari ahli kimia tempatan.

KESAN SAMPINGAN

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda rasa tidak sihat semasa anda mengambil Glucorid.

Semua ubat ada kesan sampingan. Kadang-kadang kesan sampingan ini serius; kebanyakan masa mereka tidak serius, anda mungkin perlu mendapatkan rawatan perubatan.

Sesetengah pesakit mungkin mengalami kesan sampingan yang tidak diingini semasa rawatan Glucorid. Kesan sampingan ini lebih kerap berlaku pada awal rawatan, tetapi ada yang mungkin berterusan atau mengalaminya selepas rawatan, atau apabila dos Glucorid diselaraskan oleh doktor anda.

Jangan khuatir dengan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut. Minta doktor atau ahli farmasi anda menjawab sebarang persoalan anda.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- perut kembung (angin)
- perut berbunyi "gegaran"
- rasa kenyang
- najis lembut atau cirit-birit; terutamanya jika anda makan makanan yang mengandungi gula

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang lebih biasa. Biasanya kesan sampingan ini akan berhenti jika anda meneruskan rawatan anda dan mengekalkan diet yang dinasihati. Simptom-simpptom

ini mungkin menjadi lebih teruk jika anda tidak mengikuti diet yang ditetapkan.

Jika simptom-simpptom anda berterusan lebih daripada 2 atau 3 hari, atau jika simptom-simpptom ini adalah teruk, bincang dengan doktor anda atau pergi ke bahagian kecemasan yang terdekat terutamanya dalam kes cirit-birit.

Jangan mengambil antasid untuk merawat simptom-simpptom ini kerana besar kemungkinan antasid tidak dapat melegakan anda.

Senarai ini termasuklah yang kesan sampingan yang kurang biasa:

- perut kejang
- loya
- senak
- muntah
- selera makan meningkat
- pening
- hilang selera makan

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom yang berikut. Senarai ini termasuk kesan sampingan yang jarang berlaku:

- **jaundis (kulit kekuningan)**
- **bengkak akibat penahann bendalir**
- **radang-hati (hepatitis)**
- **halangan usus**
- **penurunan dalam kiraan platelet**
- **tindak balas kulit seperti kemerahan, ruam dan urtikaria (gatal-gatal)**

Jika semasa menjalani rawatan dengan Glucorid, anda mengalami mana-mana kesan sampingan atau simptom-simpptom yang anda fikir mungkin disebabkan oleh ubat ini (sama ada atau tidak disebutkan dalam risalah ini) sila maklumkan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera. Anda mungkin perlukan rawatan perubatan dalam sesetengah kes.

Pil Glucorid boleh menyebabkan peningkatan keputusan dalam ujian fungsi hati tertentu.

Kesan sampingan ini akan hilang apabila rawatan dihentikan.

Britahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga berlaku di kalangan sesetengah orang.

SELEPAS MENGAMBIL GLUCORID

Apabila rawatan dengan Glucorid perlu dihentikan, doktor preskripsi anda mungkin perlu mengubah dos ubat-ubat lain dengan sewajarnya dan memantau keadaan anda.

Penyimpanan

Simpan pil anda dalam peknya sehingga tiba masa untuk mengambilnya.

Jika anda mengeluarkan pil daripada pekny, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Simpan pil anda di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 30°C.

Jangan simpan Glucorid atau ubat lain dalam bilik mandi, dekat sinki atau atas unjuran tapak tingkap.

Jangan tinggalkan Glucorid di dalam kereta

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan ubat ini di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil Glucorid atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Pulangkan sebarang ubat yang tidak diguna kepada ahli farmasi anda.

DESKRIPSI PRODUK

Rupa Bentuk Pil Glucorid

Pil Glucorid boleh didapati dalam pek 100 biji dalam dua kekuatan.

Pil Glucorid 50 mg berwarna putih hingga putih kekuningan, berbentuk bulat cembung, bergores dengan tanda “CCM G50”.

Pil Glucorid 100 mg berwarna putih hingga putih kekuningan, berbentuk bulat cembung, bergores dengan tanda “CCM G100”.

Bahan Kandungan

Bahan aktif setiap pil:

- Glucorid 50 – acarbose 50 mg
- Glucorid 100 – acarbose 100 mg

Pengilang/Pengedar

GLUCORID dikilangkan oleh:
UPHA Pharmaceuticals Mfg (M) Sdn.Bhd. (53667-M)
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

GLUCORID diedarkan oleh:
CCM Pharmaceuticals Sdn.Bhd. (27754-W)
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Nombor Pendaftaran Malaysia:
GLUCORID 5mg - MAL 08051938A
GLUCORID 10mg - MAL08051939A

Risalah ini disediakan pada bulan September 2011.