

LOPRESIN TABLET 1 mg, 2 mg and 5 mg®

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE TABLET 1 mg, 2 mg and 5 mg

What is in this leaflet:

1. What Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg is used for
2. How Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg works
3. Before you use Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg
4. How to take Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg
5. While you are using Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg
6. Side Effects
7. How to store and dispose
8. Product description

What Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg is used for

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg is used to treat:

1. High blood pressure.
2. Prostate problems, such as Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) in men waiting for prostate surgery. BPH is a condition that effect the prostate gland of men.
3. Raynaud's disease, where the finger become white and very painful when cold.
4. Certain type of heart failure.

How Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg works

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg works by relaxing the muscles in the walls of blood vessel thus reducing resistance to blood flow. They also relax the muscles in the prostate gland and increase the flow of urine. When used to treat high blood pressure or heart failure, this medicine is often used in combination with other medicines.

Before you use Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg should not be used in the following conditions: allergic to any ingredient of the tablet, you have heart, kidney or liver problem, you are pregnant or plan to become pregnant and breastfeed.

How to take Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg

How much to take

Always take the dose exactly as your doctor has told you.

High Blood Pressure:

The initial dose is 0.5 mg two or three times daily. Your doctor may increase

up to 20 mg a day taken as divided doses.

Left Ventricular Heart Failure:

The initial dose is 0.5 mg two to four times daily. Your doctor may increase up to 20 mg a day taken as divided doses.

Raynaud's disease:

The initial dose is 0.5 mg twice a day. Your doctor may increase up to 2 mg twice a day.

Benign Prostatic Hyperplasia:

The initial dose is 0.5 mg twice a day. Your doctor may increase up to 2 mg twice a day.

Use in Children

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg is not recommended for use in children, as there have been no studies of its effect in children.

When to take it

Take Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg before or after meals. Take your first dose (including first increased dose) at night before going to bed.

How long to take it

Do not stop taking this medicine unless your doctor tells you to stop.

If you forget to take it

If you miss a dose of Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg, take it as soon as possible. Unless if nearly time for next dose (within 3 hours), skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

If you miss two doses or more, contact your doctor.

If you take too much (overdose)

If you have taken more than the prescribed dose, contact your doctor or pharmacist. Overdose symptoms are lightheadedness, dizziness, have a fast or irregular heart beat, or faint.

While you are using Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg

1. Do not stop taking the medicine or lower the dosage without checking with your doctor.
2. Do not take more than the recommended dose.
3. You are advised to avoid alcohol.
4. Do not drive or operate machinery if there is dizziness, lightheadedness or fainting after taking the medicine. If the symptoms are continue, contact your doctor.

Side Effects

Side effects of Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg and 5 mg are spinning sensation or light-headedness when standing up, drowsiness, headache, dizziness, lack of energy, nausea, palpitations.

How to store and dispose

Storage

Keep container tightly closed in a dry place, below 25°C. Protect from light.

Disposal

Do not dispose the medicine into wastewater or household garbage. Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required.

Product Description

What it looks like?

Lopresin Tablet 1 mg is an orange round tablet. The pack sizes is: Plastic Container of 1000 tablets (for Tender or Export only).

Lopresin Tablet 2 mg is a white round tablet. The pack sizes is: Plastic Container of 1000 tablets (for Tender or Export only).

Lopresin Tablet 5 mg is a white round tablet. The pack sizes are: Plastic Container of 500 and 1000 tablets (for Tender or Export only).

Ingredients

The active substance is **prazosin hydrochloride** either 1 mg, 2 mg and 5 mg per tablet.

The other ingredients of Lopresin Tablet 1 mg are aerosil, sodium starch glycolate, lactose mesh 200, lactose DC, sunset yellow lake, microcrystalline cellulose and magnesium stearate.

The other ingredients of Lopresin Tablet 2 mg and 5 mg are aerosil, sodium starch glycolate, lactose mesh 200, lactose DC, microcrystalline cellulose and magnesium stearate.

Registration Numbers:

Lopresin Tablet 1 mg: MAL20021169A

Lopresin Tablet 2 mg: MAL20021170A

Lopresin Tablet 5 mg: MAL20021171A

Manufactured by:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)

Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Date of revision:

Marketing Authorisation Holder

September 22th, 2011

IDAMAN PHARMA MANUFACTURING SDN BHD

LOPRESIN TABLET 1 mg, 2 mg and 5 mg®

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE TABLET 1 mg, 2 mg and 5 mg

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg
2. Bagaimana Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg
4. Cara pengambilan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg
5. Semasa menggunakan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Deskripsi produk

Apakah kegunaan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg digunakan untuk mengubati:

1. Tekanan darah tinggi.
2. Masalah prostat, seperti Benign Prostatic Hyperlapsia (BPH) pada lelaki yang menunggu untuk pembedahan prostat. BPH adalah kondisi yang menjejaskan kelenjar prostat lelaki.
3. Penyakit Raynaud, di mana jari menjadi putih dan sangat menyakitkan apabila sejuk.
4. Beberapa jenis kegagalan jantung.

Bagaimana Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg berfungsi

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg berfungsi untuk merehatkan otot-otot di dinding darah untuk mengurangkan rintangan kepada aliran darah. Mereka juga melonggarkan otot dalam kelenjar prostat dan meningkatkan aliran air kencing. Apabila digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi atau kegagalan jantung. Ubat ini sering digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan lain.

Sebelum mengambil Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg tidak boleh digunakan dalam keadaan alergi terhadap bahan-bahan ubat, anda mempunyai masalah jantung, buah pinggang atau hati, anda mengandung atau merancang untuk hamil dan menyusukan.

Cara pengambilan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg

Berapa banyak untuk diambil

Tekanan Darah Tinggi:

Dos permulaan 0.5 mg dua atau tiga kali sehari. Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos sehingga 20 mg sehari yang diambil dengan dos yang dibahagikan.

Kegagalan Jantung ventrikel kiri:

Dos permulaan 0.5 mg 2-4 kali sehari. Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos sehingga 20 mg sehari yang diambil dengan dos yang dibahagikan.

Penyakit Raynaud:

Dos permulaan 0.5 mg dua kali doktor day. Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos sehingga 2 mg dua kali sehari.

'Benign Prostatic Hyperlapsia':

Dos permulaan 0.5 mg dua kali sehari. Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos sehingga 2 mg dua kali sehari.

Penggunaan pada kanak-kanak

Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg tidak digalakkan untuk digunakan di kalangan kanak-kanak, karena tiada kajian tentang kesannya di kalangan kanak-kanak.

Bila ubat diambil

Ambil Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg sebelum atau selepas makan. Ambil dos pertama anda (termasuk peningkatan dos pertama) pada waktu malam sebelum tidur.

Berapa lama ubat diambil

Jangan berhenti minum ubat ini kecuali atas arahan doktor anda.

Jika anda lupa mengambil ubat

Jika anda terlewat mengambil dos ubat, ambil ubat secepat mungkin. Jika hampir masa untuk dos berikutnya, lewatkan dos tersebut dan kembali ke jadual dos rutin. Jangan mengambil 2 dos sekaligus. Jika anda terlewat 2 dos atau lebih, hubungi doktor anda.

Jika anda mengambil ubat terlalu banyak

Jika anda mengambil dos lebih dari yang ditetapkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda. Tanda-tanda dos berlebihan adalah seperti rasa ringan kepala, pening, denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur atau pengsan.

Semasa menggunakan Lopresin Tablet 1 mg, 2 mg dan 5 mg

1. Jangan henti pengambilan ubat atau mengambil dos lebih rendah tanpa memeriksa dengan doktor anda terlebih dahulu.
2. Jangan mengambil lebih dari dos yang disyorkan.

3. Anda dinasihatkan untuk mengelakkan pengambilan alkohol.
4. Jangan memandu atau mengendalikan jentera jika pening, rasa ringan kepala atau pengsan selepas mengambil ubat. Jika tanda ini berterusan, sila hubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan ubat ini adalah seperti sensasi berputar atau rasa ringan kepala bila berdiri, mengantuk, sakit kepala, pening, kekurangan tenaga, loya, berdebar-debar.

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan ke dalam bekas yang tertutup rapat dan diletak ditempat yang kering, dibawah suhu 25°C. Jauhi dari cahaya.

Pelupusan

Jangan buang ubat ke dalam longkang dan tong sampah. Bertanyakan kepada ahli farmasi anda cara membuang ubat yang tidak diperlukan lagi.

Diskripsi produk

Rupa dan warna tablet

Lopresin Tablet 1 mg berbentuk tablet bulat dan berwarna oren. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 1000 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja).

Lopresin Tablet 2 mg berbentuk tablet bulat dan berwarna putih. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 1000 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja).

Lopresin Tablet 5 mg berbentuk tablet bulat dan berwarna putih. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 500 dan 1000 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja).

Bahan-bahan

Bahan aktif adalah prazosin hidroklorik samaada 1 mg, 2 mg dan 5 mg per tablet. Bahan-bahan lain dalam Lopresin Tablet 1 mg adalah aerosil, 'sodium starch glycolate', laktosa mesh 200, laktosa DC, 'sunset yellow lake', 'microcrystalline cellulose' dan magnesium stearat. Bahan-bahan lain dalam Lopresin Tablet 2 mg dan 5 mg aerosil, 'sodium starch glycolate', laktosa mesh 200, laktosa DC, 'microcrystalline cellulose' dan magnesium stearat.

Nombor Pendaftaran:

Lopresin Tablet 1 mg: MAL20021169A

Lopresin Tablet 2 mg: MAL20021170A

Lopresin Tablet 5 mg: MAL20021171A

Dikilangkan oleh:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)

Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Tarikh semakan:

Pemegang Kuasa Pemasaran