

AXCEL PAPAIN TABLET Risalah Maklumat Ubat untuk pengguna (RiMUP)

Papain Pure (equivalent to proteolytic enzymes from Carica papaya 10,000 units)

APAKAH YANG ADA PADA RISALAH INI

1. Apakah kegunaan Axcel Papain Tablet.
2. Sebelum mengambil Axcel Papain Tablet.
3. Cara menggunakan Axcel Papain Tablet.
4. Semasa menggunakan Axcel Papain Tablet.
5. Kesan- kesan sampingan.
6. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Papain Tablet.
7. Maklumat lanjut.
8. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
9. Tarikh kemaskini.

APAKAH KEGUNAAN AXCEL PAPAIN TABLET

Axcel Papain Tablet digunakan dengan kombinasi cara fizikal atau *chemotherapeutic* yang lain untuk merawat edema dan keradangan.

SEBELUM MENGAMBIL AXCEL PAPAIN TABLET Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda menghadapi penyakit darah beku.
- Jika anda menghadapi mana-mana jangkitan umum atau sistemik.

Sebelum mula mengambil

Sebelum anda mengambil Axcel Papain Tablet anda perlu memaklumkan kepada doktor anda:

- Jika anda menghadapi penyakit ginjal.
- Jika anda menghadapi penyakit hati.
- Jika anda mengandung.

Jika situasi di atas berkenaan dengan anda, berbincang dengan doktor yang akan menentukan apa yang perlu dilakukan.

Jika mengambil ubat- ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain.

- *anticoagulant drugs*

Ia mungkin selamat bagi anda untuk mengambil Axcel Papain Tablet dan doktor akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

CARA MENGGUNAKAN AXCEL PAPAIN TABLET

Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan oral sahaja.

Untuk dewasa: 2 tablet 4 kali sehari sebelum pembedahan diikuti dengan 4 kali sehari selama 5 hari.

Bila perlu digunakan

Axcel Papain Tablet perlu diambil apabila anda mengalami edema dan keradangan. Kebiasaannya, ia diambil dengan kombinasi cara fizikal atau *chemotherapeutic* yang lain.

Berapa lama perlu digunakan

- Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.
- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.

Jika terlupa menggunakan

- Jangan mengandakan sukatan kerana Axcel Papain Tablet mungkin akan memberikan kesan sampingan yang merbahaya.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Dinasihatkan supaya anda hubungi dan maklumkan doktor anda jika anda mengambil Axcel Papain Tablet berlebihan.

SEMASA MENGGUNAKAN AXCEL PAPAIN TABLET

Perkara yang perlu dilakukan

- Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang mesti dan tidak patut anda lakukan semasa mengambil ubat ini.
- Maklumkan doktor anda jika anda perlu mengambil ubat lain secara tiba-tiba.
- Ambil Axcel Papain Tablet mengikut dos yang disarankan.
- Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Axcel Papain Tablet lebih daripada frekuensi yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan lebihi dos tablet pada setiap satu masa pengambilan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari penggunaan berterusan dengan dos tinggi.
- Berhati-hati menggunakan Axcel Papain Tablet ketika mengandung.
- Berhati-hati semasa mengambil ubat ini jika anda menghidap penyakit ginjal atau hati.

KESAN- KESAN SAMPINGAN

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Papain Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doctor/ ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- 'Urticaria'.

AXCEL PAPAIN TABLET *Risalah Maklumat Ubat untuk pengguna (RiMUP)*

Papain Pure (equivalent to proteolytic enzymes from Carica papaya 10,000 units)

- 'Pruritus'.
- Kepeeningan.
- Rasa loya.
- Muntah-muntah.
- Cirit-birit.

KOTRA PHARMA (M) SDN
BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers -> reporting*).

TARIKH KEMASKINI
02/08/2013

CARA PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN AXCEL PAPAIN TABLET

Penyimpanan

Jauhkan Axcel Papain Tablet dari jangkauan kanak-kanak.
Simpan di bawah 30°C.
Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi dari cahaya.

Pelupusan

Jangan guna Axcel Papain Tablet yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

MAKLUMAT LANJUT

Rupa dan warna produk

Axcel Papain Tablet berwarna biru cair, biconveks, bulat dan mempunyai diameter 8mm dengan logo KOTRA pada satu bahagian dan satu bahagian lagi dicetak dengan satu garisan.

Bahan- bahan kandungan

Bahan Aktif:

Papain

Bahan Tidak Aktif:

Magnesium Stearate, Lactose, Sodium Starch Glycollate, PVP K90, Brilliant Blue Dye, Talcum Powder, Purified water dan Microcrystalline Cellulose.

Nombor MAL

MAL19911414X

PENGILANG DAN PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK