

CIMETIDINE 200

CIMETIDINE 400

Cimetidine 200mg / Cimetidine 400mg

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Cimetidine*
- Bagaimana *Cimetidine* berfungsi
- Sebelum mengambil *Cimetidine*
- Cara menggunakan *Cimetidine*
- Semasa menggunakan *Cimetidine*
- Kesan-sesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Cimetidine*
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Pemegang pendaftaran produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Cimetidine*

Untuk rawatan ulser perut, ulser akibat ubat-ubat tertentu, refluks perut-usus dan sindrom Zollinger-Ellison.

Bagaimana *Cimetidine* berfungsi

Cimetidine adalah tergolong dalam kumpulan ubat antagonis reseptor H₂, yang bertindak mengurangkan pengeluaran asid dalam perut.

Sebelum mengambil *Cimetidine*

Bila tidak boleh mengambil

Jika ada alahan terhadap cimetidine dan ramuan-ramuan lain *Cimetidine*.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor sebelum memulakan rawatan.

- Jika mengidap atau pernah mengidap penyakit hati atau buah pinggang.
- Jika ada sejarah ulser usus, seperti selepas penggunaan ubat anti radang bukan steroid (NSAID) seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, diclofenac.
- Jika mengambil ubat atau ada penyakit yang menyebabkan penurunan bilangan sel darah.
- Jika usia meningkat atau perubahan tanda-tanda ketidakhadaman seperti sakit perut atau tidak selesa, pedih ulu hati), tanda-tanda kanser perut perlu diberi perhatian.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Cimetidine dilaporkan berinteraksi dengan banyak ubat. Pengurangan dos biasa ubat seperti siklosporin, linokain, nifedipin, fenitoin, suksametonium, teophylin dan warfarin perlu diadakan.

Cara menggunakan *Cimetidine*

Berapa banyak harus diambil

Ulser usus aktif: 800mg sebelum tidur untuk sekurangnya 4 minggu. Susulan: 400mg sebelum tidur untuk 6 bulan.

Ulser akibat NSAID: 400mg dua kali sehari atau 800mg setiap malam untuk sekurang-kurangnya 8 minggu.

Penyakit refluks perut-usus: 0.8 – 1.6gm/hari sehingga 12 minggu.

Sindrom Zollinger-Ellison: 400mg 4 kali sehari atau kadang-kadang lebih.

Bila perlu diambil

Cimetidine diambil mengikut arahan doktor. Jika tidak pasti, semak semula dengan doktor atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu diambil

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa mengambil

Jangan mengambil dos berganda sebagai gantian dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan *Cimetidine*

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sehinggalah jangka rawatan selesai. Tanda-tanda penyakit mungkin berulang jika rawatan dihentikan terlalu awal.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor jika lau hamil atau menyusukan anak semasa rawatan,

Kesan-sesan sampingan

Kesan-sesan sampingan jarang berlaku dan pulih selepas pengurangan atau pemberhentian pengambilan ubat.

Kesan-sesan paling biasa dilaporkan adalah cirir-birit, pening, letih, sakit kepala dan ruam. Keadaan kekeliruan berlaku pada orang tua atau yang

berpenyakit buah pinggang.

Pembesaran buah dada dan impotens pernah berlaku pada lelaki yang mengambil dos tinggi seperti rawatan

sindrom Zollinger-Ellison. Kesan-kesan lain pernah dilaporkan adalah alahan, demam, sakit otot, sakit sendi, gangguan darah dan jantung.

Gangguan hati(sakit perut dan abdomen, hilang selera dan demam kuning) dan buah pinggang (darah dalam air kencing, peningkatan atau pengurangan air kencing, loya, muntah) jarang berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835400, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Pengguna → Laporan)

Cara penyimpanan dan pelupusan *Cimetidine*

Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Cimetidine 200: Tablet putih, bulat dan biconveks.

Cimetidine 400: Putih, bujur, biconveks, tertera P-P.

Bahan-bahan kandungan

cimetidine, polivinilpirolidon, laktos monohidrat, mikrokristalin selulos, magnesium sterat dan kroskarmelos natrium,

No. MAL:

Cimetidine 200: MAL19973015A

Cimetidine 400: MAL19984396A

Pengilang

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Pemegang pendaftaran keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini

15/05/2013