

CLOPIDIVID 75 mg TABLET

Clopidogrel (75mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Clopidiv
2. Bagaimana Clopidiv berfungsi
3. Sebelum mengambil Clopidiv
4. Cara menggunakan Clopidiv
5. Semasa menggunakan Clopidiv
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Clopidiv
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Clopidiv

Clopidiv digunakan untuk mencegah pembekuan darah setelah serangan jantung atau strok. Ia juga digunakan bagi pesakit-pesakit dengan masalah jantung ataupun peredaran darah.

Bagaimana Clopidiv berfungsi

Clopidiv mengandungi bahan aktif, *Clopidogrel* yang merupakan ubat di bawah kumpulan anti-platelet.

Platelet adalah sebahagian sel darah kecil yang akan berkumpul bersama semasa proses pembekuan darah. Anti-platelet bertindak untuk mengurangkan kejadian pembekuan darah (*thrombosis*).

Sebelum mengambil Clopidiv

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah pada Clopidogrel, atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam Clopidiv.
- anda mempunyai apa-apa gangguan pendarahan ataupun risiko pendarahan dalaman seperti ulser perut ataupun pendarahan otak.
- anda menghadapi penyakit hati yang serius
- anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi
- anda hamil atau merancang untuk hamil.

- *Sebelum mula mengambil*

Beritahu doktor jika:

- Anda mempunyai risiko pendarahan seperti ulser perut atau apa-apa gangguan pendarahan yang

mungkin mengakibatkan pendarahan dalaman.

- Anda mempunyai sejenis gangguan pendarahan yang dipanggil *Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)*, menyebabkan pembekuan darah dalam saluran darah kecil di seluruh badan dan mengurangkan jumlah platelet.
- Anda mempunyai apa-apa kecederaan serius.
- Anda telah atau akan menjalani apa-apa pembedahan (termasuk pergigian) dalam 7 hari yang akan datang.
- Anda pernah mempunyai pembekuan darah pada otak (*ischaemic stroke*) dalam 7 hari sebelum ini.
- Anda mengalami masalah buah pinggang ataupun hati.
- Anda menyusukan bayi, atau bercadang untuk menyusu.
- Anda hamil, rasa anda hamil, atau bercadang untuk hamil.
- Anda alah kepada mana-mana ubat lain, bahan makanan, pewarna atau pengawet

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi. Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi Clopidogrel.

Ia termasuk:

- Lain-lain ubat anti platelet ataupun ubat yang digunakan untuk merawat atau mencegah pembekuan darah seperti aspirin, heparin, warfarin, ticlopidine.
- Ubat anti-radang bukan steroid (NSAIDs) untuk tahan sakit sendi, kedatangan haid, bengkak dan lain-lain.
- Phenytoin, untuk penyakit sawan.
- Tolbutamide, untuk diabetes.
- Tamoxifen, untuk kanser payudara.
- Fluvastatin, untuk mengurangkan kolesterol.

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor

atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Clopidiv

- *Berapa banyak harus digunakan*

Dos biasa ialah 1 tablet Clopidiv 75mg sekali sehari.

Clopidiv tidak disyorkan untuk kanak-kanak.

Telan tablet sepenuhnya dengan meminum segelas air.

Jangan hancurkan atau kunyah tablet.

- *Bila perlu digunakan*

Makan Clopidiv 75mg pada masa yang sama setiap hari, dengan ataupun tanpa makanan.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini seperti yang telah ditetapkan oleh doktor.

- *Jika terlupa menggunakan*

Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya pada masa yang selalu diambil.

Kalau tidak, ambil ubat secepat mungkin setelah anda ingat dan ikutkan masa yang selalu diambil.

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor dengan segera sekiranya anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan.

Anda mungkin mengalami tanda-tanda pendarahan jika anda mengambil melebihi dos yang ditetapkan.

CLOPIVID 75 mg TABLET

Clopidogrel (75mg)

Semasa menggunakan Clopidivid

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu doktor, doktor gigi ataupun ahli farmasi yang memberikan rawatan bahawa anda sedang mengambil ubat Clopidogrel.
- Beritahu doktor serta-merta sekiranya anda mengandung.
- Patuhi masa rawatan untuk jumpa doktor dan ujian-ujian darah.
- Beritahu doktor jika anda bercadang untuk menyusu bayi anda.
- Beritahu doktor dengan serta-merta sekiranya anda mengalami kecederaan semasa mengambil Clopidogrel.
- Kenalpasti tanda-tanda awal pendarahan:
 - Pendarahan yang tidak dapat dijangkakan atau pendarahan yang tidak berhenti.
 - Darah dalam urin (warna merah jambu, merah terang atau perang).
 - Najis berwarna merah atau hitam (seperti tar).
 - Lebam yang terjadi tanpa sebab atau semakin besar.
 - Batuk darah atau batuk darah beku.
 - Muntah darah atau muntah berwarna kopi tanah

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda
- ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi
- berhenti dari mengambil ubat ini atau menukar dos yang telah ditetapkan dengan sesuka hati tanpa merujuk kepada doktor

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila melakukan aktiviti-aktiviti seperti memandu dan

mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Clopidivid mempengaruhi anda.

Minuman beralkohol akan menyebabkan keadaan bertambah teruk. Berhati-hati akan pengambilannya.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan yang lebih biasa

- dyspepsia (ketakceraan), sakit abdomen atau sakit perut
- pening atau sakit kepala
- sakit dada
- tanda-tanda seperti selesema

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers→Reporting)

Cara penyimpanan dan pelupusan Clopidivid

- Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Jauhkan dari cahaya dan kelembapan.

Simpan Clopidivid 75 mg Tablet di bawah suhu 25°C.

- Pelupusan

Tiada arahan yang spesifik. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bentuk bulat disaluti filem, warna merah jambu berpinggir serong dan sedikit cembung.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap Clopidivid 75 mg mengandungi 75mg Clopidogrel Hydrogen Sulphate.

- Bahan Tidak Aktif

Colloidal Silicon Dioxide
Hydroxypropyl Methylcellulose
Kollidon VA
Iron Oxide Red
Isopropyl Alcohol
Microcrystalline Cellulose.
Propylene Glycol
Crospovidone
Sodium Starch Glycolate
Talc
Magnesium stearate
Isopropyl Alcohol
Titanium Dioxide

- NOMBOR MAL:

MAL06061677A

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7¹/₂ Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23 April 2015

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)220415/00076