

# FEDAC TABLET

Tripolidine HCl 2.5mg, Pseudoephedrine HCl 60mg

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fedac
2. Bagaimana Fedac berfungsi
3. Sebelum mengambil Fedac
4. Cara menggunakan Fedac
5. Semasa menggunakan Fedac
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fedac
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Fedac

Fedac digunakan untuk melegakan simptom-simptom selesema dan alahan termasuk hidung berair, mata berair, hidung tersumbat dan sinus tersekat.

## Bagaimana Fedac berfungsi

Fedac mengandungi *pseudoephedrine hydrochloride*, yang merupakan dekonjestan yang melegakan hidung dan sinus tersumbat dan *triprolidine hydrochloride*, sejenis ubat antihistamina yang membantu menghentikan bersin, hidung berair dan mata berair.

## Sebelum mengambil Fedac

### Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Fedac jika:

- anda alah (hipersensitif) kepada *pseudoephedrine hydrochloride*, *triprolidine hydrochloride*, atau bahan-bahan lain dalam ubat.
- anda mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi atau penyakit jantung yang teruk.
- anda mengambil ubat untuk kemurungan yang dikenali sebagai *Monoamine Oxidase Inhibitors* (MAOIs) dalam masa dua minggu yang lepas.
- anda mempunyai tiroid yang terlalu aktif (tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid)
- Anda mengandung, ingin hamil, atau sedang menyusukan bayi
- Anda mengambil minuman beralkohol.

### Sebelum mula mengambil

Anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Fedac jika:

- anda hamil atau sedang menyusukan anak.

Jika anda tidak pasti mana di atas berkenaan dengan anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Fedac.

### Kanak-kanak

- Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak kurang daripada 2 tahun.
- Gunakan dengan berhati-hati atas nasihat doktor atau ahli farmasi untuk kanak-kanak 2-6 tahun.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi, termasuk:

- Sedatif (ubat yang digunakan untuk merawat keresahan dan ketegangan).
- Ubat simpatomimetik (ubat perangsang atau penahan selera makan dan ubat yang digunakan untuk merawat hidung tersumbat dan asma).

## Cara menggunakan Fedac

### Berapa banyak harus diambil

Dewasa:

1 tablet 3 kali sehari.

### Bila perlu diambil

Ambil Fedac pada masa yang sama setiap hari. Jika anda tidak pasti, periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

### Berapa lama perlu diambil

Sentiasa mengambil Fedac tepat seperti yang doktor anda telah beritahu anda. Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

### Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk mengambil dos anda, ambilkannya secepat mungkin apabila anda ingat. Ambil dos seterusnya pada masa yang tepat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

### Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda (atau orang lain) telah mengambil banyak tablet/sirap pada masa yang sama, atau anda menyaki kanak-kanak mungkin melannya, hubungi jabatan kecemasan hospital yang terdekat atau beritahu doktor anda dengan segera.

Gejala terlebih dos termasuk:

- kegelisahan
- Kecelaruan (keadaan kekeliruan yang teruk secara tiba-tiba)
- Gegaran otot

## Semasa menggunakan Fedac

### Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Fedac selama yang doktor anda mencadangkan. Jika simptom-simptom masih berterusan atau tidak bertambah baik selepas beberapa hari, sila berjumpa dengan doktor.

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan Fedac kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan mengambil Fedac untuk merawat sebarang simptom lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.
- Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

### Perkara yang perlu diberi perhatian

Fedac Tablets mengandungi laktosa. Jika anda telah diberitahu anda tidak bertoleransi kepada beberapa gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

# FEDAC TABLET

Tripolidine HCl 2.5mg, Pseudoephedrine HCl 60mg

## Memandu dan menggunakan mesin

Anda mungkin berasa mengantuk selepas mengambil ubat ini. Jika ini berlaku, jangan memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin. Elakkan minuman beralkohol.

## **Kesan-kesan Sampingan**

Seperti semua ubat-ubatan, Fedac boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda, termasuk:

- rasa mengantuk
- kekerangan mulut
- ketakutan
- kegelisahan
- masalah tidur

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi untuk maklumat lanjut jika anda mengalami kesan sampingan yang lain yang membimbangkan anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web [portal.bpfk.gov.my](http://portal.bpfk.gov.my) (*Consumers → Reporting*)

## **Cara penyimpanan dan pelupusan Fedac**

### Penyimpanan

Simpan ubat jauh daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 25°C dan lindungi dari cahaya.

### Pelupusan

Jangan makan ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Sila pulangkan tablet yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan tablet jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam air atau bersama-sama dengan

sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

## **Maklumat lanjut**

### Rupa dan warna produk

Tablet berwarna merah jambu, berbentuk bulat dan rata dengan diameter 8mm, garis skor pada satu permukaan dan logo 'DHA' pada permukaan yang lain.

### Bahan-bahan kandungan

#### Baha-bahan aktif

Setiap tablet mengandungi 2.5mg *Tripolidine HCl* dan 60mg *Pseudoephedrine HCl*.

#### Bahan-bahan tidak aktif

*Lactose mesh 200, povidone 30, corn starch, magnesium stearate, ponceau 4R aluminium lake*

### Nombor MAL

MAL19900594A

## **Pengilang**

### **Drug Houses of Australia Pte. Ltd.**

#09-01/02 Haw Par Tiger Balm Building,  
No. 2, Chia Ping Road,  
Singapore 619968

## **Pemegang Pendaftaran Produk**

### **Actavis Sdn Bhd**

Unit 304, Level 3, Uptown 2,  
No 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

## **Tarikh kemaskini RiMUP**

13-01-2015

## **Nombor siri**

BPFK(R4/1)130115/00013