

METFORMIN WINTHROP MR 850 mg Tablet

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet
2. Bagaimana Metformin Winthrop MR 850 mg tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Metformin Winthrop MR 850 mg tablet
4. Cara menggunakan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet Semasa menggunakan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet
5. Kesan-kesan sampingan
6. Cara penyimpanan dan pelupusan Diabetmin
7. Maklumat lanjut
8. Pengilang
9. Pemegang Kelulusan Pemasaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet

Digunakan untuk merawat penyakit kencing manis jenis 2 atau dikenali sebagai 'non-insulin dependent diabetes mellitus' (NIDDM) bagi dewasa yang kepekatan gula dalam darahnya tidak dapat dikawal melalui senaman atau dengan mengawal pengambilan makanan.

Bagaimana Metformin Winthrop MR 850 mg tablet berfungsi

Ubat ini adalah biguanida yang mengurangkan kandungan gula dalam darah yang tinggi dalam badan.

Ia berfungsi dengan:

- mengurangkan kandungan gula dalam darah yang dihasilkan oleh hati
- meningkatkan sensitiviti badan terhadap insulin dan cara badan menggunakan insulin
- memperlahankan kadar penyerapan glukosa ke dalam usus.

Sebelum mengambil Metformin Winthrop MR 850 mg tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah pada metformin, biguanida lain atau eksipiennya
- anda mempunyai penyakit kencing manis koma (apabila kandungan gula dalam darah anda adalah sangat tinggi dan badan ternyahhidrat dengan teruk)
- anda lecu dengan teruk dan mengalami jangkitan
- anda menghadapi penyakit buah pinggang
- anda menghadapi penyakit hati
- anda telah menjalani atau sedang menjalani pembedahan yang major
- anda menghadapi trauma yang teruk
- anda mempunyai asidosis laktik yang aktif atau pernah mengalaminya (pembentukan asid dalam darah akibat daripada penyingkiran asid yang tidak cekap dari badan)
- anda mengalami kesukaran untuk bernafas yang teruk
- anda menghadapi penyakit jantung atau mempunyai masalah saluran darah seperti kegagalan jantung, serangan sakit jantung, kegagalan peredaran darah dalam badan secara tiba-tiba atau dengan cepat
- anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi
- anda hamil atau merancang untuk hamil.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika:

- anda mempunyai alah kepada mana-mana ubat lain, bahan makanan, pewarna atau pengawet
- anda mengambil alkohol
- anda mengalami kegagalan jantung
- anda mengalami masalah buah pinggang
- anda menyusukan bayi
- anda hamil, rasa anda hamil, atau bercadang untuk hamil.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi metformin hidroklorida.

Ia termasuk:

- pengambilan alkohol yang akut atau kronik
- cimetidine atau ubat kationik lain yang dikumuh daripada tiub renal.
- furosemide
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan hiperglisemia dan hipoglisemia

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet

Berapa banyak harus diambil

Dewasa: Ambil 1 tablet, 2 kali sehari

Diabetmin tidak disyorkan untuk kanak-kanak.

Dos untuk orang tua akan diubahsuai berdasarkan fungsi buah pinggang dan kebarangkalian fungsi buah pinggang akan merosot.

Telan tablet dengan meminum segelas air.

Bila perlu digunakan

Ambil:

- Metformin Winthrop MR 850 mg tablet dengan atau tanpa makanan

Berapa lama perlu diambil

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini seperti yang telah ditetapkan oleh doktor.

Jika terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan segera sekiranya anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan.

Anda mungkin mengalami tanda-tanda seperti berikut:

- kandungan gula dalam darah rendah
- asidosis laktik (tanda-tanda termasuk rasa mengantuk, sangat letih, rasa sakit, muntah, mengalami kesusahan untuk bernafas dan mengalami sakit sendi, sakit perut atau cirit-birit).

Semasa menggunakan Metformin Winthrop MR 850 mg tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Kenal pasti tanda-tanda kandungan gula dalam darah yang rendah (hipoglikemia) dan kandungan gula dalam darah yang tinggi (hiperglikemia).

Tanda-tanda awal hipoglikemia:

- lemah, menggeletar atau menggigil
- berpeluh
- pening, sakit kepala atau kurang tumpuan
- cepat marah atau menangis
- kelaparan
- sekitar kawasan bibir dan lidah menjadi kebas.

Ini mungkin akan membawa kepada:

- hilang koordinasi
- pertuturan tidak jelas

- kekeliruan
- sawan atau hilang kesedaran.

Tanda-tanda hiperglikemia:

- kerap membuang air kecil
- rasa dahaga yang meningkat
- selalu terasa lapar.

Beritahu doktor jika:

- anda jatuh sakit
- anda telah ternyahhidrat
- anda terluka
- anda demam atau mengalami jangkitan yang serius seperti demam selesema, jangkitan pada salur pernafasan, atau jangkitan saluran kencing
- anda akan menjalani pembedahan yang major.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda
- ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi
- berhenti dari mengambil ubat ini atau menukar dos yang telah ditetapkan dengan sesuka hati tanpa merujuk kepada doktor
- mengambil ubat ini tanpa makanan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati supaya tidak membiarkan paras gula dalam darah anda turun terlalu rendah apabila melakukan aktiviti-aktiviti seperti memandu dan mengendalikan mesin.

Minuman beralkohol akan menyebabkan keadaan bertambah teruk. Berhati-hati akan pengambilannya.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan

sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan yang sangat umum

- kesan buruk daripada gastrousus termasuk anoreksia, cirit-birit, dyspepsia, perut kembung, loya, muntah
- sakit kepala
- rasa kelogaman
- hilang berat badan
- anemia
- megaloblastik
- hipoglisemia
- asidosis laktik
- penurunan penyerapan vitamin B₁₂ dengan penurunan paras serum

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Cara penyimpanan dan pelupusan Diabetmin

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30⁰C. Jauhkan dari cahaya dan kelembapan.

Pelupusan

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Bulat, tablet putih tanpa salutan filem dengan permukaan cembung.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Metformin Winthrop MR 850 mg tablet mengandungi 850 mg Metformin Hidroklorida (extended release)

Bahan Tidak Aktif

Metformin Winthrop MR 850 mg tablet:
Magnesium state
Hydroxypropyl Methylcellulose
Colloidal Silicon Dioxide

NOMBOR MAL: MAL09111749AC

Pemegang Kelulusan Pemasaran

HOVID Pharmacy Sdn Bhd
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7¹/₂ Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

November 2011