

DAIVONEX[®] CREAM

Calcipotriol (50 mcg/g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Daivonex[®] Cream*
2. Bagaimana *Daivonex[®] Cream* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Daivonex[®] Cream*
4. Cara menggunakan *Daivonex[®] Cream*
5. Semasa menggunakan *Daivonex[®] Cream*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Daivonex[®] Cream*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Daivonex[®] Cream*

Daivonex[®] Cream mengandungi calcipotriol (sejenis Vitamin D). *Daivonex[®] Cream* tidak mengandungi steroid.

Daivonex[®] Cream adalah digunakan untuk psoriasis vulgaris. Psoriasis adalah penyakit kulit di mana sel-sel kulit dihasilkan dengan terlalu cepat.

Ini Menyebabkan "plak" dibentuk pada kulit. Plak adalah kawasan kulit yang tebal, kasar, berwarna merah dan ditutup oleh sisik yang halus, kering dan berwarna perak.

Daivonex[®] Cream ini hanya boleh didapati dengan preskripsi doktor.

Bagaimana *Daivonex[®] Cream* berfungsi

Daivonex[®] Cream bertindak dengan mengurangkan jumlah sel-sel yang dihasilkan oleh kulit anda. Ini bermakna gejala kulit anda akan berkurang juga.

Sebelum menggunakan *Daivonex[®] Cream*

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan gunakan *Daivonex[®] Cream* jika anda mempunyai alahan terhadap:

- sebarang ubat yang mengandungi calcipotriol
- apa-apa bahan yang disenaraikan pada bahagian akhir risalah ini (lihat bahagian:

Maklumat lanjut)

Beberapa gejala reaksi alahan termasuk sesak nafas, sempit atau kesukaran bernafas; bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain; ruam, gatal atau geligata pada kulit.

Jangan gunakan *Daivonex[®] Cream* jika anda

- mempunyai tahap darah kalsium yang tinggi

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Daivonex[®] Cream* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Daivonex[®] Cream* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Keselamatan *Daivonex[®] Cream* dalam kehamilan manusia masih belum dibuktikan..

- *Sebelum menggunakan Daivonex[®] Cream*

Beritahu doktor anda jika anda

- mengalami sebarang penyakit lain.

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang mana-mana di atas, beritahu dia sebelum anda mula menggunakan ubat ini.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat yang perlu berhati-hati atau dielakkan ketika menggunakan *Daivonex[®] Cream*.

Jangan gunakan *Daivonex[®] Cream* dengan salicylic acid..

Rawatan serentak dengan persediaan topikal mengandungi Salicylic Acid harus dielakkan kerana Salicylic Acid mungkin merencat calcipotriol.

Cara menggunakan *Daivonex[®] Cream*

Basuh tangan anda dengan teliti selepas menggunakannya pada mana-mana bahagian badan anda, melainkan jika tangan anda sedang dirawat. Sapu sedikit pada lesi kulit yang terjejas.

Jangan gunakan *Daivonex[®] Cream* pada muka.

- *Berapa banyak harus digunakan*

Jangan gunakan lebih daripada 100g dalam satu minggu (tidak lebih daripada tiga tiub 30g *Daivonex[®] Cream*).

- *Bila perlu digunakan*

Gunakan *Daivonex[®] Cream* dua kali sehari

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan *Daivonex[®] Cream* selagi doktor anda beritahu anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa untuk menggunakan *Daivonex[®] Cream*, gunakannya sebaik sahaja anda ingat. Kemudian teruskan penggunaan seperti sebelum ini.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, tanya doktor atau ahli farmasi.

Jika anda mempunyai masalah mengingati penggunaan ubat anda, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk beberapa petunjuk.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan (lebih dari 100g Daivonex® cream mingguan) boleh menyebabkan peningkatan kalsium dalam darah yang mana akan berkurang dengan cepat, apabila rawatan dihentikan.

Semasa menggunakan Daivonex® Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan mula menggunakan sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan Daivonex® Cream

Jika anda hamil ketika menggunakan Daivonex® Cream, beritahu doktor anda dengan segera.

Pastikan anda memenuhi semua temujanji dengan doktor supaya keadaan anda boleh disemak. Doktor anda boleh melakukan beberapa ujian darah dari semasa ke semasa.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan gunakan Daivonex® Cream dengan rawatan lain untuk psoriasis melainkan jika ditetapkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan lebih daripada dos mingguan yang disyorkan (lihat bahagian: Cara menggunakan Daivonex® Cream

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini tidak menyebabkan ketagihan

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Daivonex® Cream boleh menyebabkan kesan sampingan,

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan yang berikut. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- jika anda mempunyai sebarang kesan yang tidak menyenangkan semasa anda menggunakan Daivonex® Cream.
- atau
- jika anda mendapati mana-mana berikut yang membimbangkan anda:
 - iritasi setempat yang sementara
 - keradangan kulit muka

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers →Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Daivonex® Cream

- Penyimpanan

- Jauhkan daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.
- Simpan pada suhu billik terkawal (15°C – 25°C).
- Jangan simpan Daivonex® Cream atau sebarang ubat lain di dalam bilik air atau berhampiran singki. Jangan biarkan ia berada pada ambang tingkap atau di dalam kereta. Haba dan kelembapan boleh memusnahkan sesetengah ubat.
- Jangan gunakan Daivonex® Cream selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusan atau jika bungkusan koyak,

tidak kelihatan agak betul atau menunjukkan tanda-tanda dibuka.

- Pelupusan

Jika doktor anda memberitahu anda untuk berhenti menggunakan Daivonex® Cream atau tarikh luput telah berlalu, tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan baki Daivonex® Cream.

Jika bungkusan Daivonex® Cream rosak atau tarikh luput sudah berlalu, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Daivonex® Cream adalah krim lembut yang berwarna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Calcipotriol (50 mikrogram/gram)
- Bahan tidak aktif
 - Cetomacrogol
 - Cetostearyl alcohol
 - Chloroallylhexaminium chloride
 - Disodium edetate
 - Disodium phosphate dihydrate
 - Glycerol
 - Liquid Parafin
 - White Soft Parafin
 - Purified Water

- Nombor MAL

MAL19961672AZ

Pengilang

LEO Pharmaceutical Products A/S Limited
Industriparken 55 DK-2750
Ballerup, Denmark

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd
B-11-01, The Ascent, Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP

21/03/2016

Nombor siri:

BPFK(R4/1)240316/00094