

FLEXIJOINT TABLET/ CAPSULE

Glucosamine Sulphate (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Flexijoint Tablet/ Capsule
2. Bagaimana Flexijoint Tablet/ Capsule berfungsi
3. Sebelum mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule
4. Cara mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule
5. Semasa mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Flexijoint Tablet/ Capsule
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Flexijoint Tablet/ Capsule

Flexijoint Tablet/ Capsule digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit sendi merosot.

Bagaimana Flexijoint Tablet/ Capsule berfungsi

Flexijoint Tablet/ Capsule mengandungi Glukosamin yang membentuk tisu rawan dalam badan dan memberi aktiviti perinciran dengan meningkatkan pengeluaran bendalir sendi.

Sebelum mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Glukosamin, atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini. Produk ini tidak sesuai untuk mereka yang alergi kepada kerang-kerangan.

- Sebelum mula mengambil

Produk ini patut diambil di bawah penyeliaan perubatan bagi wanita yang mengandung dan menyusukan. Administrasi bagi trimester pertama kehamilan perlu dielakkan.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Glukosamin mungkin mengurangkan keberkesanan agen antidiabetik seperti: Acarbose, Acetohexamide, Chlorpropamide, Glipizide, Glyburide, Metformin, Miglitol, Pioglitazone, Repaglinide, Rosiglitazone, Glimepiride, Tolbutamide dan Troglitazone. Glukosamin mungkin juga mengurangkan keberkesanan agen antikanser seperti Doxorubicin, Etoposide dan Teniposide. Glukosamin meningkatkan kesan Warfarin sekiranya diambil seiringan.

Cara mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Permulaan: Ambil 2 tablet 3 kali sehari sebelum makan.

Terapi ini harus dikekalkan sekurang-kurangnya 3 bulan (atau ikut arahan profesional kesihatan) untuk mendapat kesan yang nyata.

Pengekalan: Ambil 2 tablet 2 kali sehari sebelum makan.

Selepas terapi selama 3 bulan, dos boleh ditambah atau dikurangkan mengikut keadaan peribadi.

- Bila perlu diambil

Boleh diambil sebelum makan.

- Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa Flexijoint Tablet/ Capsule, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada maklumat yang terlebih dos dilaporkan.

Semasa mengambil Flexijoint Tablet/ Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Untuk rawatan yang mendasari osteoarthritis, adalah dinasihati supaya mengambil ubat penahan sakit dan anti inflamasi bersama tempoh rawatan selama 2 atau 3 minggu sekiranya diperlukan sebab kesan terapi hanya boleh diperhatikan selepas 2 hingga 3 minggu.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Keselamatan dan keberkesanan belum ditentukan untuk kanak-kanak. Oleh itu, elakkannya daripada kanak-kanak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Individu dengan gangguan fungsi hati dan buah pinggang perlu diperhatikan di bawah pengawasan perubatan semasa mengambil produk ini.

Kesan Sampingan

Kardiavaskular: Periferal edema dan tachycardia telah dilaporkan.

Sistem Saraf Pusat: Mengantuk, sakit kepala, insomnia jarang sekali diperhatikan.

Gastrosus: Mual, muntah, cirit-birit, dispepsia, sakit gastrik, sembelit, pedih hulu hati dan anoreksia juga dinyatakan semasa terapi oral dengan Glukosamin.

Kulit: Reaksi kulit seperti eritema dan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Flexijoint Tablet/ Capsule

- Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya, kepanasan dan kelembapan.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Flexijoint Tablet ialah tablet berwarna putih, bulat tidak bersalut dengan skor di sebelah. Flexijoint Capsule ialah kapsul putih merah yang mengandungi serbuk putih halus.

- Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif

Active ingredient

Flexijoint Tablet contains Glucosamine Sulphate 250mg.

Flexijoint Capsule contains Glucosamine Sulphate 500mg.

Bahan-bahan tidak aktif

Flexijoint Tablet

Vinyl Pyrrolidone (Plasdone S630), Synthetic

Precipitated Silica (Flo-Gard), Sodium Starch

Glycolate, Magnesium Stearate,

Microcrystalline cellulose (Avicel PH 101).

Flexijoint Capsule

Magnesium Stearate, Sorbitol Powder.

- Nombor MAL:

Flexijoint 250mg Tablet: MAL07091081X

Flexijoint 500mg Capsule: MAL07091075X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.

1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,

Taman I.K.S. Bukit Minyak,

14000 Bukit Mertajam,

Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

2/10/ 2017

Nombor siri:

NPRA(R4/1)290917/00259