

AVONAC SR TABLET

Diclofenac Sodium (100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Avonac Tablet
2. Bagaimana Avonac Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Avonac Tablet
4. Cara menggunakan Avonac Tablet
5. Semasa menggunakan Avonac Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Avonac Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Avonac Tablet

Avonac Tablet mengandungi diclofenac dan tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil ubat anti-radang bukan steroid (NSAID).

Avonac Tablet digunakan untuk merawat artritis rheumatoid (penyakit keradangan sistemik pada sendi) & spondylitis ankylosa (penyakit keradangan pada rangka tulang yang kronik); osteoarthritis (penyakit sendi degeneratif) & spondylarthritis (keradangan sendi); sakit otot; sakit selepas pembedahan & keradangan selepas trauma & bengkak; keadaan radang yang sakit dalam ginekologi (sains perubatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesihatan dan penyakit wanita, terutamanya organ-organ pembiakan).

Bagaimana Avonac Tablet berfungsi

Diclofenac Sodium berfungsi dengan mengurangkan hormon yang menyebabkan keradangan dan kesakitan dalam badan.

Sebelum mengambil Avonac Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

- Anda tahu bahawa anda alah kepada diclofenac sodium atau mana-mana bahan dalam ubat ini.
- Anda mempunyai atau sebelum ini telah mempunyai pendarahan ulser peptik atau penembusan dalam perut anda, atau usus
- Anda menunjukkan tanda-tanda alahan (seperti asma, demam alergi atau ruam kulit) seperti aspirin, ibuprofen atau NSAID (ubat anti-keradangan) lain
- Anda mempunyai penyakit jantung, buah pinggang atau kegagalan hati atau pendarahan di dalam otak anda
- Anda telah mempunyai masalah perut atau usus selepas mengambil NSAID lain
- Anda berada di dalam tiga bulan terakhir kehamilan.

- Sebelum mula mengambil

Berhati-hati dan periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda mempunyai ulser atau beberapa masalah lain yang menjejaskan perut anda, atau usus (ulser kolitis, penyakit Crohn)
- Anda mempunyai asma atau serangan berdehid (atau jika anda mempunyai asma pada masa lalu)
- Anda mempunyai masalah jantung, hati atau buah pinggang

- Anda sudah tua
- Anda telah mengalami ketidakselesaan perut, mempunyai pedih ulu hati atau berasa loya selepas mengambil aspirin atau apa-apa lain nonsteroidal ubat anti-radang
- Anda mempunyai pendarahan / gangguan darah.

Jika, pada bila-bila masa semasa anda mengambil Avonac, anda mengalami sebarang tanda atau gejala masalah jantung atau saluran darah seperti sakit dada, sesak nafas, rasa lemah, atau pertuturan yang tidak jelas, hubungi doktor anda dengan segera.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Avonac Tablet boleh menjejaskan atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan berikut:

- tablet antikoagulan (untuk mengelakkan pembekuan darah, contohnya warfarin)
- Ubat-ubatan untuk rawatan tekanan darah tinggi (contohnya beta-blockers)
- Diuretik (untuk menyingkirkan lebih air daripada badan anda)
- Lithium (untuk kemurungan)
- methotrexate (digunakan untuk merawat kanser)
- anti-hypertensives, untuk tekanan darah tinggi
- antidiabetic agents, untuk kencing manis
- captopril, untuk tekanan darah tinggi, kegagalan

AVONAC SR TABLET

Diclofenac Sodium (100mg)

jantung dan masalah buah pinggang

• triamterene, untuk rawatan hipertensi dan bengkak

Cara menggunakan Avonac Tablet

Pastikan anda mengambil pil anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Arahan akan ditulis pada label. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos harian awal yang disyorkan ialah 100mg.

- Bila perlu digunakan

Avonac Tablet hendaklah diambil dengan atau selepas makan.

Tablet harus ditelan bulat-bulat dengan segelas air.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos, biarkan dan ambil dos seterusnya apabila anda ingat seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai tablet, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda (atau orang lain) telah terlebih mengambil tablet ini, hubungi doktor anda atau hospital dengan segera untuk mendapatkan nasihat. Sila bawa bersama pek dengan mana-mana

tablet yang tertinggal dengan anda.

Semasa menggunakan Avonac Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

• Anda perlu mengambil dos yang paling rendah Avonac Tablet untuk masa yang paling singkat, terutamanya jika anda kurang berat badan atau orang tua

• Ada kemungkinan peningkatan risiko yang kecil serangan jantung atau strok apabila anda mengambil ubat-ubatan seperti Avonac Tablet. Risiko adalah lebih tinggi jika anda mengambil dos yang tinggi untuk jangka masa yang panjang. Sentiasa mematuhi arahan doktor kepada berapa banyak untuk mengambil dan berapa lama untuk mengambil ubat

• Semasa anda mengambil ubat-ubatan doktor anda mungkin ingin memeriksai anda dari semasa ke semasa

• Jika anda mempunyai sejarah masalah perut apabila anda mengambil NSAID, terutamanya jika anda adalah orang tua, anda perlu memberitahu doktor anda dengan segera jika anda melihat sebarang tanda-tanda yang luar biasa

• Oleh kerana ia adalah ubat anti-radang, Avonac Tablet boleh mengurangkan tanda-tanda jangkitan, sebagai contoh, sakit kepala dan suhu yang tinggi. Jika anda merasa kurang sihat dan perlu berjumpa doktor, jangan lupa untuk memberitahu dia bahawa anda mengambil Avonac Tablet.

• Hentikan Avonac Tablet segera jika ada ruam dan beritahu doktor anda dengan

segera.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Kehamilan, penyusuan dan kesuburan

• Jangan mengambil Avonac Tablet jika anda hamil (atau berfikir anda mungkin), atau menyusu melainkan jika doktor anda telah memutuskan bahawa ia adalah untuk kepentingan terbaik anda.

• Jika digunakan, dos berkesan terendah harus digunakan. Anda tidak boleh mengambil pil ini dalam tempoh tiga bulan terakhir kehamilan kerana ia boleh memberi kesan kepada bayi.

• Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat-ubatan.

Memandu dan menggunakan mesin:

• Jika anda berasa gangguan penglihatan, sakit kepala, pening atau mengantuk apabila anda mula menggunakan Avonac Tablet, jangan memandu atau menggunakan mesin sehingga tiada kesan itu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

• kerosakkan hati atau buah pinggang

• ulser peptik pendarahan gastrousus.

• asma.

• penyempitan luar biasa atau penyempitan saluran pernafasan

• penyakit jantung

• orang tua

AVONAC SR TABLET

Diclofenac Sodium (100mg)

Kesan-kesan sampingan

- Sakit perut, sendawa.
- Pening atau sakit kepala.
- Alahan, ruam kulit yang ringan, bengkak di kaki dan pergelangan kaki.
- Kemurungan.
- Mengantuk.
- Tidak dapat atau susah tidur & penglihatan kabur. Kerosotan hati dan fungsi buah pinggang.
- Pengurangan bilangan sel-sel darah putih.

Tidak biasa: infarksi miokardium, kegagalan jantung, palpitasi (degupan jantung tidak normal), sakit dada.

Kes keguguran rambut, *bullous eruptions*, *erythema multiforme*, *Stevens-Johnson syndrome*, *toxic epidermal necrolysis* (*Lyell's syndrome*), tindak balas fotosensitif pernah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI/ Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Avonac Tablet

-Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C dan lindungi dari kelembapan.
- Jauhkan dari kanak-kanak.
- Hayat produk adalah 3 tahun.

-Pelupusan

- Jangan buang apa-apa ubat-ubatan melalui air sisa atau bahan buangan isi

rumah.

- Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang anda tidak gunakan lagi.
- Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- Avonac Tablet berwarna merah jambu ke merah jambu-oren, bulat, dwicembung, tablet bersalut filem.

Pembungkusan

- 10 Lepuh x 10 tablet.
- Box 100 F.C. tablet.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Diclofenac sodium

-Bahan tidak aktif:

Methylene Chloride, Hydroxypropyl Methylcellulose, Povidone K-30, Alcohol 95%, Titanium Dioxide, Sucrose Powder, Iron Sesquioxide Red, Colloidal Silicon Dioxide, Cetyl Alcohol, Polysorbate 80, Magnesium Stearate, Talc.

Nombor MAL:

MAL10053668ACZ

Pengilang

Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant No. 6, Kuang Yeh 1st Road, Hu-Kuo Hsiang, Hsin-Chu Ind. Park, Hsin Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.

Pemegang pendaftaran produk

Abio Marketing Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS13/5, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
8/11/2017

Nombor siri
BPFK(R4/1)190717/00177