

# DIAZON 2% W/W CREAM

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Ketoconazole (2% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *DIAZON*
2. Bagaimana *DIAZON* berfungsi
3. Sebelum mengambil *DIAZON*
4. Cara menggunakan *DIAZON*
5. Semasa menggunakan *DIAZON*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *DIAZON*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan *DIAZON*

Rawatan topikal terhadap jangkitan kulit kulat contoh:

- ✓ kulat badan
- ✓ kulat pada pangkal paha; *jock* gatal
- ✓ kaki atlet
- ✓ kulat matahari
- ✓ jangkitan yis pada kulit
- ✓ *seborrheic dermatitis* (rawatan; profilaksis)

## Bagaimana *DIAZON* berfungsi

*DIAZON* mengandungi bahan aktif *ketoconazole* yang berfungsi dengan membunuh kulat.

## Sebelum mengambil *DIAZON*

### - Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda alah (hipersensitif) terhadap *Ketoconazole* topical
- Jika anda alah (hipersensitif) kepada sulfit atau mana-mana ramuan *DIAZON* yang lain.

### Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *DIAZON* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *DIAZON* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

### - Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini jika:

- Anda baru-baru ini menggunakan krim, salap atau losyen pada jangkitan kulit anda yang mengandungi steroid.

- Anda harus terus menggunakan steroid ringan (seperti *hydrocortisone*) krim, salap atau losyen pada waktu pagi sementara menggunakan krim *DIAZON* pada waktu petang. Rawatan steroid ringan kemudian boleh dihentikan secara beransur-ansur selama 2-3 minggu.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Krim *DIAZON* biasanya tidak bertindak balas dengan ubat lain. Walau bagaimanapun, sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan atau menggunakan ubat-ubat lain yang baru-baru ini. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dan ubat-ubatan herba.

## Cara menggunakan *DIAZON*

### - Berapa banyak harus digunakan

Disapu pada bahagian berkenaan dan kawasan sekitarnya satu atau dua kali sehari. Rawatan diteruskan untuk beberapa hari lagi selepas tanda-tanda hilang.

### - Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### - Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

### - Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tidak ada pengalaman berlebihan dengan krim *Ketoconazole*.

Jika anda menelan *DIAZON* secara tidak sengaja, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

## Semasa menggunakan *DIAZON*

### - Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *DIAZON*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *DIAZON* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan guna *DIAZON* pada mata.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *DIAZON* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

---

Kesan sampingan berikut telah diperhatikan semasa rawatan dengan krim *Ketoconazole*:

- Kerengsaan
- Keradangan kulit
- Sensasi membakar

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Orang Awam → Laporan Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI))

### **Cara penyimpanan dan pelupusan DIAZON**

#### **- Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

#### **- Pelupusan**

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

### **Maklumat lanjut**

#### **- Rupa dan warna produk**

Krim putih, tidak berbau, licin, likat

#### **- Bahan-bahan kandungan**

- Bahan aktif

*Ketoconazole*

- Bahan tidak aktif

*Cetomacrogol 1000, Cetostearyl alcohol, White petrolatum, Germaben II, Butylated hydroxy toluene, Citric acid, Disodium phosphate anhydrous, Purified water*

#### **- Nombor MAL**

MAL07010926AZ

### **Pengilang**

UNISON LABORATORIES CO., LTD.  
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang Chachoengsao, Chachoengsao 24000 Thailand

### **Pemegang Pendaftaran Produk**

MEDISPEC (M) SDN.BHD  
No. 55 & 57, Lorong Sempadan 2,  
(Off Boundary Road),  
11400 Ayer Itam, Penang,  
Malaysia.

### **Tarikh kemaskini RiMUP**

27.8.2018

### **Nombor siri**

NPRA(R4/1)210818/00249