

KIMAFAN TABLET 25MG

Captopril (25mg)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan KIMAFAN
2. Bagaimana KIMAFAN berfungsi
3. Sebelum menggunakan KIMAFAN
4. Cara menggunakan KIMAFAN
5. Semasa menggunakan KIMAFAN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan KIMAFAN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan KIMAFAN

KIMAFAN digunakan untuk merawat:

- tekanan darah tinggi
- kegagalan jantung dan pesakit yang kebelakangan ini mendapat serangan jantung
- sesetengah masalah buah pinggang yang berkait dengan diabetes

Bagaimana KIMAFAN berfungsi

KIMAFAN mengandungi bahan aktif Captopril. Captopril tergolong dalam kumpulan ubat yang dinamakan perencat ACE. Ia berfungsi dengan mengendurkan salur darah. Ia memudahkan jantung anda mengepam darah ke seluruh badan.

Hubungi doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang tujuan KIMAFAN dibekalkan kepada anda. Doktor anda mungkin

membekalkan KIMAFAN untuk tujuan lain.

Sebelum menggunakan KIMAFAN

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap:

- captopril, bahan aktif
- mana-mana perencat ACE yang lain
- sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Jangan mengambil KIMAFAN jika anda pada masa yang lalu mengalami bengkak pada muka, bibir, lidah atau tekak yang disebabkan oleh rawatan dengan ubat yang serupa (perencat ACE).

KIMAFAN tidak patut diambil semasa menyusuan bayi.

Jangan mengambil KIMAFAN selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda salahguna pada pembungkusan.

Jika ia sudah luput atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, sila tanya doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan KIMAFAN

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda pernah mengalami atau

mempunyai masalah kesihatan seperti yang berikut:

- Masalah buah pinggang
- Masalah hati
- Masalah jantung
- Tekanan darah rendah
- Penyempitan injap aortik

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau bercadang untuk hamil. Doktor anda akan berbincang dengan anda tentang risiko dan manfaat ubat ini jika anda menggunakan KIMAFAN semasa kehamilan.

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang mana-mana perkara di atas, beritahuinya sebelum anda mula mengambil KIMAFAN.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan KIMAFAN boleh bertindak balas antara satu sama lain.

Ini termasuklah:

- Diuretik
- Ubat lain yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi
- Suplemen potassium
- Ubat anti-inflamasi
- Procainamide
- Allopurinol

Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh KIMAFAN atau mungkin menjelaskan

fungsinya. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat-ubat yang perlu diberi perhatian semasa mengambil KIMAFAN atau yang perlu dielakkan.

Cara menggunakan KIMAFAN

Patuh semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Arahannya ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menentukan jumlah pil yang perlu diambil setiap hari. Ini bergantung kepada keadaan yang dirawat dan sama ada anda mengambil sebarang ubat lain.

Dewasa:

Untuk tekanan darah tinggi
Untuk kebanyakan pesakit, dos permulaan biasanya ialah 50mg setiap hari diambil sekali atau dibahagikan kepada dua kali.

Dos ini mungkin perlu dinaikkan bergantung kepada tekanan darah anda.

Dos harian maksimum tidak boleh melebihi 450mg.

Untuk kegagalan jantung
Dos permulaan biasanya ialah 25mg diambil tiga kali sehari.

Bergantung kepada tindak balas anda, dos ini mungkin perlu dinaikkan.

Dos harian maksimum tidak boleh melebihi 450mg.

Kanak-kanak

Dos permulaan Captopril ialah 0.3mg/kg. Sesetengah pesakit mungkin perlu mengambil dos permulaan yang rendah.

Dos harian maksimum tidak boleh melebihi 6mg/kg.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti dos yang betul untuk anda. Mereka akan memberitahu anda kuantiti yang perlu diambil.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil KIMAFAN selagi diarahkan oleh doktor anda.

KIMAFAN membantu mengawal tekanan darah tinggi anda dan menambahbaik kegagalan jantung, tetapi tidak menyembuhkannya.

KIMAFAN mesti diambil setiap hari.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa dengan mengambil lebih daripada satu dos pada masa yang sama. Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda mempunyai masalah untuk mengingat masa pengambilan ubat, tanya ahli farmasi anda untuk dapatkan petua.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil KIMAFAN, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidaksesuaian atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan KIMAFAN

- Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mematuhi arahan doktor anda dengan teliti.

Beritahu doktor anda jika, untuk sebarang sebab, anda tidak mengambil ubat ini seperti yang diarahkan.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil KIMAFAN.

Beritahu doktor anda jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda rasa gayang atau pening selepas mengambil dos pertama KIMAFAN atau jika dos anda dinaikkan.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil KIMAFAN.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mangambil ubat anda atau mengurangkan dos tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan mengambil KIMAFAN untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diaruh oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana KIMAFAN mempengaruhi anda.

KIMAFAN mungkin menyebabkan pening (gayang) atau keletihan di kalangan sesetengah pesakit, terutamanya selepas mengambil dos pertama atau jika dos anda dinaikkan.

Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak terhadap KIMAFAN sebelum anda memandu, mengendalikan mesin atau melakukan sebarang aktiviti yang mungkin berbahaya jika anda pening atau gayang.

Jika anda minum alkohol, rasa pening atau gayang akan bertambah teruk.

Kesan-sesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan

perubatan jika anda mengalami sesetengah kesan sampingan.

Jangan khuatir dengan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang persoalan.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- Gayang atau pening
- Gangguan deria rasa
- Ruam kulit
- Batuk kering

Ini adalah kesan sampingan yang biasa.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers → Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan KIMAFAN

- Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam peknya. Jika anda mengeluarkan ubat daripada pek, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Simpan ubat anda di tempat suhu bawah 25°C. Lindungi daripada kelembapan dan cahaya.

Jangan simpan KIMAFAN atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil KIMAFAN atau ubat ini sudah melepassi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Pil 7mm, berbentuk bulat, berwarna putih dengan tanda "DUOMA/DUOMA" dan "DUO/2".

- Bahan-bahan kandungan
Bahan aktif:

- Setiap pil mengandungi 25mg captoril

Bahan tidak aktif:

- Tepung jagung
- Microcrystalline cellulose
- Laktosa
- Asid stearik

- Nombor MAL
MAL19985969A

Pengilang

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

**Pemegang Pendaftaran
Produk**
DUOPHARMA (M) SDN.
BHD. (42491-M)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP
06/02/2014