

# T3 MYCIN SPRAY

Clindamycin Phosphate (1.0% w/v)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan T3 Mycin Spray
2. Bagaimana T3 Mycin Spray berfungsi?
3. Sebelum mengambil T3 Mycin Spray
4. Cara menggunakan T3 Mycin Spray
5. Semasa menggunakan T3 Mycin Spray
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan T3 Mycin Spray
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang T3 Mycin Spray. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil T3 Mycin Spray berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Simpan risalah ini bersama ubat.

Anda mungkin perlu membacanya lagi.

## Apakah kegunaan T3 Mycin Spray

T3 Mycin Spray adalah antibiotik digunakan untuk merawat jerawat.

## Bagaimana T3 Mycin Spray berfungsi

T3 Mycin Spray berfungsi dengan mengurangkan jerawat dan / atau menghentikan pertumbuhan bakteria kulit yang menyebabkan jerawat.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

## Sebelum menggunakan T3 Mycin Spray

### -Bila tidak boleh mengambil

Alahan (hipersensitif) kepada Clindamycin, lincomycin atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Jika bungkusan menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan.

Jika tarikh tamat (EXP) dicetak pada pek telah berlalu.

Individu yang mempunyai masalah penyakit usus, terutamanya kolitis (keradangan pada lapisan dalam usus).

Clindamycin tidak boleh digunakan pada bayi yang baru lahir.

### Mengandung dan penyusuan

Tiada laporan yang menunjukkan Clindamycin selamat digunakan pada ibu mengandung. Terdapat laporan yang menunjukkan Clindamycin didapati di dalam susu ibu, oleh itu ia tidak digalakkan untuk ibu-ibu yang menyusu.

### -Sebelum T3 Mycin Spray

Penggunaan Clindamycin pada jangkitan bukan bakteria tidak memberikan manfaat dan meningkatkan risiko rintangan bakteria terhadap ubat.

Clindamycin perlu digunakan untuk jangkitan serius di mana ejen-ejen antimikrobal yang kurang toksik adalah tidak sesuai.

Tiada maklumat boleh didapati bagi penggunaan Clindamycin pada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Pemantauan fungsi organ adalah wajar.

### -Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat boleh berinteraksi dengan T3 Mycin Spray. Ini termasuk:

- antibiotik erythromycin

- ubat-ubatan neuromuscular blocking (digunakan untuk mengendurkan otot dalam anestesi)

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

## Cara menggunakan T3 Mycin Spray

### -Berapa banyak harus digunakan

Goncang botol sebelum digunakan. Bersih dan keringkan kawasan kulit yang ingin dirawat. Sembur dua kali sehari ke kawasan kulit yang terjejas.

Iikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

### -Bila perlu digunakan

Iikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### -Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika anda tidak pasti berapa lama anda perlu menggunakan T3 Mycin Spray, periksa dengan doktor anda.

### -Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

# T3 MYCIN SPRAY

Clindamycin Phosphate (1.0% w/v)

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

#### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika and berfikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

#### **Semasa menggunakan T3 Mycin Spray**

##### -Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Jika anda ingin mula mengambil sebarang ubat baru, maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan T3 Mycin Spray.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

##### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberikan T3 Mycin Spray kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

##### -Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan pada mata

#### **Kesan-sesan sampingan**

Seperti ubat-ubatan lain, T3 Mycin Spray boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan. Sekiranya berlaku, kebanyakannya adalah tidak serius dan sementara.

Walaubagaimanapun kesan sampingan yang serius memerlukan perhatian perubatan.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang berikut semasa penggunaan, atau beberapa minggu selepas berhenti rawatan dengan T3 Mycin Spray:

- Sakit perut
- cirit-birit berair dan teruk, yang mungkin juga berdarah
- demam, atau kombinasi dengan satu atau kedua-dua perkara di atas

Clindamycin telah dikaitkan dengan kolitis yang serius dan boleh menyebabkan kematian.

Kesan sampingan yang lain termasuk keradangan kulit melalui sentuhan, kerengsaan (cth: kemerahan, pengelupasan dan melecur), kulit berminyak, kulit kering dan keradangan folikel rambut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web [portal.bpfk.gov.my](http://portal.bpfk.gov.my) (*Consumers Reporting*).

#### **Cara penyimpanan dan pelupusan T3 Mycin Spray**

##### -Penyimpanan

Simpan T3 Mycin Spray di tempat yang sejuk dan kering.. Simpan di bawah suhu 30 ° C. Jauhkan daripada jangkauan kanak-kanak

##### -Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

#### **Maklumat lanjut**

##### -Rupa dan warna produk

T3 Mycin Spray adalah cecair yang tidak berwarna dan mempunyai bau tersendiri.

T3 Mycin Spray boleh didapati dalam botol plastik 30ml.

##### -Bahan-bahan kandungan

##### -Bahan aktif:

Setiap 30ml mengandungi 1.2% w/v Clindamycin Phosphate. (bersamaan dengan 1.0% w/v Clindamycin).

##### -Bahan-bahan tidak aktif:

Methylparaben, Propylparaben, Isopropyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Propylene Glycol, Purified Water

##### -Nombor MAL:

MAL09062162AZ

#### **Pengilang**

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.  
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,  
Bandar Sultan Suleiman,  
42000 Port Klang, Selangor,  
Malaysia.

#### **Pemegang Pendaftaran Produk:**

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.  
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,  
Bandar Sultan Suleiman,  
42000 Port Klang, Selangor,  
Malaysia.

#### **Tarikh kemaskini RiMUP**

-08/07/2015

#### **Nombor siri**

BPFK (R4/1)300615/00171