

SUNPROX 550 TABLET

Naproxen (550 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sunprox 550 Tablet
2. Bagaimana Sunprox Tablet 550 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sunprox 550 Tablet
4. Cara menggunakan Sunprox 550 Tablet
5. Semasa menggunakan Sunprox 550 Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sunprox 550 Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan Sunprox 550 Tablet

Ia digunakan untuk melegakan kesakitan jenis ringan ke sederhana dan juga untuk rawatan senggugut. Ia juga digunakan untuk merawat arthritis rheumatoid (gangguan sistemik radang yang menjaskan sendi), osteoarthritis (penyakit sendi degeneratif) ankylosing spondylitis (penyakit kronik radang tulang), tendonitis (radang tendon), radang kandung lendir (Radang Bursa) dan gout akut.

Bagaimana Sunprox 550 Tablet Berfungsi

Sunprox 550 Tablet mengandungi bahan yang dipanggil naproxen. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai ejen anti-radang bukan steroid (NSAID) yang mengurangkan demam dan rasa sakit.

Sebelum menggunakan Sunprox 550 Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Sunprox 550 Tablet:

- Jika anda mempunyai ulser peptik aktif
- Jika anda alah kepada naproxen, aspirin, NSAID lain atau bahan-bahan kandungan lain Sunprox 550 Tablet disenaraikan di bahagian akhir risalah ini.
- Jika anda mempunyai asma, rhinitis (Radang membran mukus di hidung), urtikaria (gatal ataupun ruam), polip hidung dan simptom lain menjadi lebih teruk disebabkan oleh Aspirin atau NSAID.

- Sebelum menggunakan Sunprox 550 Tablet

Anda perlu menyemak dengan doktor anda:

- Jika anda mempunyai masalah jantung atau strok
- Jika anda mempunyai masalah hipertensi (tekanan darah tinggi)

- Naproxen boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk, contohnya dermatitis exfoliative, toksik epidermis necrolysis, Steven Johnson Syndrome. Simptom ini termasuk ruam kulit, lepuh dan menggelupas. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, berhenti menggunakan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati
- Jika anda kronik alkohol
- Jika anda warga tua
- Jika anda mempunyai atau telah mempunyai ulser, pendarahan dan penebukan perut atau usus
- Jika anda mengalami dispepsia (rasa tidak selesa di sekitar epigastric kerana masalah penceraan).
- Jika anda mempunyai masalah gangguan darah
- Sila rujuk doktor anda sebelum permulaan untuk menggunakan Sunprox 550 Tablet jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, menyusukan anak atau berniat untuk menyusukan. Doktor anda akan menimbang risiko dan manfaat pengambilan Sunprox 550 Tablet

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan yang lain, termasuk yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat apabila diambil dengan Sunprox 550 Tablet boleh bereaksi sesama lain. Ini termasuk:

- Agen anticoagulant/thrombolytic (agen penipisan darah)
- Probenecid, sebagai terapi tambahan dalam antibiotik atau untuk gout
- Methotrexate, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat arthritis reumatoid, dan juga kerana beberapa jenis kanser
- Prednisolone, ejen anti-inflamasi
- Frusemide, pil air
- Salicylate, ubat untuk melegakan kesakitan
- Lithium, untuk kemurungan
- Quinolone, ubat untuk merawat jangkitan
- Hyantoins, ubat untuk sawan
- Sulfonamides, untuk jangkitan
- Sulfonylureas, untuk kencing manis
- Beta-blocker, untuk tekanan darah tinggi

Cara menggunakan Sunprox 550 Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk rawatan reumatik, dos permulaan naproxen sodium adalah 275mg dua kali sehari, diselaraskan sehingga 1100mg sehari dalam 2 dos terbahagi. Ini untuk pengambilan secara oral sahaja. Oleh itu ia tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah 16 tahun. Untuk gout akut, dos permulaan sebanyak 825mg diikuti dengan 275mg setiap 8 jam telah disyorkan. Untuk rawatan senggugut, 550mg boleh diberikan pada mulanya diikuti oleh 275mg setiap 6-8 jam jika diperlukan. Jumlah dos harian tidak melebihi 1.375g daripada naproxen sodium. Doktor anda mungkin menetapkan dos preskripsi untuk Sunprox 550 Tablet yang lebih tinggi sehingga 1.65g sehari jika dinyatakan. Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mereka mungkin berbeza maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak faham arahan pada label, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan selanjut.

- Bila perlu digunakan

Ia perlu diambil bersama makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan yang telah ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan gandakan dos anda. Ambil dos seperti biasa bila tiba waktu untuk dos seterusnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mengambil terlalu banyak ubat ini, walaupun tidak ada tandanya ketidaksesuaian atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Pengambilan terlalu banyak tablet boleh menyebabkan separa loya, senak, mengantuk, pedih hulu hati atau muntah.

Semasa menggunakan Sunprox 550 Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Sunprox 550 Tablet mengikut arahan doktor.

- Perkara yang tidak perlu dilakukan

Jangan kongsi ubatan anda dengan orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan Sunprox 550 Tablet terhadap anda. Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang dinyatakan.

Kesan-sesan Sampingan

Seperti semua ubat, Sunprox 550 Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan advers ubat pengambilan naproxen terutamanya melibatkan saluran perut dan usus. Sembelit, pedih hulu hati, sakit perut dan loya berlaku dalam kira-kira 3-9% daripada orang yang mengambil ubat ini. Gejala-gejala seperti cirit-birit, muntah, tiada selera makan dan perut kembung boleh berlaku. Naproxen boleh mengaktifkan semula ulser peptik (radang usus) dan menyebabkan ulser peptik (gastrik) pada pesakit yang tidak mempunyai sejarah ulser, pendarahan dan penebukan ulser boleh berlaku, kadang kala boleh menyebabkan kematian. Ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian, kemurungan, ketakutan, berasa cepat marah, keletihan, kelesuan, ketidakupayaan atau masalah untuk tidur, dan mimpi yang abnormal juga boleh berlaku. Kulit gatal atau ruam dan perubahan warna kulit yang disebabkan oleh lebam mungkin berlaku. Gangguan pendengaran dan penglihatan serta kekurang bilangan sel darah merah dan putih kemungkinan berlaku semasa mengambil naproxen.

Berjumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel : 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers→ Reporting*).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Sunprox 550 Tablet**Tarikh Kemaskini RiMUP**

11/01/2016

Nombor siri

BPFK(R4/1)070116/00004

- Penyimpanan

Simpan pada suhu dibawah 25°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau buangan isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut**- Rupa dan warna produk**

Bujur, cembung, biru, tablet bersalut filem dengan skor tunggal pada satu permukaan sahaja.

- Bahan-bahan kandungan**- Bahan aktif**

Naproxen Sodium

- Bahan tidak aktif

- Microcrystalline Celullose
- Corn Starch
- Sodium Starch Glycolate
- Sodium Lauryl Sulphate
- Magnesium Stearate
- Povidone K30 (PVP K30)
- Isopropyl Alcohol
- Hydroxypropyl Methylcellulose
- Deionised Water
- Polyethylene Glycol (PEG 6000)
- Titanium dioxide
- Calcium Carbonate Light
- Talcum
- Lake Blue No. 2 (30-36%)
- Hydroxypropyl Methylcellulose

- Nombor MAL

MAL19992402AZ

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.