

Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE Tablet

Glucosamine HCl 750mg and Chondroitin Sulphate 600mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE
2. Bagaimana Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE berfungsi
3. Sebelum menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE
4. Cara menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE
5. Semasa menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE digunakan sebagai terapi adjuvant untuk osteoarthritis (sakit sendi).

Bagaimana Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE berfungsi

Ia mengandungi dua bahan aktif glukosamin dan kondroitin sulfat.

Glukosamin memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan serta mengekalkan struktur dan fungsi tulang rawan dalam sendi tulang. Glukosamin merangsang biosintesis mukopolisakarida – komponen struktur utama tulang rawan sendi yang penting untuk fungsi sendi. Glukosamin juga meningkatkan penghasilan dan kelikatan cecair sinovial, memberikan aktiviti pelincir yang lebih baik kepada sendi.

Kondroitin sulfat penting untuk struktur dan fungsi tulang rawan articular. Kondroitin sulfat merupakan satu komponen penting dalam aggrecan yang dijumpai dalam tulang rawan articular. Aggrecan memberikan sifat menyerap gegaran kepada tulang rawan artikular. Sifat ini dilakukan dengan memberikan tulang rawan tekanan bengkok yang dihalang oleh daya tegangan gentian kolagen. Keseimbangan ini memberikan daya tahan boleh ubah yang penting kepada tulang rawan articular.

Sebelum menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

- Bila tidak boleh digunakan

- Jangan mengambil Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE kalau anda adalah hipersensitif terhadap makanan laut, glukosamin dan kondroitin sulfat.
- Jika anda sedang mengandung atau menyusukan anak, dapatkan nasihat doktor atau pakar kesihatan sebelum mengambil produk ini.

- Sebelum menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

Anda harus mendapatkan khidmat nasihat doktor atau ahli farmasi jika mempunyai masalah kerosakan ginjal.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Kesan glukosamin terhadap sensitiviti inulin dan toleransi glukosa adalah tidak jelas, pesakit diabetes dinasihatkan supaya berhati-hati. Pesakit diabetes yang sedang makan ubat perlu memantau glukosa darah mereka dan mungkin perlu melaraskan dos ubat jika perlu.

Cara menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan pada sisip dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila merujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Simptom osteoarthritis (sakit sendi) sederhana atau teruk: Ambil satu tablet dua kali sehari.

Dos penyelenggaraan: Ambil satu tablet sehari.

- Bila perlu digunakan

Tablet perlu diambil 15 minit sebelum makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Seperti dos yang dicadangkan

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil dos anda seperti yang diberikan dalam risalah ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan produk selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pakej selepas 'EXP'. Tarikh luput merujuk kepada hari yang terakhir bulan tersebut.

Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE Tablet

Glucosamine HCl 750mg and Chondroitin Sulphate 600mg

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Glukosamin dan kondroitin sulfat merawat punca osteoarthritis (sakit sendi) dan kelegaan kesakitan mengambil masa. Oleh itu, jika mengalami kesakitan yang teruk dalam tempoh ini, mungkin perlu mengambil analgesik seperti aspirin atau ubat anti-radang bukan steroid (NSAID).

Kesan-kesan sampingan

Jangan merasa bimbang dengan senarai kesan sampingan yang mungkin wujud. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

- Kardiovaskular: Edema periferal (pengumpulan cecair menyebabkan bengkak), takikardia (jantung berdegup lebih cepat daripada biasa) dilaporkan dalam beberapa pesakit. Hubungan sebab akibat belum diwujudkan.
- Sistem saraf pusat: Rasa mengantuk, sakit kepala, insomnia (sukar untuk tidur) telah dilaporkan secara jarang semasa terapi. (kurang daripada 1%)
- Gastrointestinal: Loya, muntah, cirir-birit, dipepsia (senak) atau sakit epigastrik, sembelit, pedih hati, dan tiada selera makan telah dilaporkan secara jarang semasa terapi oral glukosamin.
- Kulit: Reaksi kulit seperti eritema (kulit kemerahan) dan pruritus (kulit gatal) telah dilaporkan dalam pengambilan terapeutik glukosamin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Live-well™ OsteSAMIN™ Plus CHONDROITIN FORTE

- Penyimpanan

Pastikan botol ditutup ketat. Simpan dibawah suhu 30 °C.

- Pelupusan

Product ini tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Bagaimana ia kelihatan

Tablet putih berbentuk bujur, disalut film. Panjang tablet adalah 23.7 mm.

- Bahan-bahan

- Bahan aktif
 - Glucosamine HCL.
 - Chondroitin Sulphate Sodium
- Bahan tidak aktif
 - Croscarmellose sodium
 - Magnesium Stearate
 - Colloidal Silicon Dioxide
 - Sodium Starch Glycollate
 - Corn Starch
 - Hydroxypropyl Methyl Cellulose
 - Polyethylene Glycol
 - Propylene Glycol
 - Talc
 - Titanium Dioxide

- Nombor MAL:

MAL10110038X

Pengilang

PAHANG PHARMACY SDN.

BHD. (10826-K)

Lot 5979, Jalan Teratai,

5 ½ Miles Off Jalan Meru,

41050 Klang,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

PAHANG PHARMACY SDN.

BHD. (10826-K)

Lot 5979, Jalan Teratai,

5 ½ Miles Off Jalan Meru,

41050 Klang,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/03/2017

Nombor Siri

BPK(R4/1)280317/00042