

STENAC EFFERVESCENT TABLETS 600MG

Acetylcysteine (600mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Stenac Effervescent Tablets 600mg
2. Bagaimana Stenac Effervescent Tablets 600mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg
4. Cara menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg
5. Semasa menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Stenac Effervescent Tablets 600mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Stenac Effervescent Tablets 600mg

Stenac Effervescent Tablets 600mg digunakan untuk:
a. Mengurangkan kelikatan rembesan dari saluran pernafasan.
b. Penawar untuk keracunan *'Acetaminophen'*.
(Jika anda telah ambil terlalu banyak '*acetaminophen*', sila berjumpa doktor dengan segera)

Bagaimana Stenac Effervescent Tablets 600mg berfungsi

Stenac Effervescent Tablets 600 mg mengandungi *acetylcysteine*. *Acetylcysteine* dapat mengurangkan kelikatan dan ketabahan lendir dalam saluran pernafasan, dan telah terbukti dapat memberi kesan dalam

kahak.

Sebelum mengambil Stenac Effervescent Tablets 600mg

- Bila tidak boleh mengambil
- Anda tahu bahawa anda alah kepada *acetylcysteine*.
- Anda mempunyai penyakit yang diwarisi yang menyebabkan asid amino dipanggil *phenylalanine* untuk membina di dalam badan anda atau anda alah kepada *aspartame* (Pemanis buatan).

- Sebelum mula mengambil
Pesakit asma perlu dipantau dengan teliti. Rawatan dengan *acetylcysteine* hendaklah dihentikan apabila sesak nafas. Bau *sulfur* pada pembukaan paket bukan disebabkan oleh kemerosotan produk, tetapi adalah disebabkan oleh bahan aktif. Ubat-ubatan lain tidak boleh digunakan bersama-sama dengan larutan *acetylcysteine*.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau merancang untuk hamil atau menyusukan bayi. Doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat yang terlibat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Antibiotik yang diambil melalui mulut perlu diberikan secara berasingan dan pada selang sekurang-

kurangnya 2 jam.

Cara menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak lebih 6 tahun: larutkan satu biji Stenac Effervescent Tablets 600mg dalam kira-kira setengah gelas air, 1-2 kali sehari, elakkan penambahan ubat-ubatan dalam larutan, dan mengambil sebelum atau selepas makan. Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Sentiasa mengambil ubat ini betul-betul seperti doktor atau ahli farmasi anda telah memberitahu anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos, biarkan dan mengambil dos seterusnya apabila ia perlu diambil. Selepas itu, teruskan pengambilan seperti sebelum ini. Jangan mengambil dos berganda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai ubat ini, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

STENAC EFFERVESCENT TABLETS 600MG

Acetylcysteine (600mg)

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak tablet, hubungi doktor anda atau hospital dengan segera untuk mendapatkan nasihat. Sila bawa bersama pek dengan tablet yang masih berada dengan anda.

Semasa menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Stenac Effervescent Tablets 600mg.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Stenac Effervescent Tablets 600mg dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-sesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Stenac Effervescent Tablets 600mg boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Stenac Effervescent Tablets 600mg

- Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 25°C.
- Jauhkan dari kanak-kanak.
- 30 tablet disediakan dalam pek kerajang aluminium dengan PVC / PVDC dalam

kotak

karton.

- Pelupusan

- Jangan buang apa-apa ubat-ubatan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah.
- Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang anda tidak gunakan lagi.
- Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

• Stenac Effervescent Tablets 600 mg berwarna putih kepada putih kekuningan, bulat, rata, dengan perkataan "SYG" di tepi.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif: *acetylcysteine*
-Bahan tidak aktif:
Aspartame, PEG 6000, monosodium citrate anhydrous, Maltodextrin, L-Leucine, Sucrose, Sodium Bicarbonate, Acesulfame Potassium, Povidone K-30, Orange powder, Isopropyl Alcohol, Sodium Carbonate Anhydrous, Pineapple flavor powder.

Pembungkusan

- 2 tablet sebagai pek kerajang aluminium dengan PVC / PVDC.
- Satu kotak mengandungi 30 biji Stenac Effervescent Tablets 600mg

- Nombor MAL:

MAL09011475X

Pengilang

Synmosa Biopharma Corporation
No. 6, Kuang Yeh 1st Road,
Hu-Kuo Hsiang, Hsin-Chu
Ind-Park, Hsin Chu Hsien,
Taiwan, R.O.C.

STENAC EFFERVESCENT TABLETS 600MG

Acetylcysteine (600mg)

**Pemegang pendaftaran
produk**

Apex Pharmacy Marketing
Sdn Bhd
No.2, Jalan SS13/5, 47500
Subang Jaya, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

7/3/2017

Nombor Siri

BPK(R4/1)070317/00018