

PRIMIFED TABLET

Triprolidine hydrochloride/Pseudoephedrine hydrochloride (2.5mg/60mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Primifed*
2. Bagaimana *Primifed* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Primifed*
4. Cara menggunakan *Primifed*
5. Semasa menggunakan *Primifed*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Primifed*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Primifed*

Ia digunakan untuk melegakan kesesakan hidung, bersin dan hidung berhingus semasa selesema dan rinitis alergi.

Bagaimana *Primifed* berfungsi

Primifed adalah ubat mengandungi pseudoephedrine hydrochloride, yang mengurangkan kesesakan hidung dan triprolidine hydrochloride, antihistamina yang membantu menghentikan bersin, hingus dan mata berair.

Sebelum menggunakan *Primifed*

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil *Primifed* jika

- ada alahan kepada bahan aktif dan tidak aktif yang terkandung dalam *Primifed*.
- termakan pada 2 minggu lepas atau sedang memakan ubat depresi yang dikenali sebagai monoamine oxidase inhibitors.
- menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan *Primifed*

Keselamatan penggunaan pada wanita mengandung belum disahkan. Sila minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai

- penyakit yang berkaitan dengan jantung dan saluran darah
- tekanan tinggi dalam mata
- tekanan darah tinggi
- kelenjar tiroid terlalu aktif
- penambahan saiz prostat

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan tricyclic antidepressants (untuk kemurungan), atropine (untuk kekejangan perut) atau sebarang ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Primifed*

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak lebih dari 12 tahun: 1 tablet tiga atau empat kali sehari mengikut keperluan. Kanak-kanak 6 – 12 tahun: ½ tablet tiga atau empat kali sehari mengikut keperluan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada

maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Iikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Tanda-tanda klinikal termasuk tidak stabil, muka memerah, kesesakan nafas, halusinasi (pendengaran, bau, rasa atau perasaan perkara yang tidak wujud), mengantuk, sawan, kekeringan mulut, kerongkong atau hidung yang teruk, sakit kepala berterusan dan denyutan jantung perlahan atau cepat yang luar biasa.

Semasa menggunakan *Primifed*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang menggunakan *Primifed*. Beritahu doktor dengan segera jika anda jadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan memberi *Primifed* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan kerja yang memerlukan kecerdasan mental kerana mungkin akan menyebabkan anda mengantuk. Elakkan minuman alkohol.

Kesan-kesan sampingan

Primifed boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Sila hubungi doktor atau ahli farmasi segera jika mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini. Mengantuk, keletihan, pening, loya, muntah, sakit gastrik, kabur penglihatan, kekeliruan, susah kencing, denyutan jantung cepat dan kuat, sakit kepala, telinga berdesing, mulut kering, anoreksia (gangguan pemakanan) dan resah mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web

npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan *Primifed*

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, bawah suhu 25°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat warna hijau dengan skor pada permukaan atas.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: triprolidine hydrochloride dan pseudoephedrine hydrochloride
- Bahan tidak aktif: lactose monohydrate, cornstarch, quinolone yellow lake, indigo carmine lake, magnesium stearate dan polyvinylpyrrolidone.

- Nombor MAL

MAL19910132AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini

14/03/2017

Nombor siri

BPFK(R4/1)140317/00031