

SUFAZINE CREAM

Silver sulphadiazine (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sufazine
2. Bagaimana Sufazine berfungsi
3. Sebelum mengguna Sufazine
4. Cara menggunakan Sufazine
5. Semasa menggunakan Sufazine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sufazine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sufazine

Ia digunakan untuk mencegah dan merawat jangkitan dalam luka terbakar.

Bagaimana Sufazine berfungsi

Silver sulphadiazine adalah sejenis antibiotik yang membunuh sesetengah bakteria, sesetengah yis dan kulat.

Sebelum menggunakan Sufazine

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika ada alahan terhadap silver sulphadiazine dan ramuan-ramuan lain Sufazine.
- Ia tidak boleh diguna oleh wanita hamil, bayi pra-matang atau baru lahir. Risiko dan manfaat penggunaannya perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan.

- Sebelum mula menggunakan

Berhati-hati semasa penggunaan pada:

- kekurangan fungsi hati dan buah pinggang
- kekurangan glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
- kawasan rawatan yang luas
- ibu yang menyusukan anak

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika mengambil:

- oral anticoagulants (anti darah beku)
- methotrexate (untuk kanser)
- phenytoin (untuk sawan)
- sulphonylurea (ubat penyakit kencing manis)
- p-aminobenzoic acid dan sebatian yang berkaitan (untuk pelindung cahaya)

Cara menggunakan Sufazine

- Berapa banyak harus diguna

Sapu krim setebal 3 – 5mm satu atau dua kali sehari.

- Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

- Berapa lama perlu diguna

Sila semak dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan Sufazine

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memberi Sufazine kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda hamil atau menyusu semasa menggunakan ubat ini, elakkan penggunaan kecuali dengan arahan doktor. Doktor anda akan mempertimbangkan risiko dan manfaat penggunaan ubat ini pada anda dan bayi.

Kesan-kesan sampingan

Penggunaan silver sulphadiazine mungkin menyebabkan tindak balas hipersensitiviti dan sensitif kepada cahaya, sakit atau iritasi pada tempat penggunaan.

Leukopenia (gangguan darah) mungkin juga berlaku. Kelewatan penanggalan kulit dan jangkitan kulat pada luka boleh berlaku. Fungsi buah pinggang perlu dipantau untuk air kencing keruh akibat kehadiran kristal.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Sufazine

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang tidak diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim warna putih legap.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: silver sulphadiazine.
- Bahan tidak aktif: liquid paraffin, cetomacrogol emulsifying wax, white soft paraffin, methyl parabens, propyl parabens, citric acid, sodium phosphate dibasic, sodium diphosphate monobasic, disodium edetate dan air.

- Nombor MAL:

MAL19991429AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/08/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)160817/00212