

MUCOLIX ELIXIR

Bromhexine Hydrochloride (4mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mucolix Elixir
2. Bagaimana Mucolix Elixir berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mucolix Elixir
4. Cara menggunakan Mucolix Elixir
5. Semasa menggunakan Mucolix Elixir
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mucolix Elixir
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Mucolix Elixir

Melegakan batuk berkahak dan keadaan lain seperti batuk berkahak yang teruk atau berlebihan.

Bagaimana Mucolix Elixir berfungsi

Bromhexine Hydrochloride adalah agen *mucolytic* yang membantu mencairkan dan memudahkan pengeluaran kahak tebal di dalam saluran pernafasan.

Sebelum menggunakan Mucolix Elixir

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Mucolix Elixir:

- Jika anda alah (hipersensitif) terhadap bromhexine atau sebarang bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- pada kanak-kanak berusia di bawah 2 tahun tanpa nasihat perubatan dari doktor.
- jika anda hamil atau merancang untuk hamil.
- jika anda sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu

-Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Mucolix Elixir jika anda mempunyai masalah hati, buah pinggang atau ulser perut.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang antibiotik (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan) atau ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Mucolix Elixir

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas: 10ml

Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun: 5ml

Kanak-kanak 2 hingga 6 tahun: 2.5ml

-Bila perlu digunakan

Diambil 3 kali sehari, atau ikut nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Ikat nasihat doktor atau ahli farmasi. Jika simptom tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam tempoh 14 hari atau simptom semakin teruk, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum meneruskan pengambilan.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos boleh mengakibatkan loya, muntah dan cirit-birit. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan yang dialami.

Semasa menggunakan Mucolix Elixir

-Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Amalkan pengambilan ubat pada waktu yang sama setiap hari.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

- Loya.
- Cirit-birit.
- Masalah penghadaman.
- Rasa berangin dalam perut.
- Sukar untuk bernafas.
- Ruam kulit.
- Bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau tekak.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat

Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my [Orang Awam → Lapor Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Mucolix Elixir

-Penyimpanan

Simpan di bawah 25°C. Lindungi dari cahaya

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Sirap tidak berwarna dengan perisa kiwi.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Bromhexine Hydrochloride.

-Bahan tidak aktif

Sorbitol Solution 70%, Sodium Benzoate, Citric Acid Anhydrous, Purified Water, Kiwi Flavour, Chloroform Spirit, Glycerin, Syrup.

-Nombor MAL

MAL06051428XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/05/2018

Nombor siri

NPRA(R4/1)170518/00157