

ORADEX ANTIBACTERIAL MOUTHWASH®

Chlorhexidine Digluconate (0.12%)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Antibacterial Mouthwash
2. Bagaimana Antibacterial Mouthwash berfungsi
3. Sebelum menggunakan Antibacterial Mouthwash
4. Cara menggunakan Antibacterial Mouthwash
5. Semasa menggunakan Antibacterial Mouthwash
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Antibacterial Mouthwash
8. Perihal produk
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran pendaftaran produk
10. Tarik kemaskini

Apakah kegunaan Antibacterial Mouthwash

Ia digunakan bagi menghalang daripada pembentukan plak gigi, merawat jangkitan awal pada gusi dan mencegah gingivitis dan pendarahan gusi. Ia juga dapat mengawal jangkitan dalam mulut dan membantu proses penyembuhan selepas pembedahan gigi/mulut. Ia nya membantu pengurusan ulser pada mulut, sakit tekak dan mengekalkan kebersihan oral terutama ketika mengalami kesukaran semasa memberus gigi atau tidak boleh bekerja contoh: keperluan fizikal atau mental seseorang individu semasa dalam penjagaan hospital.

Bagaimana Antibacterial Mouthwash berfungsi

Ia mengandungi chlorhexidine digluconate, sejenis antiseptik dan efektif untuk melawan pathogens yang besar. Keberkesaan

chlorhexidine adalah disebabkan keupayaannya untuk menahan permukaan oral selain menjadi kawasan untuk bertindak dengan sendiri, bertindak untuk menahan pengeluaran agen yang perlakan disebabkan kepekatan air liur yang berkurangan.

Sebelum mengambil Antibacterial Mouthwash

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakannya jika anda mempunyai hipersensitiviti yang diketahui atau pernah mengalami tindak balas alergi terhadap chlorhexidine atau mana-mana eksipien dalam rumusan. Walau bagaimanapun, tindak balas tersebut sangat jarang berlaku.

- Sebelum mula mengambil

Jangan terus menggunakan selepas memberus gigi. Bilas mulut dengan air hingga bersih sebelum menggunakan pembersih mulut untuk mengelakkan kesan antibakteria.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Chlorhexidine tidak sesuai dengan surfaktan atau dengan buih yang terdapat dalam ubat gigi. Tiada bukti kesan buruk pada janin semasa kehamilan atau pada bayi semasa penyusuan.

Cara menggunakan Antibacterial Mouthwash

- Berapa banyak harus digunakan

Isi cecair ke dalam penutup hingga ke garisan 15ml.

- Bila perlu digunakan

Gunakan dua kali sehari atau seperti yang ditetapkan oleh doktor gigi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gerakkkan cecair ke dalam mulut di semua arah secara perlahan sebanyak 15ml selama 30 saat, kemudian bawa cecair ke belakang tekak dan berkumur 10 saat dua kali sehari.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas dos, gunakannya secepat mungkin dan kembali ke jadual dos biasa anda.

- Sekiranya mengambil dos secara berlebihan

Chlorhexidine mudah melekat kuat ke kulit, mukosa dan tisu lain. Oleh itu tidak mudah diserap oleh saluran gastro-usus. Tiada kesan dalam paras darah didapati selepas penggunaan lisan dan kesan sistemik dari mana-mana pengambilan yang tidak disengajakan.

Semasa menggunakan Antibacterial Mouthwash

- Perkara yang perlu dilakukan

Untuk kegunaan lisan sahaja. Jangan telan. Jauhi dari kanak-kanak.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jauhkan dari mata dan telinga. Sekiranya terkena mata sila basuh menggunakan air secepat mungkin.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya gejala berterusan, rujuk doktor gigi anda.

Kesan-kesan sampingan

Secara umum, reaksi alahan telah dilaporkan. Namun sangat jarang berlaku. Sedikit Perubahan warna pada lidah, gigi dan perubahan/pemulihan warna gigi mungkin berlaku. Ia nya akan hilang apabila rawatan dihentikan. Perwarnaan boleh dihalang dengan memberus gigi sebelum penggunaan tetapi kadang kala memerlukan skala pergilian dari pakar untuk pengeluaran yang sempurna. Gangguan rasa sementara, rasa terbakar pada lidah, kesan buruk pada tisu lembut dalam mulut dan bengkak pada kelenjar air liur boleh terjadi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (Public - Reporting Side Effects to Medicine (conSERF) or vaccines (AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan Antibacterial Mouthwash

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. tanpa sinaran matahari secara terus. Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Oradex Antibacterial Mouthwash adalah cecair jernih yang berwana biru dengan rasa sejuk dan perasa mint.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Chlorhexidine Digluconate
0.12%
- Bahan lain
Aqua, Peppermint
Oil (Mentha Piperita),
Glycerin, Poloxamer 407
Polysorbate 20, CI 42090,
Menthol dan CI 19140

- Nombor MAL:

MAL 06011901XC

Pengilang

Pahang Pharmacy Sdn Bhd
Lot 5016, Jalan Teratai, 5½ Mile Off
Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
Malaysia ,

Pemegang Pendaftaran Produk

Cavico
A12-02 Atria Damansara, Jalan 22/23
Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

- 26/07/2018

Nombor Siri

NPRA(R4/1)220618/00182